

تم تحميل وعرض المادة من

منهجي

mnhaji.com



موقع منهجي منصة تعليمية توفر كل ما يحتاجه المعلم
والطالب من حلول الكتب الدراسية وشرح للدروس
بأسلوب مبسط لكافة المراحل التعليمية وتوزيع
المناهج وتحضير وملخصات ونماذج اختبارات وأوراق
عمل جاهزة للطباعة والتحميل بشكل مجاني

حمل تطبيق منهجي ليصلك كل جديد



مراجعة رياضيات ١-٢

الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٤هـ

الصف الثاني ثانوي

(مسارات/عام)

الباب الأول (الدوال والمتباينات)

أختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي:

(١) مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها العدد -28 هي مجموعة الأعداد:				
(A) الطبيعية، الصحيحة، الحقيقية	(B) الصحيحة، النسبية، الحقيقية	(C) الكلية، الصحيحة	(D) الطبيعية، الكلية، النسبية	
(٢) أي مجموعة من مجموعات الأعداد التالية لا ينتمي إليها العدد -25				
(A) الأعداد الصحيحة (Z)	(B) الأعداد النسبية (Q)	(C) الأعداد الحقيقية (R)	(D) الأعداد الكلية (W)	
(٣) النظير الجمعي للعدد 3 عكس الإشارة				
(A) 3	(B) -3	(C) 0	(D) 1	
(٤) النظير الضربي للعدد $\frac{2}{7}$ مقلوب العدد				
(A) $\frac{2}{7}$	(B) $\frac{7}{2}$	(C) $-\frac{2}{7}$	(D) $-\frac{7}{2}$	
(٥) ما الخاصية الموضحة في: $8\sqrt{11} + 5\sqrt{11} = (8+5)\sqrt{11}$ <i>قوسا قوسا لا يوجد اقواس</i>				
(A) التبديلية	(B) التجميعية	(C) الانغلاق	(D) التوزيع	
(٦) بسط العبارة $2(x+3) + 5(2x-1)$ $2x+6+10x-5=12x+1$				
(A) $12x+1$	(B) $12x+11$	(C) $12x+2$	(D) $9x+1$	
(٧) أوجد هدى العلاقة $\{(-1,5), (-1,3), (-2,3)\}$ ثم حدد ما إذا كانت هذه العلاقة دالة أم لا: <i>قيم د عدم تكرار قيم x</i>				
(A) $\{-2, -2\}$ ، دالة	(B) $\{-2, -1\}$ ، ليست دالة	(C) $\{3, 5\}$ ، دالة	(D) $\{3, 5\}$ ، ليست دالة	
(٨) المجال للعلاقة التالية: $y + 3x = 5$ <u>دالة خطية</u>				
(A) مجموعة الأعداد الطبيعية	(B) مجموعة الأعداد النسبية	(C) مجموعة الأعداد الصحيحة	(D) مجموعة الأعداد الحقيقية	
(٩) يمثل الشكل المجاور:				
(A) دالة متعددة التعريف	(B) دالة القيمة المطلقة	(C) دالة درجية	(D) دالة ثابتة	
(١٠) التمثيل البياني للمتباينة التالية: $y > 1$ <u>أب خط منقطع</u>				
(A) <i>قطع عند 2</i>	(B) <i>قطع عند -2</i>	(C) <i>قطع عند 1</i>	(D) <i>قطع عند 3</i>	

مراعتي: لا تسمح لي لاحد أن يقلل من شأن حلمك.. طموحك.. حياتك.. أجعل كل ما يحضك"

❖ للإجابة على الأسئلة (١١، ١٢، ١٣) استخدم نظام المتباينات التالي: $x \geq 1, y \leq 6, y \geq x - 2$ أوجد إحداثيات رؤوس منطقة الحل. (١)

$x=1$
 $y=x-2$
 $y=1-2$
 $y=-1$
 (١، -١)

$y=x-2$
 $6=x-2$
 $6+2=x$
 $8=x$
 (٨، ٦)

- (1,6), (-3,2), (8,0) (D) (0, -4), (3,2), (-3,2) (C) (1, -1), (1,6), (8,6) (B) (0, -4), (1,1), (8,6) (A)

(١٢) أوجد القيمة العظمى للدالة $f(x, y) = x - y$ في هذه المنطقة:


النقطة	$x-y$	القيمة
(١، -١)	١ - (-١)	2 → أكبر قيمة
(١، ٦)	١ - ٦	-5 → أصغر قيمة
(٨، ٦)	٨ - ٦	2

- 0 (D) 2 (C) 9 (B) 8 الأصغر (A)

(١٣) أوجد القيمة الصغرى للدالة $f(x, y) = x - y$ في هذه المنطقة:

- 9 (D) -5 (C) 0 (B) 3 (A)

(١٤) أي مما يأتي ليس جزءاً من الدالة المتعددة التعريف الممثلة بالشكل المجاور: **نظر لسطر المتر في الهذرات تم نستبعد الدالة الخطأ**



ترسم
 سطر افقي

ترسم بخط مائل


ترسم

- $-3, x < -1$ (D) $-x + 7, x \geq 3$ (C) $-x, -1 \leq x < 3$ (B) $3x, x < -1$ (A)

(١٥) أي مما يأتي يمثل عدداً غير نسبياً؟ **الجذور التي ليست مربع كامل والدور العرصيه ٢٢**

- $\sqrt{11}$ (D) 1.25 (C) $\sqrt{49} = 7$ (B) -4 (A)

(١٦) أي المتباينات الآتية ممثلة في الشكل المجاور:



الظليل لليس
 اذن على اليس
 خط متصل
 اذن يوجد سواه

- $y < |x| - 1$ (D) $y > |x| + 1$ (C) $y \leq |x| - 1$ (B) $y \geq |x| + 1$ (A)

(١٧) أي نقطة من النقاط التالية تقع في منطقة حل المتباينة: $x - 2y \leq 1$

$3 - 2(0) \leq 1$
 $3 - 0 \leq 1$
 $3 \leq 1$
 لا يحقق المتباينة


$0 - 2(-1) \leq 1$
 $0 + 2 \leq 1$
 $2 \leq 1$
 لا يحقق المتباينة

$2 - 2(1) \leq 1$
 $2 - 2 \leq 1$
 $0 \leq 1$
 يحقق المتباينة

$2 - 2(-1) \leq 1$
 $2 + 2 \leq 1$
 $4 \leq 1$
 لا يحقق المتباينة


- (3,0) (D) (0, -1) (C) (2,1) (B) (2, -1) (A)

(١٨) العلاقة في الشكل المجاور تمثل **دالة** اختيار الخط الرأسى (لا به نقطتها في نقطه واحدة)



مضعفا في نقطه
 اذن ليست دالة

- خطأ (B) صح (A)



(١٩) العلاقة في الشكل المجاور هي **دالة** متباينة **يعطى كل عنصر مسجراً واحداً فقط**

- خطأ (B) صح (A)

(٢٠) الخاصية المستخدمة في العبارة الرياضية: $-y + 3x = 3x - y$ هي **الابدالية**؟ **تبديل اماكن فقط**

- خطأ (B) صح (A)

مراعتي: "تذكري أنك إذا اردتي أستطعتي"

الباب الثاني (المصفوفات)

أختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي:

❖ للأسئلة من (١-٨) استعمل المصفوفات الآتية لإيجاد كل مما يأتي:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 4 & -9 & -5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$$

(١) رتبة المصفوفة A هي: عدد الصفوف \times عدد الأعمدة

- (A) 2×2 (B) 2×3 (C) 3×2 (D) 3×3

(٢) قيمة b_{23} هي: الصف الثاني العمود الثالث من المصفوفة B

- (A) -1 (B) -2 (C) -9 (D) -5

(٣) ناتج $-4A$ عدد صفين في مصفوفة مضروب جمع عناصر المصفوفة A في -4

- (A) $\begin{bmatrix} -8 & -16 \\ 4 & 0 \\ -12 & 4 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -4 & -8 \\ 2 & 0 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 8 & 16 \\ -4 & 0 \\ 12 & -4 \end{bmatrix}$ (D) غير ممكن

(٤) الصف الأول من $A \otimes B$ هو: كسر الطرح \otimes ويكون لها نفس أبعاد A و B

- (A) $[-1 \ 4]$ (B) $[-1 \ 4 \ 2]$ (C) $[-1 \ 0]$ (D) غير ممكن

(٥) رتبة AB هي: نصفه \otimes ضرب

- (A) 2×2 (B) 2×3 (C) 3×2 (D) 3×3

(٦) ناتج $D \cdot C$ هو: $\begin{bmatrix} -2 & -20 \\ -1 & -26 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2(1)+4(0) & -2(2)+4(-4) \\ -1(1)+6(0) & -1(2)+6(-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -20 \\ -1 & -26 \end{bmatrix}$$

- (A) $\begin{bmatrix} -2 & -20 \\ -1 & -26 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -4 & 16 \\ 4 & -24 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -1 & 6 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -10 \end{bmatrix}$

(٧) محددة المصفوفة D هي: $\begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} = -2(6) - 4(-1) = -12 + 4 = -8$

- (A) -4 (B) -8 (C) 8 (D) -16

(٨) النظير الضربي للمصفوفة C هو:

$$C^{-1} = \frac{1}{-4} \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

نوجد بالحددة: $\begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} = -4 \cdot 0 = -4$
نوجد النظير الضربي: فنزل أماكن القطر الرئيسي وتغير إشارة القطر الفرعي

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

مراعاتي: لا توجد خطوة عملاقة تصل بك إلى ما ترده، إنما يحتاج الأمر إلى كثير من الخطوات الصغيرة لتبلغ ما تريد.

$$5x - (-10) = 0$$

$$5x + 10 = 0 \Rightarrow \frac{5x}{5} = \frac{-10}{5} \Rightarrow x = -4$$

٩) قيمة x التي تجعل المصفوفة $\begin{bmatrix} x & 10 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ ليس لها نظير ضربي هي:
المجردة تساوي صفر

20

(D)

-20

(C)

-4

(B)

4

(A)

١٠) إذا كانت S, R مصفوفتين من الرتبة 5×3 فإن رتبة المصفوفة $S \cdot R$ هي: \leftarrow خارج الطرح من نفس الرتبة

3 × 3

(D)

5 × 5

(C)

5 × 3 ✓

(B)

3 × 5

(A)

١١) كم عنصراً في مصفوفة من الرتبة 4×3 ؟

4

(D)

12

(C)

3

(B)

7

(A)

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -2 & 5 & 1 & -2 & 5 \\ -4 & -3 & 1 & -4 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$6 + 15 - 4 = 17 \quad \text{نخرج} \quad 17 - (-31) = 17 + 31 = 48$$

$$-9 - 2 - 20 = -31$$

$$\therefore \text{مساحة المثلث} = \frac{48}{2} = 24 \text{ وحدة}$$

١٢) باستخدام المحددات أوجد مساحة المثلث الذي رؤوسه: $(-2, 5), (-4, -3), (3, 1)$

48 وحدة مربعة

(D)

24 وحدة مربعة

(C)

31 وحدة مربعة

(B)

17 وحدة مربعة

(A)

١٣) باستعمال قاعدة كرامر أو المعادلة المصفوفية، حل نظام المعادلات: $3x + 2y = 22, x - 2y = -6$ ؟

محدد المعاملات

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -6 - 2 = -8$$

$$\begin{cases} \text{لايجاد قيمة } x \\ x = \frac{\begin{vmatrix} 22 & 2 \\ -6 & -2 \end{vmatrix}}{-8} \\ x = \frac{-44 + 12}{-8} = \frac{-32}{-8} = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{لايجاد قيمة } y \\ y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 22 \\ 1 & -6 \end{vmatrix}}{-8} \\ y = \frac{-18 - 22}{-8} = \frac{-40}{-8} = 5 \end{cases}$$

لحريّة كرامر

(1, -2)

(D)

(3, 2)

(C)

(5, 4)

(B)

(4, 5)

(A)

$$\begin{cases} -1 + 6 + 0 = 5 \\ -4 + 4 + 0 = 0 \end{cases} \text{ نخرج} \quad 5 - 0 = 5$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \text{ قيمة هي:}$$

10

(D)

7

(C)

-7

(B)

5

(A)

١٥) تسمى المصفوفة: $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ مصفوفة عمود؟

خطأ

(B)

صح

(A)

قطر رئيسي و الباقي صفر

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

١٦) المصفوفة المجاورة تسمى مصفوفة الوحدة؟

خطأ

(B)

صح

(A)

١٧) تتحقق الخاصية الإبدال في ضرب المصفوفات.

خطأ

(B)

صح

(A)

١٨) قاعدة كرامر هي طريقة لحل نظام المعادلات الخطية.

خطأ

(B)

صح


(A)

مراعتي: "اجتهادك ودراساتك وسهرك كل هذا خالقك يراه لن يضع تعبك وستحققين ما تتمني

وتذكري أن كل هذا ماضي لن يدوم لكن نجاحك هو من يستمر معك"

الباب الثالث (كثيرات الحدود ودوالها)

أختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي:

$i^0 = 1$	(D)	i	(C)	1	(B)	-1	(A)	(١) إذا كان: $i^2 = -1$ ، فما قيمة i^{32} ؟
$6+17-9i-12i=23-21i$	(D)	$6-9i$	(C)	-11-3i	(B)	23-21i	(A)	(٢) بسط العبارة: $(6-9i) + (17-12i)$
7-12i	(D)	$6-9i$	(C)	-11-3i	(B)	23-21i	(A)	(٣) ما درجة $2x^2 - 5x^3 + 7x^4 - 9$ ؟
3	(D)	-9	(C)	7	(B)	4	(A)	(٤) ما عدد الأصفار الحقيقية للدالة المجاورة؟
	(D)	3	(C)	2	(B)	1	(A)	عدد مرات قطع المنحنى لمحور x
$b^2-4ac = (-3)^2-4(1)(7) = 9-28 = -19 < 0$ فئبان	(D)	3	(C)	2	(B)	1	(A)	(٥) ما عدد جذور المعادلة: $x^2 - 3x + 7 = 0$ ؟ وما أنواعها؟
جذر نسبي واحد مكرر	(D)	جذران غير نسبيين	(C)	جذران نسبيين	(B)	جذران تخيليان	(A)	(٦) حل العبارة: $y^3 - 64$ إلى عوامل تحليلياً تماماً.
$y^3-4^3 = (y-4)(y^2+4y+16)$	(D)	$(y-4)(y^2+4y+16)$	(C)	$(y-4)(y+4)^2$	(B)	$(y-4)^3$	(A)	(٧) ما قيمة مميز المعادلة: $x^2 - x - 20 = 0$ ؟
$b^2-4ac = (-1)^2-4(1)(-20) = 1+80 = 81$	(D)	5	(C)	81	(B)	9	(A)	(٨) أوجد $f(3)$ للدالة $f(x) = x^2 - 9x + 5$ مستعملاً التعويض التركيبي.
$3 \downarrow \begin{array}{r} 1 \quad -9 \quad 5 \\ \underline{-3 \quad -18} \\ 1 \quad -6 \quad -13 \end{array}$ البقي	(D)	-13	(C)	-16	(B)	-23	(A)	(٩) بسط العبارة: $(5+2i)(1+3i)$
$5+15i+2i+6i^2 = 5+17i-6 = -1+17i$	(D)	-1+17i	(C)	-1	(B)	5+6i	(A)	(١٠) إذا كان $x+2$ أحد عوامل كثيرة الحدود: $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ ، فأوجد عواملها الأخرى.
$-2 \downarrow \begin{array}{r} 1 \quad -3 \quad -4 \quad 12 \\ \underline{-2 \quad 10 \quad -12} \\ 1 \quad -5 \quad 6 \quad 0 \end{array}$	(D)	$x-2, x+3$	(C)	$x+2, x-3$	(B)	$x+2, x+3$	(A)	يمكن الإشارة
$x-2, x-3$	(D)	$x-2, x+3$	(C)	$x+2, x-3$	(B)	$x+2, x+3$	(A)	

مراعتي: "تذكرني أن هذا الوقت سيمضي وأنت من يحدد هل يمضي بنجاح أو خسارة... لك حرية الاختيار"

١١) اكتب العبارة: $x^4 + 5x^2 - 8$ في الصورة التربيعية إذا كان ممكناً.

$$(x^2)^2 + 5(x^2) - 8$$

غير ممكن

(D)

(A) $(x^4)^2 + 5(x^4) - 8$

(C)

(B) $(x^2)^2 - 5(x^2) - 8$

(A)

(A) $(x^2)^2 + 5(x^2) - 8$

$$\begin{array}{r} -2 \quad 1 \quad 2 \quad -2 \quad -3 \quad 2 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 1 \quad 0 \quad -2 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$x^3 - 2x + 1$$

١٢) ناتج قسمة $(x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 3x + 2) \div (x + 2)$ يساوي..

عكس الإشارة

(D) $x^3 - 2x^2 + x$

(A)

(C) $x^3 - 2x + 1$

(B)

(B) $x^3 - 2x^2 + 1$

(A)

(A) $x^2 - 2x + 1$

(A)

١٣) ما العدد الممكن للأصفار الحقيقية الموجبة للدالة: $f(x) = x^6 + 2x^5 - 3x^4 - 6x^3 + 5x^2 - 10x + 6$ **مرات تغير الإشارة للمعادلة**

الحل: 4 مرات
0 أو 2 أو 4

1 أو 3

(D)

6

(C)


0 أو 2 أو 4

(B)

5 أو 6

(A)

١٤) عندما $x \rightarrow +\infty$ ، فإن $f(x) \rightarrow ?$ (صف سلوك طرفي التمثيل البياني)



x

(D)

$+\infty$

(C)

0

(B)

$-\infty$

(A)

١٥) بسّط العبارة: $\frac{3y^2z}{15y^5}$ مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفراً.

$$\frac{3y^2z}{15y^5} = \frac{z}{5y^3}$$

(D) $\frac{y^7z}{5}$

(C)

(B) $5y^3z$

(A)

(B) $\frac{y^3z}{5}$

(A)

(A) $\frac{z}{5y^3}$

(A)

١٦) العدد $6i$ تخيلي بحت.


خطأ

(B)

صح

(A)

في نفس الاتجاه
زوجية



١٧) الدالة في الشكل المجاورة زوجية الدرجة؟

خطأ

(B)

صح

(A)

١٨) في كثيرة الحدود التالية: $11x^4 - 5x^3 + 4x^2$ المعامل الرئيس هو: 11

خطأ

(B)

صح

(A)

١٩) تسمى كثيرة الحدود التي لا يمكن تحليلها كثيرة حدود أولية؟

خطأ

(B)

صح

(A)

٢٠) كل معادلة كثيرة حدود درجاتها أكبر من الصفر لها جذر واحد على الأقل ينتمي إلى مجموعة الأعداد المركبة

خطأ

(B)

صح

(A)

مراعتي: "لتكن مروحك مُعَمَّمة بالاجابة، لتصعي النجاح الذي يليق بك،" "كوني واثقة بقدراتك"

أوجد النظير الجمعي والنظير الضربي للعدد $\frac{5}{8}$

النظير الضربي: $\frac{8}{5}$

النظير الجمعي: $-\frac{5}{8}$

حدّد مجال كل علاقة فيما يأتي ومداهما، وبيّن ما إذا كانت دالة أم لا، وإذا كانت كذلك فهل هي متباينة أم لا؟

$$\{(-6, -1), (-5, -9), (-3, -7), (-1, 7), (-6, -9)\}$$

المجال: $\{-6, -5, -3, -1\}$

المدى: $\{-1, -9, -7, 7, -6\}$

ليست دالة لتكرار العنصر -6

ليست متباينة

لتكن $f(x) = 2x^2 - 8$ ، أوجد قيمة $f(6)$

$$f(6) = 2(6)^2 - 8$$

$$= 2(36) - 8$$

$$= 72 - 8$$

$$f(6) = 64$$

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 16 & 2 \\ -9 & 8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$ فأوجد كلاً مما يأتي إن أمكن:

$A + B$ (a)

$$A + B = \begin{bmatrix} 16-4 & 2-1 \\ -9-3 & 8-7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 1 \\ -12 & 1 \end{bmatrix}$$

أوجد قيمة كل محدّدة فيما يأتي:

$$\begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} \quad (a)$$

$$5(9) - (-4)(8)$$

$$45 + 32$$

$$= 77$$

أوجد النظير الضربي لكل مصفوفة فيما يأتي، إن وجد:

$$P = \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad (a)$$

$$\text{المحددة} = 7(-1) - (-5)(2) = -7 + 10 = 3$$

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

مراعاتي: "لا تستسلمي مهما بلغت عقبات طريقك من الصعوبة، فالكثير من فشلوا لم يدمركوا مدى

قهرهم من النجاح عندما استسلموا"

حل المعادلة: $x^2 - 10x - 11 = 0$ باستعمال القانون العام.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = 1 \quad b = -10 \quad c = -11$$

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{100 + 44}}{2}$$

$$x = \frac{10 \pm 12}{2}$$

$$x_1 = \frac{10 + 12}{2}$$

$$x_2 = \frac{10 - 12}{2}$$

$$x_1 = 11$$

$$x_2 = -1$$

استعمل القسمة التركيبية؛ لإيجاد ناتج: $(2x^3 - 13x^2 + 26x - 24) \div (x - 4)$.

$$\begin{array}{r} 4 \mid 2 \quad -13 \quad 26 \quad -24 \\ \downarrow \quad 8 \quad -20 \quad 24 \\ \hline 2x^2 \quad -5x \quad 6x \quad 0 \end{array}$$

$2x^2 - 5x + 6$

حدّد ما إذا كان $x - 5$ عاملاً من عوامل كثيرة الحدود $P(x) = x^3 - 7x^2 + 7x + 15$ أم لا، ثم أوجد عواملها الأخرى.

$$\begin{array}{r} 5 \mid 1 \quad -7 \quad 7 \quad 15 \\ \downarrow \quad 5 \quad -10 \quad -15 \\ \hline 1x^2 \quad -2x \quad -3 \quad 0 \end{array}$$

$x^2 - 2x - 3$

العوامل هي: $(x+1)(x-3)$.

صحيح أن رحلة النجاح شاقة، والطريق طويل، لكن بإمكاننا أن نستمتع في

الطريق إن أردنا ذلك، بالشغف، والإصرار.

معلمتك: أشواق الكحيلبي