

تم تحميل وعرض العادة من



موقع منهجي منصة تعليمية توفر كل ما يحتاجه المعلم والطالب من حلول الكتب الدراسية وشرح للدروس بأسلوب مبسط لكافة المراحل التعليمية وتوازيع المناهج وتحاضير وملخصات ونماذج اختبارات وأوراق عمل جاهزة للطباعة والتحميل بشكل مجاني


حمل تطبيق منهجي ليصلك كل جديد



EXPLORE IT ON
AppGallery

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

الرياضيات 1-2

التعليم الثانوي - نظام المسارات

السنة الثانية

قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

طبعة 1447 - 2025

ح) المركز الوطني للمناهج، ١٤٤٦هـ

المركز الوطني للمناهج
الرياضيات ١-٢ المرحلة الثانوية - نظام المسارات - السنة الثانية.
المركز الوطني للمناهج. - الرياض ، ١٤٤٦هـ
٢٣٦ ص ؛ ٢٧.٥ × ٢١ سـم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/١٧٣٤٣
ردمك: ٩٧٨ - ٦٠٣ - ٨٥٣٣ - ٤٨ - ٢

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثراية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





وزارة التعليم

Ministry of Education

2025 - 1447

المقدمة

تعد مادة الرياضيات من المواد الدراسية الأساسية التي تهيئة للطالب فرص اكتساب مستويات علية من الكفايات التعليمية، مما يتيح له تنمية قدرته على التفكير وحل المشكلات، ويساعده على التعامل مع مواقف الحياة وتلبية متطلباتها.

ومن منطلق الاهتمام الذي تواليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنمية الموارد البشرية، وعيًا بأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة، كان توجه وزارة التعليم نحو تطوير المناهج الدراسية وفي مقدمتها مناهج الرياضيات، بدءاً من المرحلة الابتدائية، تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، لإعداد مناهج تعليمية متطورة وسعيًا للارتقاء بمحررات التعليم لدى الطلاب، والوصول بهم إلى مصاف أقرانهم في الدول المتقدمة.

وتتميز هذه الكتب بأنها تتناول المادة بأساليب حديثة، تتوافر فيها عناصر الجذب والتشويق، التي تجعل الطالب يقبل على تعلمها ويتفاعل معها، من خلال ما تقدمه من تدريبات وأنشطة متنوعة، كما تؤكد هذه الكتب على جوانب مهمة في تعليم الرياضيات وتعلمها، تتمثل فيما يأتي:

- الترابط الوثيق بين محتوى الرياضيات وبين المواقف والمشكلات الحياتية في مختلف المجالات العلمية والصحية والمالية والتنموية وبرؤية المملكة ٢٠٣٠.
- تنوع طرائق عرض المحتوى بصورة جذابة مشوقة.
- إبراز دور المتعلم في عمليات التعليم والتعلم.
- الاهتمام بالمهارات الرياضية، والتي تعمل على ترابط المحتوى الرياضي وتجعل منه كلاً متكاملاً، ومن بينها: مهارات التواصل الرياضي، ومهارات الحس الرياضي، ومهارات جمع البيانات وتنظيمها وتفسيرها، ومهارات التفكير العليا.
- الاهتمام بتنفيذ خطوات أسلوب حل المشكلات، وتوظيف استراتيجياته المختلفة في كيفية التفكير في المشكلات الرياضية والحياتية وحلها.
- الاهتمام بتوظيف التقنية في المواقف الرياضية المختلفة.
- الاهتمام بتوظيف أساليب متنوعة في تقويم الطلاب بما يتناسب مع الفروق الفردية بينهم.

ولمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، فإن المناهج سوف توفر للمعلم مجموعة متكاملة من المواد التعليمية المتنوعة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بالإضافة إلى البرمجيات والموقع التعليمية، التي توفر للطالب فرصة توظيف التقنيات الحديثة والتواصل المبني على الممارسة، مما يؤكد دوره في عملية التعليم والتعلم.

ونحن إذ نقدم هذه الكتب لأعزائنا الطلبة، لنأمل أن تستحوذ على اهتمامهم، وتلبي متطلباتهم وتجعل تعلمهم لهذه المادة أكثر متعة وفائدة.

والله ولي التوفيق.



ستركز في دراستك هذا العام على عدة موضوعات رياضية، تشمل ما يأتي:

- الدوال وخصائصها.
- المتباينات وتمثيلها بيانياً.
- المصفوفات والعمليات عليها.
- كثيرات الحدود والعمليات عليها.
- نظرية الباقي والعوامل واستعمالهما.

وفي أثناء دراستك، ستعلم طرائق لحل المسائل الجبرية وتمثيلها بصور متعددة وسوف تفهم لغة الرياضيات وتستعمل أدواتها، وتنمي قدراتك الذهنية وتفكيرك الرياضي.



كيف تستعمل كتاب الرياضيات؟

- اقرأ فقرة **فيما سبق** لتعرف ارتباط هذا الدرس بما درسته من قبل، ولتعرف أفكار الدرس الجديد
اقرأ فقرة **والآن**.

- ابحث عن **المفردات** المظللة باللون الأصفر باللغتين العربية والإنجليزية ، واقرأ تعريف كل منها.
- راجع المسائل الواردة في **مثال** والمحلولة بخطوات تفصيلية؛ لتوضيح أفكار الدرس الرئيسية.
- **تذكّر** بعض المفردات التي تعلّمتها من قبل، بالرجوع إلى فقرة **مراجعة المفردات**

ارجع إلى المثال المشار إليه مقابل بعض التمارين في فقرتي **تأكد** و **تدريب وحل المسائل**.

ليساعدك

على حل هذه التمارين وما شابهها.

- استعن بأسئلة **تدريب على اختبار** للتعرف بعض أنماط أسئلة الاختبارات.
- ارجع إلى **مراجعة تراكمية** للتراجع أفكار الدروس السابقة.
- ارجع إلى **إرشادات للدراسة** حيث تجد معلومات وتجيئات تساعدك في متابعة الأمثلة المحلولة.
- ارجع إلى فقرة **قراءة الرياضيات** ؛ لتذكّر نطق بعض الرموز والمصطلحات الرياضية.
- ارجع إلى فقرة **تنبيه** دائمًا للتعرف الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الطلاب حول بعض المفاهيم الرياضية فتجتنبها.

• **نُفذ اختبار الفصل** في نهاية كل فصل، بعد أن تُراجع أفكار الدرس مستفيداً مما دوّنته

من أفكار في **المسطويات**

- استعن بصفحتي **الإعداد للامتحانات** ؛ للتعرف أنواع أسئلة الاختبارات وبعض طرق حلّها .
- **نُفذ الاختبار التراكمي** في نهاية كل فصل لمراجعة الأفكار الرئيسية للفصل وما قبله من فصول.





الفهرس

الدواال والمتباينات

الفصل
1


11	التهيئة للفصل 1
12	1-1 خصائص الأعداد الحقيقة
18	1-2 العلاقات والدواال
24	توسيع 1-2 معمل الجبر، الدوال المتضمنة والدواال المتضمنة
25	1-3 دوال خاصة
31	اختبار منتصف الفصل
32	1-4 تمثيل المتباينات الخطية ومتباينات القيمة المطلقة بيانياً
37	1-5 حل أنظمة المتباينات الخطية بيانياً
43	توسيع 1-5 معمل الحاسبة البيانية، أنظمة المتباينات الخطية
44	1-6 البرمجة الخطية والحل الأمثل
50	دليل الدراسة والمراجعة
55	اختبار الفصل
56	الإعداد للاختبارات المعيارية
58	اختبار تراكمي

المصفوفات

الفصل
2

61	التهيئة للفصل 2
62	2-1 مقدمة في المصفوفات
68	توسيع 2-1 معمل الجداول الإلكترونية، تنظيم البيانات
69	2-2 العمليات على المصفوفات
75	2-3 ضرب المصفوفات
82	اختبار منتصف الفصل
83	2-4 المحددات وقاعدة كرامر
91	2-5 النظير الضريبي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطية
97	توسيع 2-5 معمل الحاسبة البيانية، المصفوفات الموسعة
98	دليل الدراسة والمراجعة
101	اختبار الفصل
102	الإعداد للاختبارات المعيارية
104	اختبار تراكمي





3

كثيرات الحدود ودوالها

الفهرس

107	التهيئة للفصل 3
108	الأعداد المركبة
115	القانون العام والمميز
123	توسيع 3-2 معلم الجبر: مجموع الجذرين وحاصل ضربهما
125	العمليات على كثيرات الحدود
131	قسمة كثيرات الحدود
137	اختبار منتصف الفصل
138	دوال كثيرات الحدود
145	حل معادلات كثيرات الحدود
153	توسيع 3-6 معلم الحاسبة البيانية: حل متباينات كثيرات الحدود
154	نظريتا الباقي والعوامل
160	الجذور والأصفار
167	دليل الدراسة والمراجعة
171	اختبار الفصل
172	الإعداد للاختبارات المعيارية
174	اختبار تراكمي

4

177	التهيئة للفصل الرابع
178	العمليات على الدوال
185	4-2 العلاقات والدوال العكسية
190	توسيع 4-2 معلم الحاسبة البيانية: الدالة العكسية
191	4-3 دوال ومتباينات الجذر التربيعي
196	4-4 الجذر التوبي
201	توسيع 4-4 معلم الحاسبة البيانية: تمثيل دالة الجذر التوبي بيانياً
202	اختبار منتصف الفصل
203	4-5 العمليات على العبارات الجذرية
209	4-6 الأسس التسبية
215	4-7 حل المعادلات والمتباينات الجذرية
221	توسيع 4-7 معلم الحاسبة البيانية: حل المعادلات والمتباينات الجذرية
223	دليل الدراسة والمراجعة
228	اختبار الفصل
229	الإعداد للاختبارات المعيارية
231	اختبار تراكمي
234	الصيغ والرموز

الدواال والمتباينات

Functions and Inequalities

فيما سبق:

درست حل المعادلات والمتباينات الخطية.

والآن:

- استعمل معادلات العلاقات والدواال.
- أحل أنظمة المتباينات الخطية بيانياً.
- أحل مسائل من واقع الحياة مستعملاً البرمجة الخطية.

لماذا؟

مصنع: تسعى المصانع عادة لتحقيق أعلى ربح ممكن، ويطلب ذلك من إداراتها إتقان مهارات رياضية معينة لتخفيض التكلفة، وفي هذا الفصل ستتعلم كيفية زيادة الربح أو تقليل التكلفة لتحقيق أكبر ربح ممكن من خلال استعمال البرمجة الخطية.



الـ طويات

منظم أفكار



الدواال والمتباينات: اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم ملاحظاتك حول الدواال والمتباينات. مبتدئاً بثلاث أوراق من دفتر الملاحظات.

4 سُمّ طرف كل ورقة
برقم درس من دروس الفصل، واكتب عنوان الفصل.

3 قُص أطراف الأوراق، بحيث ترك سطرين من طرف الورقة الأولى و4 سطور من طرف الورقة الثانية وهكذا.

2 قُص الأوراق مع خط الطي، ثم ثبت أنصاف الأوراق السنت الناتجة لتحصل على كُتيب صغير.

1 اطو كل ورقة من المنتصف.





التهيئة للفصل 1

تشخيص الاستعداد:

أجب عن الاختبار الآتي ، وارجع إلى "المراجعة السريعة" : لمساعدتك على ذلك.

مراجعة سريعة

اختبار سريع

مثال 1

$$\text{أوجد ناتج: } \left(\frac{3}{16}\right) \left(-\frac{4}{5}\right)$$

اقسم العددان 16 ، 4 على
قاسمهما المشترك الأكبر (4)

$$\left(\frac{3}{16}\right) \left(-\frac{4}{5}\right) = \left(\frac{3}{16}\right) \left(-\frac{4}{5}\right)$$

→ اضرب البسطين
→ اضرب المقامين

$$= \left(\frac{3}{4}\right) \left(-\frac{1}{5}\right)$$

بسط

$$= \frac{-3}{20}$$

مثال 2


أوجد قيمة العبارة $3a^2 - 2ab + b^2$ إذا كانت:

$$b = -3, a = 4$$

$$\begin{aligned} 3a^2 - 2ab + b^2 &= 3(4^2) - 2(4)(-3) + (-3)^2 \\ &= 3(16) - 2(4)(-3) + 9 \\ &= 48 - (-24) + 9 \\ &= 48 + 24 + 9 \\ &= 81 \end{aligned}$$

مثال 3

مثل في المستوى الإحداثي $2 - y = 3x$ بيانياً.



كون جدولًا يتضمن قيمتين على الأقل للإحداثي x ، وأوجد الإحداثي y لكل منها، ثم كون أزواجًا مرتبة ومثلها بيانياً.

x	y	(x, y)
0	-2	(0, -2)
1	1	(1, 1)

أوجد الناتج في كل مما يأتي: (تستعمل مع الدروس 1-1 إلى 1-6)

$$-18.54 - (-32.05) \quad (2)$$

$$15.7 + (-3.45) \quad (1)$$

$$4 \div (-0.5) \quad (4)$$

$$(-9.8) (6.75) \quad (3)$$

$$\frac{54}{7} - \frac{26}{6} \quad (6)$$

$$3 \frac{2}{3} + \left(-1 \frac{4}{5}\right) \quad (5)$$

$$-3 \div \frac{7}{8} \quad (8)$$

$$\left(\frac{6}{5}\right) \left(-\frac{10}{9}\right) \quad (7)$$

(9) صناعات يدوية: تحتاج فاطمة إلى $\frac{7}{8}$ m من الخيوط لصنع رباط شعر، فكم متراً من الخيوط يلزمها لصنع 12 رباطاً؟

أوجد قيمة كل عبارة فيما يأتي إذا كانت:

(تستعمل مع الدروس 1-1 إلى 1-6) $a = -3, b = 4, c = -2$

$$2b - 5c \quad (11)$$

$$4a - 3 \quad (10)$$

$$\frac{2a + 4b}{c} \quad (13)$$

$$b^2 - 3b + 6 \quad (12)$$

(14) اتصالات: تستعمل إحدى شركات الاتصالات العبارة

$20 + 0.25m$ لإيجاد التكلفة بالريال لـ m من دقائق

الاتصال. أوجد تكلفة 80 دقيقة اتصال.

مثل في المستوى كل مستقيم مما يأتي بيانياً: (يستعمل مع الدروس 1-3 إلى 1-6)

$$x + y = 1 \quad (16)$$

$$y = 3 \quad (15)$$

$$x + 2y = 5 \quad (18)$$

$$3x - y = 6 \quad (17)$$

$$5x - 4y = 12 \quad (20)$$

$$y = 4x - 1 \quad (19)$$

(21) مشتريات: اشتري صلاح ثلاجة بالتقسيط، على أن يدفع 900 ريال دفعه أولى، ويدفع 400 ريال كل شهر. اكتب معادلة للمبلغ الكلي الذي سيدفعه بعد x شهراً، ثم مثلها بيانياً.

خصائص الأعداد الحقيقية

Properties of Real Numbers



لماذا؟
يبيع محل للأدوات الرياضية 3 أنواع من الكرات بالسعر نفسه. إن شراء عدة أنواع لكل منها السعر نفسه يسهل عليك إيجاد المبلغ الإجمالي للشراء، وذلك باستعمال خاصية توزيع الضرب على الجمع.

فيما سبق:

درست الأعداد الحقيقية، والعمليات عليها.
(مهارة سابقة)

والآن:

- أصنف الأعداد الحقيقة.
- أستعمل خصائص الأعداد الحقيقة لتبسيط قيم العبارات الجبرية.

المفردات

الأعداد الحقيقة
real numbers
الأعداد النسبية
rational numbers
الأعداد غير النسبية
irrational numbers
الأعداد الصحيحة
integers
الأعداد الكلية
whole numbers
الأعداد الطبيعية
natural numbers

مفهوم أساسي

الأعداد الحقيقة (R)

اضف إلى مطويتك

أمثلة	المجموعة	الرمز
$0.125, -\frac{7}{8}, \frac{2}{3} = 0.66\dots$	الأعداد النسبية	Q
$\pi = 3.14159\dots$ $\sqrt{3} = 1.73205\dots$	الأعداد غير النسبية	I
-5, 17, -23, 8	الأعداد الصحيحة	Z
2, 96, 0, $\sqrt{36}$	الأعداد الكلية	W
3, 17, 6, 86	الأعداد الطبيعية	N

الأعداد الحقيقة R

تصنيف الأعداد

مثال 1

حدّد مجموعات الأعداد التي يتبعها كل عدد مما يأتي:

- (a) 23 - مجموعة الأعداد الصحيحة (Z)، مجموعة الأعداد النسبية (Q)، مجموعة الأعداد الحقيقة (R)
- (b) $\sqrt{50}$ - مجموعة الأعداد غير النسبية (I)، مجموعة الأعداد الحقيقة (R)
- (c) $-\frac{4}{9}$ - مجموعة الأعداد النسبية (Q)، مجموعة الأعداد الحقيقة (R)

تحقق من فهمك



$$-\frac{6}{7} \quad (1D)$$

$$\sqrt{95} \quad (1C)$$

$$-\sqrt{49} \quad (1B)$$

$$-185 \quad (1A)$$

إرشادات للدراسة

تصنيف الأعداد

يمكن أن ينتمي العدد إلى أكثر من مجموعة أعداد، فمثلاً يُعد أي عدد طبيعي عدداً كلّياً وصحيحاً، ونسبة، و حقيقياً.

خصائص الأعداد الحقيقة: يلخص الجدول الآتي بعض خصائص الأعداد الحقيقة:

أضف إلى
مطويتك

ملخص المفهوم

خصائص الأعداد الحقيقة

لأي أعداد حقيقة a, b, c فإن:

الضرب	الجمع	الخاصية
$a \cdot b = b \cdot a$	$a + b = b + a$	التبديلية
$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$(a + b) + c = a + (b + c)$	التجميلية
$a \cdot 1 = a = 1 \cdot a$	$a + 0 = a = 0 + a$	العنصر المحايد
$a \cdot \frac{1}{a} = 1 = \frac{1}{a} \cdot a, a \neq 0$	$a + (-a) = 0 = (-a) + a$	الناظير
$(a \cdot b)$ عدد حقيقي	$(a + b)$ عدد حقيقي	الانغلاق
$a(b + c) = ab + ac, (b + c)a = ba + ca$		التوزيع

تمييز خصائص الأعداد الحقيقة

مثال 2

ما الخاصية الموضحة في: $5 \cdot (4 \cdot 13) = (5 \cdot 4) \cdot 13$ ؟

الخاصية التجميلية في عملية الضرب.

وتنص الخاصية التجميلية لعملية الضرب على أن ناتج الضرب لا يتغير بالطريقة التي يتم بها تجميع العوامل.

تحقق من فهمك

$$? 2(x + 3) = 2x + 6 \quad (2)$$

يمكنك إيجاد الناظير الجمعي لأي عدد، والناظير الضريبي لأي عدد حقيقي لا يساوي الصفر.

الناظير الجمعي والناظير الضريبي

مثال 3

أوجد الناظير الجمعي والناظير الضريبي للعدد $-\frac{5}{8}$.

بما أن $0 = \frac{5}{8} - \frac{5}{8}$ ، فإن الناظير الجمعي للعدد $-\frac{5}{8}$ هو $\frac{5}{8}$.

وبما أن $1 = \left(-\frac{5}{8}\right) \left(-\frac{8}{5}\right)$ ، فإن الناظير الضريبي للعدد $-\frac{5}{8}$ هو $\frac{8}{5}$.

إرشادات للدراسة

الناظير الجمعي
والناظير الضريبي

إشارة الناظير الجمعي
لعدد هي عكس إشارة
ذلك العدد، أما إشارة
الناظير الضريبي لعدد
 فهي ذاتها إشارة ذلك
العدد.

تحقق من فهمك

$$2\frac{1}{2} \quad (3B)$$

$$1.25 \quad (3A)$$



تتطلب الكثير من التطبيقات الحياتية التعامل مع الأعداد الحقيقة.

خاصية التوزيع

مثال 4 من واقع الحياة

السعر (ريال)	الجهاز أو الملحق
1000	حاسوب
600	شاشة
500	آلة طابعة
150	كاميرا رقمية
300	برمجيات ملحقة

مبيعات: يبين الجدول المجاور أسعار جهاز حاسوب وملحقاته في أحد العروض. فإذا زاد السعر الأصلي للجهاز وملحقاته، بنسبة 6% فأوجد قيمة هذه الزيادة.

يمكن إيجاد قيمة هذه الزيادة بطريقتين هما:

الطريقة 1: اضرب ثم اجمع.

اضرب كل قيمة في 6%， أو 0.06، ثم اجمع.

$$\begin{aligned} T &= 0.06(1000) + 0.06(600) + 0.06(500) + 0.06(150) + 0.06(300) \\ &= 60 + 36 + 30 + 9 + 18 \\ &= 153 \end{aligned}$$

الطريقة 2: اجمع ثم اضرب.

أوجد السعر الكلي لجهاز الحاسوب وملحقاته قبل الزيادة، ثم اضربه في العدد 0.06

$$\begin{aligned} T &= 0.06(1000 + 600 + 500 + 150 + 300) \\ &= 0.06(2550) \\ &= 153 \end{aligned}$$

ف تكون قيمة الزيادة 153 ريالاً. لاحظ أن النتيجة متساوية في الطريقتين.



الربط مع الحياة

زادت ملحقات أجهزة الحاسوب على نحو مطرد في السنوات الأخيرة، حتى أصبح الحاسوب يقوم مقام الكثير من الأجهزة الإلكترونية كآلات التصوير والتسجيل وغيرها.

ساعات العمل	اليوم
4	الأحد
3	الاثنين
2.5	الثلاثاء
3	الأربعاء
4	الخميس

تحقق من فهمك

(4) أعمال: يتلقى أحمد 20 ريالاً عن كل ساعة عمل في محل تجاري. فإذا كانت ساعات عمله في أحد الأسبوع هي 4, 3, 2.5, 3, 4 ، فما المبلغ الذي حصل عليه أحمد في ذلك الأسبوع؟

يمكنك استعمال خصائص الأعداد الحقيقة لتبسيط العبارات الجبرية.

تبسيط العبارات الجبرية

مثال 5

بسط العبارة: $3(2q + r) + 5(4q - 7r)$

خاصية التوزيع
اضرب
الخاصية التبديلية للجمع
خاصية التوزيع
بسط

$$\begin{aligned} 3(2q + r) + 5(4q - 7r) &= 3(2q) + 3(r) + 5(4q) - 5(7r) \\ &= 6q + 3r + 20q - 35r \\ &= 6q + 20q + 3r - 35r \\ &= (6 + 20)q + (3 - 35)r \\ &= 26q - 32r \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

$$.3(4x - 2y) - 2(3x + y) \quad (5)$$



مثال 1 حدد مجموعات الأعداد التي يتسمى إليها كل عدد مما يأتي:

$$-12 \quad (4)$$

$$\sqrt{11} \quad (3)$$

$$\frac{5}{4} \quad (2)$$

$$62 \quad (1)$$

مثال 2 ما الخاصية الموضحة في كل مما يأتي؟

$$7(9 - 5) = 7 \cdot 9 - 7 \cdot 5 \quad (6)$$

$$(6 \cdot 8) \cdot 5 = 6 \cdot (8 \cdot 5) \quad (5)$$

$$(12 + 5)6 = 12 \cdot 6 + 5 \cdot 6 \quad (8)$$

$$84 + 16 = 16 + 84 \quad (7)$$

مثال 3 أوجد النظير الجمعي والنظير الضريبي لكل عدد مما يأتي:

$$\sqrt{5} \quad (12)$$

$$3.8 \quad (11)$$

$$\frac{4}{9} \quad (10)$$

$$-7 \quad (9)$$

السعر (₼)	الصنف
40	قميص
60	بنطال
100	ثوب
200	معطف

مثال 4 **(13) تخفيفات:** يبين الجدول المجاور أسعار أربعة أصناف من الملابس في أحد العروض. فإذا زاد السعر الأصلي لكل منها بنسبة 8% فأوجد قيمة هذه الزيادة.

مثال 5 بسط كل عبارة مما يأتي:

$$6(6a + 5b) - 3(4a + 7b) \quad (15)$$

$$5(3x + 6y) + 4(2x - 9y) \quad (14)$$

$$-5(8x - 2y) - 4(-6x - 3y) \quad (17) \quad -4(6c - 3d) - 5(-2c - 4d) \quad (16)$$

تدريب وحل المسائل

مثال 1 حدد مجموعات الأعداد التي يتسمى إليها كل عدد مما يأتي:

$$0.\overline{61} \quad (21)$$

$$\sqrt{25} \quad (20)$$

$$-8.13 \quad (19)$$

$$-\frac{4}{3} \quad (18)$$

$$\sqrt{17} \quad (25)$$

$$\frac{21}{7} \quad (24)$$

$$-\sqrt{144} \quad (23)$$

$$\frac{9}{3} \quad (22)$$

مثال 2 ما الخاصية الموضحة في كل مما يأتي؟

$$8\sqrt{11} + 5\sqrt{11} = (8 + 5)\sqrt{11} \quad (27)$$

$$-7y + 7y = 0 \quad (26)$$

$$\left(\frac{22}{7}\right)\left(\frac{7}{22}\right) = 1 \quad (29)$$

$$(16 + 7) + 23 = 16 + (7 + 23) \quad (28)$$

مثال 3 أوجد النظير الجمعي والنظير الضريبي لكل عدد مما يأتي:

$$-0.25 \quad (32)$$

$$12.1 \quad (31)$$

$$-8 \quad (30)$$

$$\sqrt{15} \quad (35)$$

$$-\frac{3}{8} \quad (34)$$

$$\frac{6}{13} \quad (33)$$

مثال 4 **(36) ترشيد:** يبين الجدول المجاور أوجه إنفاق إحدى الأسر خلال شهر.

إذا قررت الأسرة ترشيد إنفاقها بنسبة 15% من كل وجه لشراء سيارة جديدة، فما مقدار ما تتوفره في الشهر؟

وجه الإنفاق	المبلغ (₼)
الطعام والشراب	3000
المواصلات	1000
الفواتير	500
أخرى	750

مثال 5

بسط كل عبارة مما يأتي:

(38) $-2a + 9d - 5a - 6d$

(37) $8b - 3c + 4b + 9c$


(40) $6(9a - 3b) - 8(2a + 4b)$

(39) $4(4x - 9y) + 8(3x + 2y)$

(42) $-5(10x + 8z) - 6(4x - 7z)$

(41) $-2(-5g + 6k) - 9(-2g + 4k)$

(43) **كرة قدم :** وضح خاصية التوزيع من خلال كتابة عبارتين تمثلان مساحة الملعب في الشكل أدناه. ثم أوجد مساحته.



(44) **تحفيضات:** يبين الجدول المجاور أسعار بعض الأجهزة الكهربائية في محل. فإذا انخفض سعر كل منها بنسبة 30%， وأراد أحمد أن يشتري من ذلك المحل جهاز تسجيل ومكنسة ومروحة.

السعر (₪)	نوع السلعة
170	جهاز تسجيل
350	مكنسة
110	مروحة

a) وضح خاصية التوزيع من خلال كتابة عبارتين تمثل كل منهما المبلغ الذي سيدفعه أحمد.

b) احسب المبلغ الذي سيدفعه أحمد بطريقتين مختلفتين مستعملاً خصائص العمليات على الأعداد.

بسط كل عبارة مما يأتي:

(46) $\frac{2}{5}(6c - 8d) + \frac{3}{4}(4c - 9d)$

(45) $\frac{1}{3}(5x + 8y) + \frac{1}{4}(6x - 2y)$

(48) $-9(3x + 8y) - 3(5x + 10z)$

(47) $-6(3a + 5b) - 3(6a - 8c)$

(49) **ديكور:** يريد محمد شراء 5 ستائر لنوافذ منزله: نافذتان كبيرتان، و 3 نوافذ صغيرة . فإذا كانت النافذة الكبيرة تحتاج إلى ستارة طولها $\frac{3}{4}m$ من القماش، في حين تحتاج النافذة الصغيرة إلى ستارة طولها $\frac{1}{3}m$ من القماش.

a) كم متراً من القماش يحتاج إليه محمد؟

b) استعمل خصائص الأعداد الحقيقة لتبيّن كيف يمكن لمحمد حساب كمية القماش التي يحتاج إليها ذهنياً.

(50) **تمثيلات متعددة:** مستعملاً الأعداد: $-\sqrt{6}, 3, -\frac{15}{3}, 4.1, \pi, 0, \frac{3}{8}, \sqrt{36}$

أجب عمما يأتي:

a) **جدولياً:** نظم هذه الأعداد في جدول وفقاً لمجموعة الأعداد التي تتبعها.

b) **جبرياً:** اكتب كل عدد من الأعداد أعلاه على الصورة العشرية، ثم رتبها تصاعدياً.

c) **بيانياً:** مثل هذه الأعداد على خط الأعداد.

d) **لفظياً:** اكتب تخميناً حول ترتيب الأعداد الحقيقة باستعمال الصورة العشرية لها.



مسائل مهارات التفكير العليا

(51) ما العدد المختلف عن باقي الأعداد؟ وضح إجابتك.

$\sqrt{81}$

$\sqrt{67}$

$\sqrt{35}$

$\sqrt{21}$

(52) تحدّ: أوجد قيمة العبارة $w = 12(5r + 6t) + 30r + 36t$ بدلالة w ، علماً بأن

(53) اكتشف الخطأ: بسطت كل من فاطمة وخدية العبارات: $4(14a - 10b) - 6(b + 4a)$. فهل أيٌّ منها تبسيطها صحيح؟ وضح إجابتك.

خدية

$$\begin{aligned} &4(14a - 10b) - 6(b + 4a) \\ &= 56a - 40b - 6a - 24b \\ &= 50a - 64b \end{aligned}$$

فاطمة

$$\begin{aligned} &4(14a - 10b) - 6(b + 4a) \\ &= 56a - 40b - 6b + 24a \\ &= 80a - 46b \end{aligned}$$

(54) تبرير: هل العبارة الآتية صحيحة أحياناً، أو صحيحة دائماً، أو غير صحيحة أبداً. وضح إجابتك.
"العدد غير النسبي يتضمن رمز الجذر".

(55) مسألة مفتوحة: حدد إذا كانت خاصية الانغلاق للضرب تنطبق على الأعداد غير النسبية. وإذا لم تكن كذلك، فأعط مثلاً مضاداً.

(56) اكتب: اشرح وأعطي أمثلة توضح أن عمليتي الطرح والقسمة لا تتحققان الخاصية التبديلية.

تدريب على اختبار

(58) ما أبسط صورة للعبارة: $?2(x - y) - 3(y - 2x)$

$-4y$ C

$-4x - 5y$ D

$5x - 8y$ A

$8x - 5y$ B

(57) ما الحد العاشر في المتتابعة ... 2, 4, 7, 11, 16, ...

56 C

72 D

46 A

67 B

مراجعة تراكمية

(59) أوجد قيمة: $8(4 - 2)^3$. (مهارة سابقة)

أوجد ناتج الضرب في كل مما يأتي: (مهارة سابقة)

$(b - 7)(b - 3)$ (61)

$(x + 2)(x - 3)$ (60)

أوجد قيمة كل مما يأتي؛ علماً بأن $a = 3$, $b = \frac{2}{3}$, $c = -1.7$. (مهارة سابقة)

$\frac{a \cdot b}{c}$ (63)

$\frac{1}{6}b + 1$ (62)





العلاقات والدوال

Relations and Functions

1-2

فيما سبق:

درست تحديد كل من مجال ومدى علاقة معطاة. (مهارة سابقة)

والآن:

- أحل العلاقات والدوال.
- استعمل معادلات العلاقات والدوال.

المفردات

الدالة المتباعدة
one-to-one function

العلاقة المنفصلة
discrete relation

العلاقة المتصلة
continuous relation

اختبار الخط الرأسي
vertical line test

المتغير المستقل
independent variable

المتغير التابع
dependent variable

رمز الدالة
function notation

إرشادات للدراسة

العلاقة: تمثل العلاقة عادة على شكل أزواج مرتبة (y, x) . كما يمكن وصفها بعدة طرق أخرى، منها المخطط السهمي، والجدول، والت berhasilي.

المجال: مجموعة إحداثيات x في الأزواج المرتبة الممثلة للعلاقة.

المدى: مجموعة إحداثيات y في الأزواج المرتبة الممثلة للعلاقة.

معدل درجات الحرارة الشهرية ($^{\circ}\text{C}$) في مدينة الرياض													
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	إبريل	مارس	فبراير	يناير	الشهر
11	15	21	26	29	29	28	26	20	15	11	9	9	الدنيا
22	27	35	40	43	43	42	39	33	27	23	20	20	العليا

العلاقات والدوال: تذكر أن الدالة هي علاقة يرتبط فيها كل عنصر في المجال بعنصر واحد فقط في المدى.

مطويتك

اضف إلى

مفهوم أساسى

الدالة المتباعدة

المجال
 1
 2
 3

المدى
 D
 B
 A

الدالة المتباعدة: هي دالة يرتبط فيها كل عنصر من المجال بعنصر مختلف من المدى، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يرتبط عنصران من المجال بالعنصر نفسه من المدى.

مثال 1 المجال والمدى

حدّد مجال كلّ علاقة فيما يأتي ومدتها، وبين ما إذا كانت دالة أم لا، وإذا كانت كذلك فهل هي متباعدة أم لا؟

$$\{(-6, -1), (-5, -9), (-3, -7), (-1, 7), (-6, -9)\} \quad (\text{a})$$

$$\text{المجال} = \{-9, -7, -1, 7\} \quad \text{المدى} = \{-6, -5, -3\}$$

هل هي دالة: لا، لأن العنصر 6 في المجال ارتبط بكل من العنصرين 9، -1 في المدى.

$$\text{المجال} = \{-2, -1, 2, 3\}$$

$$\text{المدى} = \{-2, -1, 0, 4\}$$

هذه العلاقة دالة؛ لأن كل عنصر في المجال ارتبط بعنصر واحد فقط من المدى. وهي متباعدة؛ لأن كل عنصر من المدى ارتبط بعنصر واحد فقط من المجال.

وزارة التعليم


Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 1 الدوال والمتباينات 18


تحقق من فهمك




(1B)




(1A)



العلاقة التي يكون فيها المجال مجموعة من العناصر المنفردة، وتمثل بيانياً بنقاطٍ منفصلة، مثل العلاقة A أدناه تسمى **علاقة منفصلة**. لاحظ أن تمثيلها البياني يتكون من نقاط غير متصلة، والعلاقة التي يكون مجالها فترة جزئية من الأعداد الحقيقة وأمكن تمثيلها بيانياً بمستقيم أو بمنحنى متصل مثل العلاقة B أدناه، فإنها تكون **علاقة متصلة**.



علاقة متصلة



علاقة منفصلة

إرشادات للدراسة

العلاقة المتصلة

يمكنك تمثيل العلاقة المتصلة بيانياً دون رفع القلم عن الورقة.

يمكنك استعمال **اختبار الخط الرأسي** مع كل من العلاقات المتصلة والمنفصلة لمعرفة إذا كانت العلاقة دالة أم لا.

أضف إلى
مطويتي



اختبار الخط الرأسي

مفهوم أساسى



إذا قطع خط رأسي التمثيل البياني للعلاقة في أكثر من نقطة فالعلاقة ليست دالة.


التعبير اللفظي: إذا لم يقطع أي خط رأسي التمثيل البياني للعلاقة بأكثر من نقطة، فالعلاقة دالة.



النموذج:

تمييز العلاقة

مثال 2 من واقع الحياة



حوادث المرور: يبين التمثيل البياني المجاور أعداد الوفيات في إحدى مدن المملكة نتيجة الحوادث المرورية من عام 1433 هـ إلى عام 1437 هـ، هل العلاقة التي تمثلها منفصلة أم متصلة؟ وهل تمثل دالة؟

بما أن التمثيل البياني مكون من نقاط منفصلة، فالعلاقة منفصلة. وباستعمال اختبار الخط الرأسى نلاحظ أنه لا يمكن رسم أي خط رأسى يمر بأكثر من نقطة من نقاط التمثيل، إذن فالعلاقة تمثل دالة.



الربط مع الحياة

هل تعلم أن لكل 8 حوادث مرورية في المملكة العربية السعودية يحدث 6 إصابات، بينما النسبة العالمية لإصابة واحدة لكل 8 حوادث 19

تحقق من فهمك

- (2) **عمال:** إذا كان عدد العاملين في إحدى المؤسسات في الأعوام من 1433 هـ إلى 1438 هـ على الترتيب هو: 33, 34, 35, 36, 37, 38. مثل هذه البيانات بيانياً، وهل العلاقة التي تمثلها هذه البيانات منفصلة أم متصلة. وهل تمثل دالة؟

معادلات العلاقات والدوال: يمكنك تمثيل العلاقات والدوال بمعادلات، وقيم المتغيرين y , x في المعادلة هي مجموعة الأزواج المرتبة (y, x) التي تحقق المعادلة. ومن السهل في أغلب الأحيان تحديد إذا كانت المعادلة تمثل دالة من خلال تمثيلها البياني.

إرشادات للدراسة

تمثيل الدالة بيانياً

لتتمثل دالة ما بيانياً، أولاً يجب أن تحدد مجالها (جميع قيم x التي تكون عندها الدالة معرفة أي قيم x التي تكون عندها $f(x)$)، وهذا يمكنك من معرفة بعض الأزواج المرتبة التي تسهل عليك تمثيل الدالة بيانياً. ثم تحدد مداها (جميع قيم y التي تقابل قيم x) ويكون من السهل إيجاد المدى من التمثيل البياني، ومن الجدير بالذكر أن المجال والمدى لجميع الدوال الخطية هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

تمثيل العلاقة بيانياً

مثال 3

مثل المعادلة $3 - \frac{1}{2}x = y$ بيانياً، ثم حدد مجالها ومداها، وحدد ما إذا كانت تمثل دالة أم لا، وإذا كانت كذلك، فهل هي متباينة أم لا؟ ثم حدد ما إذا كانت منفصلة أم متصلة. كون جدولًا لبعض القيم التي تتحقق المعادلة، ثم مثل المعادلة بيانياً.


مجال هذه العلاقة ومداها هو مجموعة الأعداد الحقيقية،

لأن أي عدد حقيقي يمكن أن يكون الإحداثي x لنقطة ما على المستقيم، كما أن أي عدد حقيقي أيضًا يمكن أن يكون الإحداثي y لنقطة ما على المستقيم.

التمثيل البياني للعلاقة يحقق اختبار الخط الرأسى؛ لذا فإن المعادلة تمثل دالة؛ لأن كل قيمة $-x$ ترتبط بقيمة واحدة فقط $-y$ ،

وحيث إن كل قيمة $-y$ مرتبطة بقيمة واحدة فقط $-x$ ، لذا فالدالة متباينة.

وبما أن التمثيل البياني عبارة عن مستقيم متصل دون انقطاع، فالدالة متصلة.



x	y
-4	-5
-2	-4
0	-3
2	-2
4	-1

تحقق من فهمك

$$y = x^2 + 1 \quad (3)$$

إذا كانت المعادلة تمثل دالة، فإن المتغير من المجال (غالباً ما يكون x)، يسمى **المتغير المستقل**. والمتغير الثاني (غالباً ما يكون y)، يسمى **المتغير التابع** لأن قيمه تعتمد على قيم المتغير x .

المعادلات التي تمثل دوال تكتب عادة باستعمال **رمز الدالة**. فالمعادلة $1 - 5x = y$ يمكن كتابتها على الصورة $f(x) = 5x - 1$. وإذا أردنا إيجاد قيمة في المدى ترتبط بالعنصر -6 في مجال الدالة f ، فإن هذه القيمة هي $f(-6)$ ويمكن إيجادها بالتعويض عن كل x في المعادلة بالعدد -6 ؛ لذا فإن $-31 = 1 - 5(-6) = f(-6)$.

قراءة الرياضيات

رمز الدالة

يُستخدم الرمز $f(x)$ للدوال بدلاً من y ، ويقرأ f لـ x ؛ حيث f هو اسم الدالة وليس متغيراً مضروبياً في x .

مثال 4

إيجاد قيمة الدالة

لتكن $8 - 2x^2 = f(x)$ ، أوجد قيمة كلٌّ مما يأتي:

$f(2y)$ (b)

$$\begin{array}{ll} \text{الدالة الأصلية} & f(x) = 2x^2 - 8 \\ \text{عُوض} & f(2y) = 2(2y)^2 - 8 \\ (2y)^2 = 2^2y^2 & = 2(4y^2) - 8 \\ \text{بسط} & = 8y^2 - 8 \end{array}$$

$f(6)$ (a)

$$\begin{array}{ll} \text{الدالة الأصلية} & f(x) = 2x^2 - 8 \\ \text{عُوض} & f(6) = 2(6)^2 - 8 \\ 6^2 = 36 & = 2(36) - 8 \\ \text{بسط} & = 72 - 8 = 64 \end{array}$$

تحقق من فهمك

$$g(x) = 0.5x^2 - 5x + 3.5$$

$g(4a)$ (4B)


$g(2.8)$ (4A)

تأكد


حدد مجال كل علاقة فيما يأتي ومداها، وبيان ما إذا كانت دالة أم لا، وإذا كانت كذلك، فهل هي متباينة أم لا؟

x	y
-2	-4
1	-4
4	-2
8	6

(3)



(2)



(1)

متوسط عدد الأهداف في الموسم الواحد	متوسط أعمار الفريق	الموسم
16.2	22	1434-1435
24.1	23	1435-1436
27.2	24	1436-1437
23.5	25	1437-1438

(4) كرية قدم: يبين الجدول المجاور متوسط عدد الأهداف التي أحرزها فريق كرة قدم في مبارياته خلال 4 مواسم ومتوسط أعمار الفريق في كل موسم.

مثال 2

- (a) مثل البيانات الواردة في الجدول بيانياً، على أن يمثل المحور الأفقي متوسط أعمار الفريق، والمحور الرأسى متوسط عدد الأهداف في كل مباراة.
- (b) حدد كلًا من المجال والمدى.
- (c) هل العلاقة التي تمثل البيانات منفصلة أم متصلة؟
- (d) هل تمثل العلاقة دالة أم لا؟ وضح إجابتك.

مثل كلَّ معادلة فيما يأتي بيانياً، ثم حدد مجالها، ومداها، وحدَّد ما إذا كانت تمثل دالة أم لا، وإذا كانت كذلك، فهل هي متباينة أم لا؟ ثم حدد إذا كانت منفصلة أم متصلة.

$$x = 7 \quad (8)$$

$$y = 3x^2 \quad (7)$$

$$y = -4x - 2 \quad (6)$$

$$y = 5x + 4 \quad (5)$$

أوجد قيمة كلٌّ مما يأتي:

$$f(x) = -4x - 8 \quad (9) \quad \text{إذا كانت } f(-3) = -8$$

مثال 3



$$g(x) = -2x^2 - 4x + 1 \quad (10) \quad \text{إذا كانت } g(5) = 1$$


مثال 4

تدريب وحل المسائل

حدّد مجال كل علاقة فيما يأتي ومداها، وبين ما إذا كانت دالة أم لا، وإذا كانت كذلك، فهل هي متباينة أم لا؟

(13) $\{(3, -4), (-1, 0), (3, 0), (5, 3)\}$

المنطقة الإدارية	عدد الذكور	عدد الإناث
المدينة المنورة	1194428	938251
حائل	386210	313564
تبوك	511413	398617
الجوف	289414	219061



(12) $x \quad y$ (11)

-0.3	-6
0.4	-3
1.2	-1


(14) **سكان:** يبيّن الجدول المجاور عدد الذكور وعدد الإناث في 4 مناطق إدارية مختلفة في المملكة لعام 1438هـ.

(a) مثل البيانات الواردة في الجدول بيانيًا على يمثل المحور الأفقي عدد الذكور والمحور الرأسي عدد الإناث.

(b) حدّد كلاً من المجال والمدى.

(c) هل العلاقة التي تمثل البيانات منفصلة أم متصلة؟

(d) هل تمثل العلاقة دالة أم لا؟ وضح إجابتك.



(15) **علاج:** يبيّن التمثيل البياني المجاور أعداد مراجعي أحد مستشفيات الإدمان، هل العلاقة التي يمثلها اللون الأزرق منفصلة أم متصلة؟ وهل تمثل دالة؟

مثال 1

مثال 2



الربط مع الحياة

أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: رقم مركز استشارات الإدمان (1955)، ضمن برامج المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس.

مثال 3

مثال 4

مثل كل معادلة فيما يأتي بيانيًا، ثم حدّد مجالها ومداها، وحدّد إذا كانت تمثل دالة أم لا، وإذا كانت كذلك، فهل هي متباينة أم لا؟ ثم حدّد إن كانت منفصلة أم متصلة.

(17) $y = 4x^2 - 8$

(16) $y = -5x^2$

أو جد قيمة كلٍ مما يأتي:

(19) $f(x) = 16x^2$ إذا كانت دالة

(18) $f(x) = 5x^3 + 1$ إذا كانت دالة

الضغط	العمق (ft)
4	3.4
3.4	2.8
2.8	2.2
2.2	1.6
1.6	1
1	0
0	20
20	40
40	60
60	80
80	100

(20) **غوص:** يبيّن الجدول المجاور مقدار الضغط الواقع

على الغواص عند أعمق معينة تحت سطح الماء:

(a) مثل العلاقة بيانيًا.

(b) حدّد كلاً من مجال العلاقة ومداها، وهل هي منفصلة أم متصلة؟

(c) هل هذه العلاقة دالة أم لا؟ وضح إجابتك.

إذا كانت $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = -2x^2$, $h(x) = -4x^2 - 2x$, فأوجد قيمة كلٍ مما يأتي:

(23) $h(8)$

(22) $h(3)$

(21) $g(-6)$

(26) $h\left(\frac{1}{5}\right)$

(25) $g\left(\frac{3}{2}\right)$

(24) $f\left(\frac{2}{3}\right)$

(27) **تمثيلات متعددة:** ستكتشف في هذا السؤال الدوال المتباينة.

(a) بيانيًا: مثل كل دالة مما يأتي بيانيًا:

$f(x) = x^2$

$g(x) = 2^x$

$h(x) = -x^2$

$j(x) = x^2 + 2$

(b) جدولياً: استعمل التمثيلات البيانية في الفرع a لعمل جدول يبيّن عدد المرات الممكن أن يقطع فيها أي خط أفقي، التمثيل البياني لكل دالة مما سبق.

(c) تحليلياً: حتى تكون الدالة متباينة يجب ألا يقطع أي خط أفقي تمثيلها البياني في أكثر من نقطة واحدة. أي الدوال السابقة تحقق هذا الشرط وأيها لا تتحقق؟

(d) جدولياً: كون جدولًا، وصنف فيه الدوال السابقة إلى متباينة أو غير متباينة.



الربط مع الحياة

الضغط الواقع على الغواص عندما يكون على عمق 10 أمتار تحت الماء يعادل ضعف الضغط الجوي على السطح تقريبًا.

(28) يملك فهد 800 ريال، فإذا قرر أن يضيف إلى هذا المبلغ 200 ريال شهرياً، فإن الدالة $p(t) = 800 + 200t$ تمثل مقدار ما معه من نقود $p(t)$ بعد t شهراً. فكم يكون معه بعد 8 أشهر؟

مسائل مهارات التفكير العليا

(29) اكتشف الخطأ: أوجد كل من أحمد و خالد قيمة $f(3d)$ حيث $f(x) = -4x^2 - 2x + 1$.

خالد

$$f(3d) = -4(3d)^2 - 2(3d) + 1 \\ = 12d^2 - 6d + 1$$

أحمد

$$f(3d) = -4(3d)^2 - 2(3d) + 1 \\ = -4(9d^2) - 6d + 1 \\ = -36d^2 - 6d + 1$$

(30) مسألة مفتوحة: مثل كلاً من العلاقات الآتية بيانياً:

(a) سرعة سيارة متوجهة نحو نقطة معينة و زمنها إذا علمت أنها توقفت عند إشارتين ضوئيتين.

(b) طول شخص و عمره في الفترة من 5 سنوات إلى 60 سنة.

(c) درجة الحرارة في أحد الأيام خلال الفترة من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً.

(31) تحد: إذا كانت $f(a) = 19, g(a) = 33, f(b) = 31, g(b) = 51$. وكانت $a = 5, b = 8$ فأوجد دالتين $f(x), g(x)$ تتحققان المعطيات السابقة.

(32) اكتب: وضح كيف يحدد اختبار الخط الرأسى إذا كانت العلاقة دالة أم لا.

تدريب على اختبار

(34) إذا كان $x^2 = g(x+1)$ ، فأى عبارة مما يأتي تساوى

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 A | $x^2 + 1$ B |
| $x^2 + 2x + 1$ C | $x^2 - x$ D |

(33) تحتوي بركة سباحة على 19500 جالون من الماء إذا تم تفريغها بمعدل 6 جالونات لكل دقيقة. فأى المعادلات الآتية تمثل عدد جالونات الماء g المتبقية في البركة بعد m دقيقة؟

$g = \frac{19500}{6m}$ C	$g = 19500 - 6m$ A
$g = \frac{6m}{19500}$ D	$g = 19500 + 6m$ B

مراجعة تراكمية

بسط كل عبارة فيما يأتي: (الدرس 1-1)

$$-7(2c - 4d) + 8(3c + d) \quad (37)$$

$$-4(5x - 3y) + 2(y + 3x) \quad (36)$$

$$6(3a - 2b) + 3(5a + 4b) \quad (35)$$

حل كل معادلة فيما يأتي، ثم تحقق من صحة الحل: (الدرس 1-1)

$$10y - 5 - 3y = 4(2y + 3) - 20 \quad (40)$$

$$8d - 4 + 3d = 2d - 100 - 7d \quad (39)$$


$$4(2y - 3) + 5(3y + 1) = -99 \quad (38)$$



الدواال المنفصلة والدواال المتصلة



سعر عبوات العصير



تباع عبوة العصير الواحدة من أحد الأنواع بسعر 2 ريال، ويمكن إيجاد سعر x عبوة عصير باستعمال الدالة المتصلة $y = 2x$ حيث y السعر الكلي بالريال. ويمكن تمثيل هذه الدالة بيانيًّا كما هو موضح في التمثيل المجاور.

بالنظر إلى التمثيل البياني، يمكن أن ترى أن سعر عبوة عصير يساوي 4 ريالات، وسعر 3 عبوات يساوي 6 ريالات وهكذا. يبين التمثيل البياني أن سعر 1.5 عبوة هو $(1.5)2$ ويساوي 3 ريالات. إلا أن عبوات العصير لا تُباع مملوئة جزئيًّا. فهذه الدالة تمثل بدقة أكثر بدالة منفصلة.

الهدف


استعمل الدوال

المنفصلة والدواال

المتصلة لحل مسائل

حياتية.

سعر عبوات العصير




التمثيل البياني المجاور هو تمثيل الدالة المنفصلة التي تمثل سعر عبوات العصير. والمجال في هذا التمثيل البياني مقبول ومنطقي في هذا الموقف.

عند اختيار دالة منفصلة أو متصلة لممثل موقف من واقع الحياة يجب الأخذ بعين الاعتبار إذا كانت كل الأعداد الحقيقة تعد منطقية ومقبولة كعناصر في المجال أم لا.


تمارين

بيان إذا كانت كل علاقة فيما يأتي متصلة أو منفصلة، وفسر إجابتك.

(2) البريد الإلكتروني



(1) تحويل الوحدات



(3) لا تمثل المسافة التي تقطعها سيارة في زمن مقداره x ساعة.

(4) لا تمثل العدد الكلي لراكبي لعبة العجلة الدوارة بعد x دورة من تشغيل اللعبة.

(5) اكتب: مثالاً من واقع الحياة على دالة منفصلة وآخر على دالة متصلة، وفسر إجابتك.





دواال خاصة

Special Functions

1-3

فيما سبق:

درست حل معادلات تتضمن القيمة المطلقة.
(مهارة سابقة)

والآن:

- أكتب الدوال المتعددة التعريف وأمثلها بيانياً.
- أكتب الدوال الدرجية ودواال القيمة المطلقة وأمثلها بيانياً.

المفردات:

الدالة المتعددة التعريف
piecewise-defined function

الدالة المتعددة الخطية
piecewise-linear function

الدالة الدرجية
step function


دالة أكبر عدد صحيح
greatest integer function

دالة القيمة المطلقة
absolute value function

نسبة المصايبات بالسمنة في المملكة حسب الفئات العمرية		
النسبة	إلى	من
19%	24	15
38%	34	25
53%	44	35
58%	54	45
49%	64	55

المصدر: مسح المعلومات الصحية في المملكة، وزارة الصحة، 1435 هـ

الدالة المتعددة التعريف: الدالة التي تربط بين العمر ونسبة المصايبات بالسمنة ليست خطية؛ لأن كل فترة من مجال الدالة معروفة بعبارة مختلفة، فالدالة التي تكتب باستعمال عبارتين أو أكثر تسمى دالة متعددة التعريف. وعند تمثيل الدالة المتعددة التعريف بيانياً توضع دائرة صغيرة مظللة عند الطرف لتشير إلى أن النقطة تتبع إلى التمثيل البياني، وتوضع دائرة غير مظللة لتشير إلى أن النقطة لا تتبع إلى التمثيل البياني.



تمثيل الدالة متعددة التعريف

مثال 1

مثل الدالة $f(x) = \begin{cases} x - 2 & , x < -1 \\ x + 3 & , x \geq -1 \end{cases}$ بيانياً.
ثم حدد كلاً من مجالها ومداها.

الخطوة 1: مثل $x - 2$ $f(x) = x - 2$ بيانياً عندما $x < -1$.

احسب قيمة المقدار $x - 2$ عندما $x = -1$ ، وعند قيمة أخرى لـ x أقل من -1 - ولتكن -2

$$f(x) = x - 2$$

$$f(-2) = (-2) - 2 = -4$$

$$f(x) = x - 2$$

$$f(-1) = (-1) - 2 = -3$$

حدّد النقطتين $(-4, -2), (-3, -1)$ وصل بينهما بنصف مستقيم

وبما أن العدد -1 لا يتحقق المتباينة لذا نبدأ بدائرة غير مظللة عند النقطة $(-3, -1)$.

الخطوة 2: مثل $x + 3$ $f(x) = x + 3$ بيانياً عندما $x \geq -1$.

احسب قيمة المقدار $x + 3$ عندما $x = -1$ ، وعند قيمة أخرى لـ x أكبر من -1 - ولتكن 0

$$f(x) = x + 3$$

$$f(0) = (0) + 3 = 3$$

$$f(x) = x + 3$$

$$f(-1) = (-1) + 3 = 2$$

حدّد النقطتين $(0, 3), (-1, 2)$ وصل بينهما بنصف مستقيم.

وبما أن العدد -1 يتحقق المتباينة، لذا نبدأ بدائرة مظللة عند النقطة $(-1, 2)$.

وبما أن الدالة معروفة عند جميع قيم x ، لذا فالمجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

قيم $f(x)$ للأزواج المرتبة في التمثيل البياني للدالة هي جميع الأعداد الحقيقة الأقل من 3 - وكل الأعداد الحقيقة الأكبر من 0 أو تساوي 2 ، لذا فإن المدى هو $\{f(x) | f(x) \geq 2 \text{ أو } 0 < f(x) \leq 3\}$.

تحقق من فهمك


$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & , x < 0 \\ x & , x \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$



تمثّل الدوال المتعددة التعريف غالباً بعدة دوال خطية. وتسمى حينئذ **الدالة المتعددة التعريف الخطية**.

إرشادات للدراسة

تمثيل الدوال المتعددة التعريف بيانيًا
قد تكون الدوال المتعددة التعريف متصلة أو غير متصلة.



مثال 2 كتابة الدالة المتعددة التعريف

اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانياً في الشكل المجاور.

اكتب الدالة التي تمثل كل جزء في التمثيل البياني.

$$\text{الجزء الأيسر يمر بالنقطتين } (-1, -2), (0, 3) \text{، وميله } 2 = \frac{-1-3}{-2-0} = -2,$$

وباستعمال صيغة الميل ونقطة مثلاً، فإن هذا الجزء تمثله الدالة $f(x) = 2(x - 0)$ ، $f(x) = 2x + 3$ بالنسبة لـ $x < 0$.
النقطة $(1, 5)$ ، فإن هذا يعني أن الدالة معروفة على الفترة $\{x | x < 1\}$.

وبالطريقة نفسها فإن الجزء الأوسط تمثله الدالة $f(x) = -x + 2$.


وتوجد دائرة مظللة عند النقطتين $(1, 1)$ و $(2, 0)$ ، وهذا يعني أن الدالة معروفة على الفترة $\{2 \leq x \leq 1\}$.

كذلك الجزء الأيمن تمثله الدالة $f(x) = 3$. وتوجد دائرة غير مظللة عند النقطة $(3, 2)$.

وهذا يعني أن الدالة معروفة على الفترة $\{x | x > 3\}$ ، ونكتب الدالة المتعددة التعريف على النحو الآتي:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x < 1 \\ -x + 2, & 1 \leq x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}$$

تحقق: يبين التمثيل البياني نصف مستقيم ميله موجب عندما تكون $x < 1$. ويبيّن أيضاً قطعة مستقيمة ميلها سالب عندما تكون $1 \leq x \leq 2$ ونصف مستقيم آخر ميله صفر عندما تكون $x > 2$. لذا يكون تعريف الدالة منطقياً للتّمثيل البياني المعطى.



تحقق من فهمك

(2) اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانياً في الشكل المجاور.

الدالة الدرجية: من الدوال المتعددة التعريف الخطية الشهيرة **الدالة الدرجية** التي تتكون من قطع مستقيمة أفقية، وقد سُميّت بهذا الاسم لأن تمثيلها البياني يشبه الدرج، كما أن **دالة أكبر عدد صحيح** التي تكتب على الصورة $[x] = f(x)$ ، هي مثال على الدالة الدرجية؛ حيث يعني الرمز $[x]$ أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي x . فعلى سبيل المثال: $3 = [3.25]$ وكذلك $-5 = [-4.6]$.

اضف إلى
مطويتك

مفهوم أساسى دالة أكبر عدد صحيح

الدالة الرئيسية (الأم): $f(x) = [x]$ ، وتُعرف على النحو التالي:

$$f(x) = \begin{cases} \vdots & \vdots \\ -1 & -1 \leq x < 0 \\ 0 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & 1 \leq x < 2 \\ 2 & 2 \leq x < 3 \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

شكل التّمثيل البياني: قطع مستقيمة أفقية.

المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية

المدى: مجموعة الأعداد الصحيحة

$$x = 0, 0 \leq x < 1 \quad f(x) = 0$$

المقطوعان: $x = 0, 0 \leq x < 1$

مثال 3 من واقع الحياة استعمال الدالة الدرجية

عقار: يتضمن مجمع للشقق المفروشة 300 ريال مقابل تأجير الشقة ليوم واحد أو جزء منه، و250 ريالاً مقابل تأجير الشقة ذاتها لأي يوم إضافي أو جزء منه. اكتب الدالة التي تمثل هذا الموقف ومثلها بيانياً.

افهم: المعطيات، أجرة الشقة لليوم الأول أو لجزء منه هي 300 ريال، وأجرة أي يوم إضافي أو جزء منه بعد اليوم الأول 250 ريالاً.

المطلوب: كتابة الدالة التي تمثل الموقف، وتمثيلها بيانياً.


خطط: كون جدول يمثل الموقف؛ لتكشف النمط، وتكلب الدالة وتمثيلها بيانياً.

حل: إذا كان زمن التأجير أكبر من 0 يوم وأقل من أو يساوي يوماً، فإن الأجرة هي 300 ريال. وإذا

كان الزمن أكبر من يوم وأقل من أو يساوي يومين فإن الأجرة هي 550 ريالاً وهكذا، لذا

استعمل نمط الزمن مع الأجرة لعمل الجدول التالي، حيث x هي عدد أيام تأجير الشقة. و $T(x)$ هي أجرة الشقة، ثم مثله بيانياً.

x	$0 < x \leq 1$	$1 < x \leq 2$	$2 < x \leq 3$	$3 < x \leq 4$	$4 < x \leq 5$
$T(x)$	300	550	800	1050	1300



وعليه فإن الدالة المطلوبة وتمثيلها البياني يكونان كما يلي:

$$T(x) = \begin{cases} 300 & 0 < x \leq 1 \\ 550 & 1 < x \leq 2 \\ 800 & 2 < x \leq 3 \\ 1050 & 3 < x \leq 4 \\ 1300 & 4 < x \leq 5 \\ \vdots & \end{cases}$$

تحقق: بما أن المجمع يحول أي كسر للعدد الصحيح التالي، فإن كل قطعة مستقيمة ستحتوي على دائرة غير مظللة عن يسارها، وأخرى مظللة عن يمينها كما في الشكل.

تحقق من فهمك

(3) **إعادة تدوير الورق:** تدفع شركة لإعادة تدوير الورق 25 ريالاً عن كل صندوق من الورق يتم إحضاره للشركة ولا تدفع أي شيء مقابل أي صندوق غير ممتلىء بالكامل. اكتب الدالة التي تمثل هذا الموقف ومثلها بيانياً.



الربط مع الحياة

تقدر المخلفات الورقية في السعودية بـ 1.5 مليون طن سنوياً، يستغل منها في عمليات التدوير 700 ألف طن فقط.


المصدر، جريدة الاقتصادية / العدد 6081، عام 1431هـ

اضف إلى
مطويتك

دالة القيمة المطلقة

مفهوم أساسى

الدالة الرئيسية (الأم): $|x| = f(x)$ ، وتُعرف على النحو الآتي:



$$f(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

على شكل حرف V

شكل التمثيل البياني:

المجال:

المدى:

المقطوعان:

ولا يمكن أن تكون:

مجموعة الأعداد الحقيقية


مجموعة الأعداد الحقيقية غير السالبة

$x = 0, f(x) = 0$

$f(x) < 0$

مثال 4 دالة القيمة المطلقة

- مثل الدالة $f(x) = |2x - 4|$ بيانياً، ثم حدد كلاً من مجالها ومداها.
- (3) مثل الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي.
 - (4) صل بين النقاط.



المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقة، والمدى هو $\{f(x) \mid f(x) \geq -4\}$.

- (1) اجعل ما بداخل القيمة المطلقة يساوي الصفر، أي $2x - 4 = 0$ أو $x = 2$.
- (2) كون جدولًا للقيم، يحوي قيمًا لـ x أكبر من 0 وقيمًا أصغر من 0.

x	$ 2x - 4 $
-2	0
-1	-2
0	-4
1	-2
2	0

تحقق من فهمك

$$f(x) = -|x| + 1 \quad (4B)$$

$$f(x) = |x - 2| \quad (4A)$$


تأكد

- مثل كل دالة مما يأتي بيانياً، ثم حدد كلاً من مجالها ومداها:


$$f(x) = \begin{cases} 8, & x \leq -1 \\ 2x, & -1 < x < 4 \\ -4-x, & x \geq 4 \end{cases} \quad (2)$$

$$f(x) = \begin{cases} -3, & x \leq -4 \\ x, & -4 < x < 2 \\ -x+6, & x \geq 2 \end{cases} \quad (1)$$

- اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانياً في كلٍ مما يأتي:



(4)



مثال 2

مثال 1

- (5) محاضرات طبية: ي يريد أحد الأطباء إلقاء محاضرة حول العدوى في قاعة تتسع لـ 250 شخصاً فقط، وكان عدد راغبي حضور المحاضرة أكثر من ذلك بكثير. مثل بيانياً دالة متعددة التعريف تبين العلاقة بين عدد المحاضرات y التي يمكن أن يلقيها الطبيب، وعدد الحضور x .

مثال 3

- مثل كل دالة فيما يأتي بيانياً، ثم حدد كلاً من مجالها ومداها:

$$g(x) = |-3x| \quad (8)$$

$$h(x) = [x - 5] \quad (7)$$

$$g(x) = -2[x] \quad (6)$$

$$s(x) = |-2x| + 6 \quad (11)$$

$$h(x) = |x + 4| \quad (10)$$

$$f(x) = 2|x| \quad (9)$$

المثالان 4, 3,



تدريب وحل المسائل


مثل كل دالة فيما يأتي بيانياً، ثم حدد كلاً من مجالها ومداها:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq -6 \\ 5, & -6 < x \leq 2 \\ -2x + 1, & x > 4 \end{cases} \quad (13)$$


$$f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -4 \\ x, & 0 < x \leq 3 \\ 8, & x > 3 \end{cases} \quad (12)$$

مثال 1


اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانياً في كلٍ مما يأتي:



(16)



(15)



(14)

مثال 2

مثال 3

المثالان 4 ، 3




الربط مع الحياة


تهدف جمعيات البر بالملكة إلى ترسیخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتحويله إلى واقع عملي من خلال رعاية المحتججين وتحفيض معاناتهم بتوفير الغذاء والدواء واللباس والأثاث.

اكتب دالة القيمة المطلقة الممثلة بيانياً في كلٍ مما يأتي:

(28)



(27)



استئجار الدبابات الشاطئية



تر فيه: يوضح الجدول المجاور: تكلفة استئجار دبابة شاطئ.

(a) حدد نوع الدالة التي تمثل هذا الموقف.

(b) اكتب الدالة التي تمثل هذا الموقف، ثم مثلها بيانياً.



مثل كُل دالة فيما يأتي بيانياً، ثم حدد كُل من مجالها ومداها:

$$h(x) = \begin{cases} -|x|, & x < -6 \\ |x|, & -6 \leq x \leq 2 \\ |x|, & x > 2 \end{cases} \quad (30)$$

$$g(x) = \begin{cases} [x], & x < -4 \\ x + 1, & -4 \leq x \leq 3 \\ -|x|, & x > 3 \end{cases} \quad (29)$$

(31) تمثيلات متعددة: لتكن $f(x) = |x| - 4$, $g(x) = |3x|$

a) جدولياً: كون جدولأ لبعض قيم كُل من $f(x)$ و $g(x)$ ما بين $x = -4$, $x = 4$.

b) بيانياً: مثل كُل من الدالتين بيانياً على مستوى إحداثي مختلف.

c) عددياً: احسب الميل بين كل نقطتين متناظرتين في الجدول.

d) لفظياً: صنف العلاقة بين ميل كل من جزأى دالة القيمة المطلقة.

مسائل مهارات التفكير العليا

(32) مسألة مفتوحة: اكتب علاقة باستعمال القيمة المطلقة بحيث يكون المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية غير السالبة والمدى هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

(33) تحد: مثل المعادلة $5 - |x + 3| = 2|y|$ بيانياً.

(34) تبرير: أعط مثالاً مضاداً للجملة الآتية، وفسّر إجابتك.

”حتى تجد أكبر عدد صحيح لعدد غير صحيح x ، فإنك تقرب x إلى أقرب عدد صحيح“

(35) مسألة مفتوحة: اكتب دالة قيمة مطلقة $f(x)$ ، تحقق $-3 = f(5)$.

(36) اكتب: اشرح من خلال مثال كيف تستعمل الدوال المتعددة التعريف لتمثيل مسائل من واقع الحياة.

تدريب على اختبار

(37) إجابة قصيرة: أي دالة مما يأتي تكون فيها $-f\left(-\frac{1}{2}\right) \neq -1$?

$$f(x) = [x] \quad \text{C}$$

$$f(x) = 2x \quad \text{A}$$

$$f(x) = [2x] \quad \text{D}$$

$$f(x) = |-2x| \quad \text{B}$$

ما العبارة التي تعطي الحد النوني للنمط في الجدول التالي؟

2	4	6	8	n
7	13	19	25	?

مراجعة تراكمية

إذا كان $9 + 9 + 9 = 27$, فأوجد كل قيمة مما يأتي: (الدرس 1-2)

$$h(6) \quad (41)$$

$$g(a + 1) \quad (40)$$

$$f(2c) \quad (39)$$

حددمجموعات الأعداد التي يتمي إليها كل عدد مما يأتي: (الدرس 1-1)

$$\sqrt{11} \quad (45)$$

$$\frac{2}{5} \quad (44)$$

$$-3 \quad (43)$$

$$\sqrt{36} \quad (42)$$



اختبار منتصف الفصل

إذا كان $7 = f(x) = 3x^3 - 2x + 1$ ، فأوجد قيمة كل مما يأتي :

$f(-2)$ (12)

$f(2y)$ (13)

$f(1.4)$ (14)

(15) اختبار من متعدد: يقدر الدخل بالريال لسيارة أجرة بالدالة $f(x) = 0.35x + 49$ ، حيث x عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة. قدر دخل السيارة إذا قطعت 250 km .

84 ريالاً A

112.50 ريالاً B


136.50 ريالاً C

215 ريالاً D

(16) مثل بيانياً الدالة:

$$f(x) = \begin{cases} -x, & x < -2 \\ x + 2, & -2 \leq x \leq 2 \\ 5, & x > 2 \end{cases}$$

(17) اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانياً فيما يأتي:



(18) حدد كلاً من المجال والمدى للدالة: $y = [x] + 2$.

حدد مجموعات الأعداد التي يتسمى إليها كل عدد مما يأتي :

$-\frac{128}{32}$ (2) $\frac{25}{11}$ (1)

-32.4 (4) $\sqrt{50}$ (3)

(5) ذكر الخاصية الموضحة في المعادلة الآتية:
 $(4 + 15)7 = 4(7) + 15(7)$

(6) بسط العبارة $-3(7a - 4b) + 2(-3a + b)$

(7) ملابس: يريد سعد شراء 3 قمصان و3 بناطيل. فإذا كان سعر القميص الواحد 35 ريالاً. وسعر البنطال الواحد 55 ريالاً. فأوجد المبلغ الذي يدفعه سعد بطريقتين مستعملًا خاصية التوزيع.

(8) اختبار من متعدد: أي العبارات التالية تكافئ

$\frac{2}{3}(4m - 5n) + \frac{1}{5}(2m + n)$

$\frac{46}{15}m - \frac{47}{15}n$ A

$46m - 47n$ B

$-\frac{mn}{15}$ C

$\frac{5}{4}m - \frac{9}{8}n$ D

(9) أوجد كلاً من النظير الجماعي والنظير الضربي للعدد $\frac{7}{6}$.

(10) حدد كلاً من مجال العلاقة الآتية ومداها، ثم بين هل تمثل دالة أم لا: $\{(3, 2), (4, 1), (0, 3), (5, -2), (3, 7)\}$

(11) مثل المعادلة $3 - 2x = y$ بيانياً، ثم بين إذا كانت تمثل دالة أم لا. وهل هي متباينة أم لا؟ وهل هي منفصلة أم متصلة؟



تمثيل المتباينات الخطية ومتباينات القيمة المطلقة بيانياً


Graphing Linear and Absolute Value Inequalities




لماذا؟ دعا تركي زملاءه إلى وجبة من الفطائر والعصير الطبيعي، ورصد لتلك الدعوة مبلغ 150 ريالاً فقط.

ويمكنه أن يستعمل المتباينة الخطية: $6p + 5d \leq 150$ حيث p عدد الفطائر و d عدد أكواب العصير؛ للتأكد من أن سعر عدد معين من الفطائر وأكواب العصير سيكون ضمن ميزانيته.

تمثيل المتباينات الخطية بيانياً: تشبه **المتباينة الخطية** المعادلة الخطية، فالفرق بينهما فقط هو وضع رمز المتباينة بدلاً من رمز المساواة. فمثلاً، $2 - 3x > y$ هي متباينة خطية، و $2 - 3x = y$ هي المعادلة الخطية المرتبطة بها.



التمثيل البياني للمتباينة $2 - 3x > y$ مبين في الشكل المجاور على صورة منطقة مظللة تسمى **منطقة الحل**، وكل نقطة في المنطقة المظللة تتحقق المتباينة، والتمثيل البياني للمستقيم $2 - 3x = y$ هو **حد** منطقة الحل وقد رُسم المستقيم بشكل متقطع ليدل على أنه لا يتحقق المتباينة. أما إذا احتوت المتباينة على الرمز \leq أو \geq فإن النقاط الواقعة على الحد ستتحقق المتباينة وعندها يكون تمثيل المستقيم خطأً متصلًا.



مثال 1 الحد المتقطع

مثل المتباينة $x + 4y > 2$ بيانياً.

الخطوة 1: مثل الحد وهو المستقيم $x + 4y = 2$. وبما أن رمز المتباينة هو $>$ فإن الحد سيكون متقطعاً.

الخطوة 2: اختبر النقطة $(0, 0)$ والتي لا تقع على حد المتباينة.

$$\begin{array}{ll} \text{المتباينة الأصلية} & x + 4y > 2 \\ (x, y) = (0, 0) & 0 + 4(0) \stackrel{?}{>} 2 \\ & \times \quad 0 > 2 \end{array}$$

ظلل المنطقة التي لا تحوي $(0, 0)$.

تحقق: بين التمثيل البياني أن النقطة $(0, 3)$ تقع في منطقة الحل.

$$\begin{array}{ll} \text{المتباينة الأصلية} & x + 4y > 2 \\ (x, y) = (0, 3) & 0 + 4(3) \stackrel{?}{>} 2 \\ & \checkmark \quad 12 > 2 \end{array}$$

إذن، الحل صحيح.

تحقق من فهمك

$$-x + 2y > 4 \quad (1B)$$

$$3x + \frac{1}{2}y < 2 \quad (1A)$$

فيما سبق

درست تمثيل الدوال الخطية. (مهارة سابقة)

والآن

- أمثل المتباينات الخطية بيانياً.
- أمثل متباينات القيمة المطلقة بيانياً.

المفردات

المتباينة الخطية

linear inequality

منطقة الحل

feasible region

الحد

boundary

إرشادات للدراسة

حد المتباينة


إذا احتوت المتباينة على رمز $>$ أو $<$ ، فإن الحد لا يدخل ضمن منطقة الحل، ويمثل بخط متقطع.

مثال 2 من واقع الحياة

الحد المتصل

رسم: يقدم مركز تدريب نوعين من دروس تعلم اللغة الإنجليزية، الأول: دروس مدتها 30 دقيقة للدرس الواحد، والثاني: دروس مدتها 60 دقيقة للدرس الواحد. وقرر مدير المركز ألا يزيد زمان دروس تعلم اللغة الإنجليزية على 20 ساعة أسبوعياً.

(a) اكتب متباعدة تمثل عدد دروس تعلم اللغة الإنجليزية التي يمكن تقديمها أسبوعياً، ثم مثلها بيانياً.
لتكن x عدد الدروس التي مدتها 30 دقيقة ($\frac{1}{2}$ ساعة)، ولتكن y عدد الدروس التي مدتها 60 دقيقة (ساعة واحدة). وبما أن مجموع زمن الدروس لا يزيد على 20 ساعة أسبوعياً، فهذا يعني إمكانية أن يساوي 20 ساعة. ولهذا فإن المتباعدة تحتوي على الرمز \leq ، ولذا يكون المستقيم الذي يمثل الحد متصلأً. إذن المتباعدة هي $20 \leq y + \frac{1}{2}x$.



الخطوة 1: مثل الحد وهو المستقيم $20 = \frac{1}{2}x + y$ بيانياً.

الخطوة 2: اختبر النقطة $(0, 0)$ والتي لا تقع على الحد.

المتباعدة الأصلية $\frac{1}{2}x + y \leq 20$

$$(x, y) = (0, 0) \quad \frac{1}{2}(0) + (0) \leq 20$$

$$\checkmark 0 \leq 20$$

ظلل المنطقة في الربع الأول فقط التي تحوي $(0, 0)$ ؛ وذلك لأن كلا المتغيرين لا يمكن أن يكون سالباً.

(b) هل يمكن أن يقدم المركز 25 درساً من الدروس التي مدتها 30 دقيقة، و 15 درساً من الدروس التي مدتها 60 دقيقة خلال أسبوع ما؟ فسر إجابتك.

النقطة $(15, 25)$ تقع خارج المجموعة المظللة؛ لذا فهي لا تتحقق المتباعدة، وعليه، فلا يمكن أن يقدم المركز ذلك العدد من الدروس خلال أسبوع ما.



الربط مع الحياة

- تزوّد معامل اللغات
- المتحصصة بأحدث الأجهزة التقنية والتجهيزات
- الإلكترونية والصوتية
- المتطورة التي تبني مهاراتي
- المحادثة والاستماع لدى
- الدارسين، وتؤهلهم لاكتساب
- اللغط الصحيح.


تحقق من فهتمك

(2) **ألعاب:** مع صالح 60 ريالاً يستطيع إنفاقها في مدينة الألعاب. فإذا كان ثمن تذكرة الألعاب الإلكترونية 5 ريالات، وثمن تذكرة كل لعبة عاديّة 6 ريالات. فاكتب متباعدة تصف هذا الموقف، ثم مثلها بيانياً.

تمثيل متباعدة القيمة المطلقة بيانياً: تمثيل متباعدة القيمة المطلقة مشابه لتمثيل المتباعدات الخطية، مثل بيانياً معادلة القيمة المطلقة المرتبطة، وبعد ذلك حدد إذا كان حد المتباعدة متقطعاً أو متصلأً، ثم حدد المنطقة التي يجب تظليلها باختبار نقطة ما.

تمثيل متباعدة القيمة المطلقة بيانياً

مثال 3



مثل المتباعدة $|x| - 4 - 1 \geq y$ بيانياً.

مثل المعادلة المرتبطة $|x| - 4 - 1 = y$ ،

وبما أن المتباعدة تحتوي على إشارة \geq ، فإن الحد يكون متصلأً.
والآن اختبر النقطة $(0, 0)$.

المتباعدة الأصلية $y \geq |x| - 4$

$$(x, y) = (0, 0) \quad 0 \geq |0| - 4$$

$$\checkmark 0 \geq -4$$

ظلل المنطقة التي تحتوي على النقطة $(0, 0)$.

تحقق من فهتمك

$$y \leq 2|x| + 3 \quad (3A)$$

$$y \geq 3|x + 1| \quad (3B)$$



مثال 1 مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً:

$$x > -6 \quad (2)$$

$$y \leq 4 \quad (1)$$

$$3x + y > -8 \quad (4)$$

$$x + 4y \leq 2 \quad (3)$$

مثال 2 **5) وقود:** مع عامر 120 ريالاً، ويريد تزويد سيارته بالوقود، وشراء علب زيت للمحرك بالمبلغ المتبقى. فإذا كان سعر لتر الوقود 1.37 ريال، وسعر عبوة زيت المحرك 17 ريالاً.

a) اكتب متباينة تمثل هذا الموقف، ثم مثلها بيانياً.

b) هل يستطيع عامر تزويد سيارته بـ 20 لترًا من الوقود وشراء 4 عبوات زيت محرك؟ فسر إجابتك.

مثال 3 مثل المتباينتين الآتتين بيانياً.

$$y \geq |x + 3| \quad (6)$$

$$y - 6 < |x| \quad (7)$$

تدريب وحل المسائل

مثال 1 مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً:

$$x + 2y > 6 \quad (8)$$

$$y \geq -3x - 2 \quad (9)$$

$$2y + 3 \leq 11 \quad (10)$$

$$4x - 3y > 12 \quad (11)$$

$$6x + 4y \leq -24 \quad (12)$$

$$y \geq \frac{3}{4}x + 6 \quad (13)$$

مثال 2 **14) مشتريات:** مع سعاد 200 ريال. وترى أن تشتري عدداً من الأطباق. وعدداً من الكؤوس؛ لتجهز لمناسبة اجتماعية، فإذا كان سعر الطبق 15 ريالاً وسعر الكأس 5 ريالات، فأجب عمّا يأتي:

a) اكتب متباينة تمثل العدد الممكن شراؤه من الأطباق والكؤوس، ثم مثلها بيانياً.

b) هل تستطيع سعاد شراء 10 أطباق و 10 كؤوس؟



مثال 3

مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً:

$$y - 6 < |-2x| \quad (17)$$

$$y + 4 \leq |x - 2| \quad (16)$$

$$y > |3x| \quad (15)$$

$$-y \leq |3x - 4| \quad (20)$$

$$2y > |4x - 5| \quad (19)$$

$$y + 8 < 2 \left| \frac{2}{3}x + 6 \right| \quad (18)$$

(21) **أعمال:** يؤدي سعيد عملين ليحقق دخلاً أسبوعياً لا يقل عن 1500 ريال، إذا كان الأجر الذي يتقاضاه عن كل ساعة موضحاً في الجدول المجاور، فأجب عمماً يأتي:

(a) اكتب متباينة تمثل هذا الموقف.

(b) مثل المتباينة بيانياً.

(c) هل سيحصل سعيد على المبلغ المطلوب إذا عمل 30 ساعة أسبوعياً في كل عمل؟

مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً:

$$y - 3 > -2|x + 4| \quad (24)$$

$$y \leq |x - 3| + 4 \quad (23)$$

$$y \geq |-2x - 6| \quad (22)$$

(25) **زيتة:** تصنع ميساء عقوداً وأساور من الخرز، لمشاركة بها في المعرض الفني للمدرسة، ولديها من الخرز ما يكفي لصناعة 50 قطعة. لتكن x عدد الأساور، y عدد العقود.

(a) اكتب متباينة تبين عدد العقود والأساور التي يمكن أن تصنعها ميساء.

(b) مثل المتباينة بيانياً.

(c) أعط ثلاثة حلول لعدد العقود والأساور التي يمكن لميساء صنعها.


الربط مع الحياة

يصنع الخرز من طين لين، حيث يجفف في فرن حرارته عالية، ويمكن تشكيله إلى أشكال عديدة.

مسائل مهارات التفكير العليا


(29) **مسألة مفتوحة:** استعمل القيمة المطلقة لتكوين متباينة على أن لا يقع حلها في الربعين الثاني أو الثالث.

(30) **تحد:** مثل المتباينة الآتية بيانياً:

$$g(x) > \begin{cases} |x + 1|, & x \leq -4 \\ -|x|, & -4 < x < 2 \\ |x - 4|, & x \geq 2 \end{cases}$$



(31) اكتشف الخطأ: مثل كل من زيد ومصعب المتباعدة $y - x \geq 2$ بيانياً. فأيهما تمثيله صحيح؟ فسر إجابتك.



(32) تبرير: متى يكون من الممكن تظليل منطقتين مختلفتين عند تمثيل متباعدة القيمة المطلقة؟
فسر إجابتك.

(33) اكتب: اذكر مثالاً لمتباعدة قيمة مطلقة ليس لها حل. فسر إجابتك.

تدريب على اختبار

(34) أي النقاط الآتية تقع في منطقة حل المتباعدة $y + 3x > -2$ ؟

$$f(x) = |x| \quad \mathbf{C}$$

$$f(x) = -x \quad \mathbf{A}$$

$$(-3, 1) \quad \mathbf{A}$$

$$f(x) = -|x| \quad \mathbf{D}$$

$$f(x) = [x] \quad \mathbf{B}$$

$$(1, -7) \quad \mathbf{B}$$

(35) أي الدوال الآتية مدها هو $\{f(x) \mid f(x) \leq 0\}$ ؟

$$y + 3x > -2 \quad \mathbf{(A)}$$

$$(0, 0) \quad \mathbf{C}$$

$$(-4, 0) \quad \mathbf{D}$$

مراجعة تراكمية

مثل كل دالة فيما يأتي بيانياً: (الدرس 1-3)

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq -2 \\ x + 1, & 0 < x \leq 6 \\ x - 5, & x > 6 \end{cases} \quad (38)$$

$$f(x) = \begin{cases} x + 3, & x < -2 \\ 2x, & -2 \leq x \leq 2 \\ -3x, & x > 2 \end{cases} \quad (37)$$

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ 3, & 1 \leq x \leq 3 \\ -2x, & x > 3 \end{cases} \quad (36)$$

إذا كان:
 $f(x) = 4x^2 - 10x$
 $g(x) = -3x^2 + 2$
 $h(x) = -7x + 8$

فأوجد كل قيمة مما يأتي: (الدرس 1-2)

$$f(-9) \quad (39)$$

$$g(-4) \quad (40)$$

$$h(12) \quad (41)$$




رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

حل أنظمة المتباينات الخطية بيانياً

Solving Systems of Linear Inequalities by Graphing

1-5



لماذا؟
تؤخذ الحالة الجوية بالاعتبار عند إطلاق المركبات الفضائية، فيجب أن تكون درجة الحرارة بين 35°F و 100°F ، وأن لا تزيد سرعة الرياح على 30 عقدة. ويمكن تمثيل هذه الشروط بنظام من المتباينات الخطية كما في الشكل المجاور.

نظام المتباينات الخطية: حل نظام المتباينات الخطية يعني إيجاد أزواج مرتبة تحقق جميع المتباينات في النظام.

أضف إلى
مطويتك

حل أنظمة المتباينات الخطية

مفهوم أساسى

مثل كل متباينة في النظام بيانياً.

الخطوة 1

حدد المنطقة المظللة المشتركة بين مناطق حل متباينات النظام والتي تمثل منطقة حل النظام.

الخطوة 2

فيما سبق:


درست حل نظام من معادلتين خطيتين بيانياً. (مهارة سابقة)

والآن:

- أحل نظام متباينات خطية بيانياً.
- أحدد إحداثيات النقاط التي تمثل رؤوس منطقة الحل.

المفردات:

نظام المتباينات الخطية
system of linear inequalities



مناطق الحل المتقطعة

مثال 1

حل النظام الآتي بيانياً:

$$y > 2x - 4$$

$$y \leq -0.5x + 3$$

بتمثيل المتباينتين بيانياً نجد أن: حل المتباينة $y > 2x - 4$ ← المنطقان: 1 ، 3 ، حل المتباينة $y \leq -0.5x + 3$ ← المنطقان: 2 ، 3 ، المنطقة 3 هي منطقة مشتركة بين منطقتى حل المتباينتين ، وعليه فتكون هي منطقة حل النظام.

تحقق:

لاحظ أن نقطة الأصل تنتمي إلى منطقة حل النظام، ويمكن استعمال نقطة الأصل نقطة اختبار. والتحقق من صحة الحل بتعويض $(0, 0)$ بدلاً من x, y في كلتا المتباينتين.

$$y \leq -0.5x + 3$$

$$0 \leq -0.5(0) + 3$$

$$0 \leq 0 + 3$$

✓ $0 \leq 3$

$$y > 2x - 4$$

$$0 > 2(0) - 4$$

$$0 > 0 - 4$$

✓ $0 > -4$

تحقق من فهمك

$$y \geq |x| \quad (1B)$$

$$y < \frac{4}{3}x + 5$$

$$y \leq -2x + 5 \quad (1A)$$

$$y > -\frac{1}{4}x - 6$$



المجموعة الخالية

هي المجموعة التي لا تحتوي على عناصر، ويرمز إليها بأحد الرموزين \emptyset أو $\{\}$.


مناطق الحل غير المتقطعة

مثال 2

حل النظام الآتي بيانياً:

$$y \geq x + 5$$

$$y < x - 4$$



بتمثيل المتباينتين بيانياً، نجد أن منطقتي الحل لا تتقاطعان، وبالتالي لا توجد نقاط مشتركة بينهما، ولذا فليس للنظام حل. ومجموعة الحل هي \emptyset .

تحقق من فهنك

$$y \geq |x| \quad (2B)$$

$$y < x - 6$$

$$y \geq -4x + 8 \quad (2A)$$

$$y < -4x + 4$$

تستعمل أنظمة المتباينات الخطية في حل مسائل من واقع الحياة.

كتابة نظام من المتباينات

مثال 3 من واقع الحياة

إدارة الوقت: لدى فاطمة 25 ساعة على الأكثر للاستعداد لأداء 3 اختبارات في الرياضيات والفيزياء والتربية المهنية، فوضعت جدولأ زمنياً استعداداً لذلك، فخصصت ساعتين لدراسة التربية المهنية، وخصصت من 7 إلى 14 ساعة لدراسة الرياضيات، أما الفيزياء فخصصت لدراستها من 8 إلى 12 ساعة. اكتب نظام متباينات خطية يمثل هذا الموقف ومثله بيانياً.

الرياضيات: بافتراض أن عدد ساعات دراسة الرياضيات x ، فإن هذا العدد لا يقل عن 7 ساعات ولا يزيد على 14 ساعة أي أن:

$$7 \leq x \leq 14$$


الفيزياء: بافتراض أن عدد ساعات دراسة الفيزياء y ، فإن هذا العدد لا يقل عن 8 ساعات ولا يزيد على 12 ساعة أي أن:

$$8 \leq y \leq 12$$

وبما أن إجمالي وقت الدراسة هو 25 ساعة ، ساعتان منها لدراسة مادة التربية المهنية، ويتبقي 23 ساعة على الأكثر لدراسة الرياضيات والفيزياء فإن:


$$x + y \leq 23$$

مثل المتباينات بيانياً. أي زوج مرتب في منطقة حل النظام يمثل حلّاً للنظام؟ أحد الحلول الممكنة هو 10 ساعات لدراسة الفيزياء، و 11 ساعة لدراسة الرياضيات.



تحقق من فهنك


(3) سفر: خرج مشاري وبدر في رحلة لزيارة بعض محافظات المملكة بـًا فتناوباً قيادة السيارة. فإذا كانت فترات قيادة مشاري للسيارة على نحوٍ متواصل في اليوم لا تقل عن 4 ساعات، ولا تزيد على 8 ساعات، وكانت فترات قيادة بدر للسيارة على نحوٍ متواصل في اليوم لا تقل عن ساعتين ولا تزيد على 5 ساعات، وكان إجمالي زمن قيادة كليهما يومياً لا يزيد على 10 ساعات، فاكتتب نظام متباينات خطية يمثل هذا الموقف، ثم مثله بيانياً.



إيجاد رؤوس منطقة الحل: يتيح أحياناً عن التمثيل البياني لنظام متباينات خطية منطقة مغلقة على شكل مضلع، ويمكن إيجاد إحداثيات رؤوس تلك المنطقة بإيجاد إحداثيات نقاط تقاطع المستقيمات المحددة للمنطقة (الحدود).

مثال 4 إيجاد رؤوس منطقة الحل

أوجد إحداثيات رؤوس المثلث الناتج عن التمثيل البياني للنظام الآتي:



$$y \geq 2x - 8, y \leq -\frac{1}{4}x + 6, 4y \geq -15x - 32$$

الخطوة 1: مثل كل متباينة بيانياً.

الخطوة 2: من التمثيل البياني يمكنك إيجاد إحداثيات رأسين من رؤوس المثلث وهما الزوجان المرتبان $(-4, 7)$, $(0, -8)$.

الخطوة 3: أوجد إحداثي الرأس الثالث بحل النظام المكون من المعادلتين الخطيتين:

$$y = 2x - 8, y = -\frac{1}{4}x + 6$$

عوض عن y بقيمتها في المعادلة الثانية.

$$2x - 8 = -\frac{1}{4}x + 6$$

$$\text{اجمع 8 لكلا الطرفين} \quad 2x = -\frac{1}{4}x + 14$$

$$\text{اجمع } \frac{1}{4}x \text{ لكلا الطرفين} \quad \frac{9}{4}x = 14$$

$$\text{اضرب كلا الطرفين في العدد } \frac{4}{9} \quad x = \frac{56}{9} = 6\frac{2}{9}$$

جد قيمة y .

$$\text{عوض عن } x \text{ بالعدد } \frac{2}{9} \quad y = 2\left(6\frac{2}{9}\right) - 8$$

$$\text{خاصية التوزيع} \quad = 12\frac{4}{9} - 8$$

$$\text{بسط} \quad = 4\frac{4}{9}$$

إحداثيات رؤوس المثلث هي: $(-4, 7), (0, -8), \left(6\frac{2}{9}, 4\frac{4}{9}\right)$.

تحقق: قارن بين الإحداثيين اللذين وجدتهما، وبين إحداثي الرأس الثالث في التمثيل البياني، ولا حظ أن الإحداثي x للرأس الثالث محصور بين العددين 7, 6، لذا فإن القيمة $6\frac{2}{9}$ معقولة، وكذلك الإحداثي y محصور بين العددين 5, 4، ولذا فإن القيمة $4\frac{4}{9}$ معقولة أيضاً.

تحقق من فهمك

$$5y \leq 2x + 9 \quad (4B)$$

$$y \geq -3x - 6 \quad (4A)$$

$$y \leq -x + 6$$

$$2y \geq x - 16$$

$$9y \geq -2x + 5$$

$$11y + 7x \leq 12$$



المثالان 2 ، 1

حل كل نظام مما يأتي بيانياً:

$y > -2x + 10 \quad (3)$

$y \leq -3x + 4 \quad (2)$

$y \leq 6 \quad (1)$

$y \leq -3x - 3$

$y \geq 2x - 1$

$y > -3 + x$

مثال 3 (4) **مشتريات:** خصصت ليلي مبلغاً لا يتجاوز 350 ريالاً لشراء نوعين من الأقلام، بيع الأول في رزم تضم الواحدة منها 10 أقلام وثمنها 35 ريالاً، وبيع الثاني في رزم تضم الواحدة منها 8 أقلام وثمنها 25 ريالاً. فإذا أرادت ليلي شراء 40 قلماً على الأقل من كلا النوعين. فاكتب نظام متباينات خطية يمثل هذا الموقف، ومثله بيانياً.

أوجد إحداثيات رؤوس المثلث الناتج عن التمثيل البياني لكل نظام مما يأتي:

$y \geq -2x - 4 \quad (6)$

$y \geq 2x + 1 \quad (5)$

$6y \leq x + 28$

$y \leq 8$

$y \geq 13x - 34$

$4x + 3y \geq 8$

تدريب وحل المسائل

المثالان 2 ، 1

حل كل نظام مما يأتي بيانياً:

$y < -3x + 4 \quad (9)$

$y > 3x - 5 \quad (8)$

$x < 3 \quad (7)$

$3y + x > -6$

$y \leq 4$

$y \geq -4$

$-8x > -2y - 1 \quad (12)$

$6x - 2y \geq 12 \quad (11)$

$y \geq 0 \quad (10)$

$-4y \geq 2x - 5$

$3x + 4y > 12$

$y < x$

$y > -\frac{2}{5}x + 2 \quad (15)$

$3y - 2x \leq -24 \quad (14)$

$5y < 2x + 10 \quad (13)$

$5y \leq -2x - 15$

$y \geq \frac{2}{3}x - 1$

$y - 4x > 8$

مثال 3 (16) **عمل جزئي:** يعمل سعيد عاملين جزئيين ويتقاضى على كل منهما أجراً؛ فيتقاضى 20 ريالاً عن كل ساعة في العمل الأول، و24 ريالاً عن كل ساعة في العمل الثاني، فإذا علمت أنه يعمل مدة لا تزيد على 25 ساعة في كلا العاملين أسبوعياً. فاكتب نظاماً من متباينتين يبين عدد الساعات التي ي عملها في كل من العاملين؛ ليجمع مبلغاً لا يقل عن 1850 ريالاً في 8 أسابيع، ثم مثله بيانياً.

أوجد إحداثيات رؤوس المثلث الناتج عن التمثيل البياني لكل نظام مما يأتي:

مثال 4

$x \leq 4$

(19)

$y \geq 3x - 7 \quad (18)$

$x \geq 0 \quad (17)$

$y > -3x + 12$

$y \leq 8$

$y \geq 0$

$y \leq 9$

$x + y > 1$

$x + 2y < 4$

$6y - 24x \geq -168 \quad (22)$

$8y - 19x < 74 \quad (21)$

$-3x + 4y \leq 15 \quad (20)$

$8y + 7x > 10$

$38y + 26x \leq 119$

$2y + 5x > -12$

$20y - 2x \leq 64$

$54y - 12x \geq -198$

$10y + 60 \geq 27x$



(23) اتصالات: يجري فهد مكالمات هاتفية من هاتفه المحمول مدتها لا تزيد على 800 دقيقة، بشرط أن لا يقل عدد دقائق الاتصال نهاراً عن ضعف عددها ليلاً، ولا يقل عدد دقائق الاتصال ليلاً عن 200 دقيقة. اكتب نظام متبادرات يمثل الموقف، ومثله بيانياً.

(24) أشجار: تصنف الأشجار في الغابات تبعاً لارتفاع ومحيط الساق إلى أربع مجموعات، ويبيّن الجدول الآتي ارتفاع ومحيط ساق أشجار كل مجموعة من هذه المجموعات في إحدى الغابات:

الأشجار غير المسيطرة	الأشجار المتوسطة السيطرة	الأشجار شبه المسيطرة	الأشجار المسيطرة	المجموعة
أقل من 39	40-55	56-72	أكثر من 72	الارتفاع (ft)
أقل من 33	34-48	48-60	أكثر من 60	محيط الساق (in)



الربط مع الحياة

تصنف الأشجار في الغابات وفقاً لوصول الضوء إلى أوراقها إلى أربعة أصناف: **المسيطرة**: أشجار يصل ضوء الشمس إلى أوراقها من أعلى فقط.

شبه المسيطرة: أشجار يصل ضوء الشمس إلى أوراقها من أعلى ومن الجوانب.

المتوسطة السيطرة: أشجار ارتفاعها بسيط و يصل ضوء الشمس إلى أوراقها من أعلى فقط.

غير المسيطرة: أشجار تنمو أسفل مستوى الأشجار الأخرى، وتكون تحت ظل الأشجار الأخرى.

$$|y| \geq x \quad (27)$$

$$y \geq |6 - x| \quad (26)$$

$$y \geq |2x + 4| - 2 \quad (25)$$

$$y < 2x$$

$$|y| \leq 4$$

$$3y + x \leq 15$$

$$|x| > y \quad (30)$$

$$6y + 2x \leq 9 \quad (29)$$

$$y > -3x + 1 \quad (28)$$

$$y \leq 6$$

$$2y + 18 \geq 5x$$

$$4y \leq x - 8$$

$$y \geq -2$$

$$y > -4x - 9$$

$$3x - 5y < 20$$

$$y \geq |x - 2| + 4 \quad (33)$$

$$8x + 4y < 10 \quad (32)$$

$$2x + 3y \geq 6 \quad (31)$$

$$y \leq [x] - 3$$

$$y > |2x - 1|$$

$$y \leq |x - 6|$$

جد إحداثيات رؤوس الشكل الناتج عن التمثيل البياني لكل نظام مما يأتي:

$$2y - x \geq -20 \quad (36)$$

$$y \geq -x - 8 \quad (35)$$

$$y \geq 2x - 12 \quad (34)$$

$$y \geq -3x - 6$$

$$2y \geq 3x - 20$$

$$y \leq -4x + 20$$

$$y \leq -2x + 2$$

$$4y + x \leq 24$$

$$4y - x \leq 8$$

$$y \leq 2x + 14$$

$$y \leq 4x + 22$$

$$y \geq -3x + 2$$

(37) رياضة: يريد معلم التربية البدنية أن يختار من 10 إلى 15 لاعباً ليشكل فريق كرة سلة على أن يكون اللاعبون من طلاب الصفين الثاني والثالث، ويكون عدد اللاعبين من الصف الثالث أكثر من لاعبي الصف الثاني. اكتب نظام متبادرات يمثل ذلك الموقف، ومثله بيانياً.



(38) إدارة الوقت: يستمر رامي وقت فراغه في تلاوة القرآن الكريم وممارسة الرياضة. فإذا كان مجمل وقت فراغه لا يتجاوز 20 ساعة أسبوعياً، ويقضى من 4 إلى 10 ساعات منها في ممارسة الرياضة، ولا يقل زمن تلاوته للقرآن الكريم عن 10 ساعات ولا يزيد على 14 ساعة. فاكتب نظام متبادرات خطية يمثل ذلك الموقف، ومثله بيانياً.




الربط مع الحياة

حث الإسلام على استثمار الوقت والحرص عليه، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيمة حتى يسأل عن عمره فيما أفنأه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيه أتفقه، وعن جسمه فيما أبلأه". [رواه الترمذى].

مسائل مهارات التفكير العليا

(39) مسألة مفتوحة: اكتب نظاماً من متبادرات على أن يكون الحل:



(40) تحدي: في الشكل المجاور، اكتب نظام المتبادرات التي تمثل المنطقة المظللة حلّ له.

(41) تبرير: هل الجملة الآتية صحيحة أم غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فأعط مثالاً مضاداً.

"النظام المكون من متبادرتين خطيتين إما أن يكون ليس له حل أو أن يكون له عدد لا نهائي من الحلول".

(42) اكتب: وضح بخطوات مكتوبة طريقة تحديد منطقة التظليل عند حل نظام متبادرات خطية بيانياً.

تدريب على اختبار

(44) إجابة قصيرة: إذا كانت $z = 6x + 5y$, $3x = 2y$, $5y = 6z$, فما قيمة x بدلالة z ؟

x	y
1	5
2	8
3	11
4	14
5	17
6	20

(43) يبين الجدول المجاور العلاقة بين x و y . فأي المعادلات الآتية تمثل هذه العلاقة؟

$$y = 3x - 2 \quad \text{A}$$

$$y = 3x + 2 \quad \text{B}$$

$$y = 4x + 1 \quad \text{C}$$

$$y = 4x - 1 \quad \text{D}$$

مراجعة تراكمية

مثل كل متبادرة مما يأتي بيانياً: (الدرس 1-4)

$$5x + 7y \geq -20 \quad (47)$$

$$4x - 3y < 10 \quad (46)$$

$$x + y \leq 6 \quad (45)$$

مثل كل دالة مما يأتي بيانياً، وحدد كلاً من مجالها ومداها: (الدرس 1-3)

$$h(x) = [x] - 5 \quad (49)$$

$$f(x) = |x - 3| \quad (48)$$

إذا كان $f(x) = 2x + 5$, $g(x) = 3x - 4$ ، فأوجد قيمة كل مما يأتي: (الدرس 1-2)

$$g(-0.75) \quad (52)$$

$$f(-0.25) \quad (51)$$

$$g(-2) \quad (50)$$



أنظمة المتباينات الخطية



رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

يمكنك استعمال الحاسبة البيانية TI-nspire لحل أنظمة متباينات خطية بيانيًا.

مثال



حل نظام من متباينتين خطيتين

استعمل الحاسبة البيانية لحل النظام المكون من المتباينتين الآتيتين:

$$y \geq -3x + 4$$

$$y \leq 2x - 1$$

الخطوات:



- افتح الآلة الحاسبة بالضغط على .

- من الشاشة الظاهرة اختر 1 مستند جديد (مستعملًا الأسماء).

- من الشاشة الظاهرة اختر 2 إضافة تطبيق الرسوم البيانية (مستعملًا).

- اكتب المتباينة الأولى $y \geq -3x + 4$ ، وذلك بالضغط على مفتاح ، ثم اختر الإشارة \geq مستعملًا الأسهم فتظهر \geq ، ثم أكمل كتابة المتباينة ثم اضغط .

- اكتب المتباينة الثانية $y \leq 2x - 1$ بالضغط على المفتاح ثم المفتاح ، ثم اختر الإشارة \leq مستعملًا الأسهم فتظهر \leq ، أكمل كتابة المتباينة ثم اضغط ، فتكون منطقة الحل هي منطقة التظليل المشترك.

- لاحظ نمط التظليل فوق المستقيم $y = -3x + 4$ ، وتحت المستقيم $y = 2x - 1$.

إن منطقة الحل هي المنطقة الناتجة عن تقاطع نمطى التظليل، وهي المنطقة التي تحوى جميع النقاط التي تحقق النظام

$$y \geq -3x + 4, y \leq 2x - 1$$

تمارين:

استعمل الحاسبة البيانية لحل كل نظام من متباينتين مما يأتي:

$$y \geq 2 - x \quad (3)$$

$$y \geq -4x \quad (2)$$

$$y \geq 3 \quad (1)$$

$$y \leq x + 3$$

$$y \leq -5$$

$$y \leq -x + 1$$

$$y + 5x \geq 12 \quad (6)$$

$$2y \geq 3x - 1 \quad (5)$$

$$y \geq 2x + 1 \quad (4)$$

$$y - 3 \leq 10$$

$$3y \leq -x + 7$$

$$y \leq -x - 1$$

$$\frac{1}{6}y - x \geq -3 \quad (9)$$

$$10y - 7x \geq -19 \quad (8)$$

$$5y + 3x \geq 11 \quad (7)$$

$$\frac{1}{5}y + x \leq 7$$

$$7y - 5x \leq 11$$

$$3y - x \leq -8$$

الهدف

استعمل الحاسبة

البيانية لحل

أنظمة متباينات

خطية.





البرمجة الخطية والحل الأمثل

Optimization with Linear Programming

لماذا؟

يبين الجدول أدناه أكبر وأقل عدد للأثواب المنتجة في اليوم الواحد من المقاسين الكبير والصغير، وتكلفة إنتاج كل ثوب منها في أحد المصانع الوطنية.

عدد الأثواب المنتجة في اليوم الواحد			
تكلفة إنتاج الثوب	أكبر عدد	أقل عدد	المقاس
55 ₩	1500	600	صغير
70 ₩	1700	800	كبير

إذا كان عدد الأثواب المطلوب إنتاجها من المقاسين في اليوم الواحد لا يقل عن 2000 ثوب، فكم ثوباً من كل مقاس يجب إنتاجه لتكون التكلفة أقل ما يمكن؟

هناك **قيود إضافية** على إنتاج المصنع ناجمة عن الطلب والشحن وكفاءة المصنع. وللتعبير عن هذه القيود يمكن استعمال أنظمة المتباينات الخطية.

القيمة العظمى والقيمة الصغرى: تواجه المصنع في كثير من الأحيان أوضاعاً ضمن قيود مختلفة وتسعى للوصول إلى أقل تكلفة أو إلى أعلى ربح. مثل هذه الأوضاع يمكن التعامل معها عادة باستعمال البرمجة الخطية.

البرمجة الخطية: هي طريقة لإيجاد القيمة العظمى أو الصغرى لدالة ما تحت قيود معينة كل منها عبارة عن متباينة خطية، وذلك بعد تمثيل نظام المتباينات بيانياً، وتقع القيمة العظمى أو الصغرى - إن وجدت - لدالة ذات الصلة دائمًا عند أحد رؤوس منطقة الحل.

فيما سبق:

درست حل أنظمة متباينات خطية بيانياً.
(مهارة سابقة)

والآن:

- أجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى لدالة ضمن منطقة الحل.
- استعمل البرمجة الخطية لإيجاد الحل الأمثل لمسائل حياتية.

المفردات:

القيود
constraints

البرمجة الخطية
linear programming

محدودة
bounded

غير محدودة
unbounded

الحل الأمثل
optimize

مفهوم أساسي

منطقة الحل

إذا كانت منطقة الحل مفتوحة وممتدة، فهي بذلك **غير محدودة**، ويمكن أن تحتوي على قيمة عظمى أو قيمة صغرى.


إذا كانت منطقة الحل **محدودة** (مغلقة) أو محصورة بقيود كما في الشكل أعلاه، فإن القيمة العظمى والقيمة الصغرى لدالة تظهر دائمًا عند رؤوس منطقة الحل.

رمز الدالة

يُستعمل الرمز $f(x, y)$
للتعبير عن الدالة
في المتغيرين x, y .
وتقرا $f(x, y)$.

مثال 1 منطقة الحل المحدودة

مَثَل نظام المتباينات الآتي بيانياً، ثم حَدَّد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، وأوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة المعطاة في هذه المنطقة:



$$3 \leq y \leq 6$$

$$y \leq 3x + 12$$

$$y \leq -2x + 6$$

$$f(x, y) = 4x - 2y$$

الخطوة 1: مَثَل المتباينات بيانياً، وحدَّد إحداثيات الرؤوس.

الخطوة 2: جَد قيمة الدالة عند كل رأس.

(x, y)	$4x - 2y$	$f(x, y)$
(-3, 3)	$4(-3) - 2(3)$	-18
(1.5, 3)	$4(1.5) - 2(3)$	0
(0, 6)	$4(0) - 2(6)$	-12
(-2, 6)	$4(-2) - 2(6)$	-20

قيمة عظمى ←

قيمة صغرى ←

القيمة العظمى للدالة تساوي 0 وتكون عند النقطة (1.5, 3)، والقيمة الصغرى للدالة تساوي -20 وتكون عند النقطة (-2, 6).

تحقق من فهمك

$$-6 \leq y \leq -2 \quad (1B)$$

$$-2 \leq x \leq 6 \quad (1A)$$

$$y \leq -x + 2$$

$$1 \leq y \leq 5$$

$$y \leq 2x + 2$$

$$y \leq x + 3$$


$$f(x, y) = 6x + 4y$$

$$f(x, y) = -5x + 2y$$

إذا نتج عن التمثيل البياني لنظام متباينات منطقة مفتوحة وممتدة، فإنها تكون غير محدودة.

مثال 2 منطقة الحل غير المحدودة

مَثَل نظام المتباينات الآتي بيانياً، ثم حَدَّد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، وأوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة المعطاة في هذه المنطقة:



$$2y + 3x \geq -12, y \leq 3x + 12, y \geq 3x - 6, f(x, y) = 9x - 6y$$

مَثَل المتباينات بيانياً، وأوجد قيمة الدالة عند كل رأس؛ لأن القيمة العظمى أو الصغرى - إن وجدت - تكون عند الرؤوس.

(x, y)	$9x - 6y$	$f(x, y)$
(-4, 0)	$9(-4) - 6(0)$	-36
(0, -6)	$9(0) - 6(-6)$	36

القيمة العظمى للدالة تساوي 36 وتكون عند النقطة (-6, 0)، ولا توجد قيمة صغرى للدالة؛ لأن هناك نقطة أخرى في منطقة الحل وهي (0, 8) وتعطي القيمة 48 للدالة وهي أقل من 36.

تحقق من فهمك

$$y \geq x - 9 \quad (2B)$$

$$y \leq 8 \quad (2A)$$

$$y \leq -4x + 16$$

$$y \geq -x + 4$$

$$y \geq -4x - 4$$

$$y \leq -x + 10$$

$$f(x, y) = 10x + 7y$$

$$f(x, y) = -6x + 8y$$

تبليه

القيمة العظمى والصغرى

لا تفترض عدم وجود قيم
عظمى أو صغرى إذا كانت
منطقة الحل غير محدودة.
بل اختبر قيمة الدالة
عند كل رأس؛ لتحديد إذا
كان هناك قيمة عظمى أو
صغرى.



إيجاد الحل الأمثل: يسمى البحث عن السعر أو الكمية الأفضل أو الأنسب لتقليل التكلفة أو زيادة الربح **الحل الأمثل**، ويمكنك الحصول على ذلك الحل باستعمال البرمجة الخطية.

مفهوم أساسى

استعمال البرمجة الخطية لإيجاد الحل الأمثل

أضف إلى مطويتك

الخطوة 1: حدد المتغيرات.

الخطوة 2: اكتب نظام متباينات خطية يمثل المسألة.

الخطوة 3: مثل نظام المتباينات بيانياً.

الخطوة 4: جد إحداثيات رؤوس منطقة الحل.

الخطوة 5: اكتب الدالة الخطية التي تريدها إيجاد قيمتها العظمى أو الصغرى.

الخطوة 6: عرض إحداثيات الرؤوس في الدالة.

الخطوة 7: اختار القيمة العظمى أو الصغرى وفقاً لما هو مطلوب في المسألة.




الربط مع الحياة

جاوز عدد مصانع الألبسة
الجاهزة بالمملكة 300
مصنع، تغطي إنتاجها
المتميز نحو ثلث
احتياجات السوق المحلية.

مثال 3 من واقع الحياة

أعمال: عد إلى الموقف الوارد في بداية هذا الدرس، واستعمل البرمجة الخطية لإيجاد عدد القطع التي يتطلب إنتاجها من المقاسين، لتكون التكلفة أقل ما يمكن.

الخطوة 1: افرض أن x هي عدد الأثواب المنتجة من المقاس الصغير، y هو عدد الأثواب المنتجة من المقاس الكبير.



الخطوة 2: $600 \leq x \leq 1500$
 $800 \leq y \leq 1700$
 $x + y \geq 2000$

الخطوتان 3 و 4: مثل نظام المتباينات بيانياً كما في الشكل المجاور، ثم حدد رؤوس منطقة الحل.

الخطوة 5: الدالة التي تريدها إيجاد قيمتها الصغرى هي:
 $f(x, y) = 55x + 70y$

(x, y)	$55x + 70y$	$f(x, y)$
(600, 1700)	$55(600) + 70(1700)$	152000
(600, 1400)	$55(600) + 70(1400)$	131000
(1500, 1700)	$55(1500) + 70(1700)$	201500
(1500, 800)	$55(1500) + 70(800)$	138500
(1200, 800)	$55(1200) + 70(800)$	122000

الخطوة 6:

قيمة عظمى ←

قيمة صغرى ←

إرشادات للدراسة

منطقية الحل

اخبر منطقية حلك
بالتأمل في سياق
المسألة.

الخطوة 7: يجب إنتاج 1200 ثوب من المقاس الصغير، و 800 ثوب من المقاس الكبير لتكون التكلفة أقل ما يمكن.

تحقق من فهمك



3) مجوهرات: تصوغ أسماء من 10 إلى 25 عقداً، ومن 15 إلى 40 سواراً شهرياً. فإذا كانت أجرة صياغة العقد 50 ريالاً. وأجرة صياغة السوار 30 ريالاً، وصاغت في أحد الأشهر 30 قطعة من العقود والأساور على الأقل، فكم قطعة من كل النوعين عليها صياغتها لتحصل على أكبر أجر؟

المثالان 2 ، 1 مثل كل نظام مما يأتي بيانياً، ثم حدد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، وأوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة المعطاة في هذه المنطقة:

$$y \geq -3x + 2 \quad (3)$$

$$9x + 3y \leq 24$$

$$y \geq -4$$

$$f(x, y) = 2x + 14y$$

$$y \leq -3x + 6 \quad (2)$$

$$-y \leq x$$

$$y \leq 3$$

$$f(x, y) = 8x + 4y$$

$$y \leq 5 \quad (1)$$

$$x \leq 4$$

$$y \geq -x$$

$$f(x, y) = 5x - 2y$$

$$y \leq 2x + 6 \quad (6)$$

$$y \geq 2x - 8$$

$$y \geq -2x - 18$$

$$f(x, y) = 5x - 4y$$

$$-3 \leq y \leq 7 \quad (5)$$

$$4y \geq 4x - 8$$

$$6y + 3x \leq 24$$

$$f(x, y) = -12x + 9y$$

$$-2 \leq y \leq 6 \quad (4)$$

$$3y \leq 4x + 26$$

$$y \leq -2x + 2$$

$$f(x, y) = -3x - 6y$$

مثال 3 (7) **ثقافة مالية**: يبلغ مجموع ساعات العمل اليومي لعمال قسم الإنتاج في مصنع للغسالات 200 ساعة على الأكثر، ولعمال قسم ضبط الجودة 90 ساعة على الأكثر، ويبين الجدول الآتي عدد الساعات التي يتطلبها إنتاج وضبط جودة نوعين من الغسالات.

الزمن اللازم لتصنيع الغسالة		
قسم ضبط الجودة	قسم الإنتاج	
ساعتان	5 ساعات	النوع الأول
ساعتان	4 ساعات	النوع الثاني

- (a) اكتب نظام متباينات يمثل هذا الموقف.
- (b) مثل نظام المتباينات بيانياً، وحدّد منطقة الحل.
- (c) حدد إحداثيات رؤوس منطقة الحل.
- (d) إذا كان ربح الغسالة من النوع الأول 80 ريالاً، ومن النوع الثاني 50 ريالاً، فاكتتب دالة تمثل الربح الكلي لكلا النوعين.
- (e) ما عدد الغسالات التي يجب تصنيعها من كل نوع للحصول على أكبر ربح ممكّن؟ وما هو هذا الربح؟

تدريب و حل المسائل

المثالان 2 ، 1 مثل كل نظام مما يأتي بيانياً، ثم حدد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، وأوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة المعطاة في هذه المنطقة:

$$x + 4y \geq 2 \quad (10)$$

$$2x + 4y \leq 24$$

$$2 \leq x \leq 6$$

$$f(x, y) = 6x + 7y$$

$$-3 \leq x \leq 2 \quad (9)$$

$$y \geq -2x - 6$$

$$4y \leq 2x + 32$$

$$f(x, y) = -4x - 9y$$

$$-8 \leq y \leq -2 \quad (8)$$

$$y \leq x$$

$$y \leq -3x + 10$$

$$f(x, y) = 5x + 14y$$

$$y \geq |x - 2| \quad (13)$$

$$y \leq 8$$

$$8y + 5x \leq 49$$

$$f(x, y) = -5x - 15y$$

$$x \geq -8 \quad (12)$$

$$3x + 6y \leq 36$$

$$2y + 12 \geq 3x$$

$$f(x, y) = 10x - 6y$$

$$x \geq -6 \quad (11)$$

$$y + x \leq -1$$

$$2x + 3y \geq -9$$

$$f(x, y) = -10x - 12y$$

$$y \geq |x + 1| - 2 \quad (16)$$

$$-4 \leq x \leq 8 \quad (15)$$

$$y \leq x + 4 \quad (14)$$

$$0 \leq y \leq 6$$

$$-8 \leq y \leq 6$$

$$y \geq x - 4$$

$$-6 \leq x \leq 2$$

$$y \geq x - 6$$

$$y \leq -x + 10$$

$$x + 3y \leq 14$$

$$4y + 7x \leq 31$$

$$y \geq -x - 10$$

$$f(x, y) = 5x + 4y$$

$$f(x, y) = 12x + 8y$$

$$f(x, y) = -10x + 9y$$

(17) صناعة: يتبع مصنع نوعين من وحدات الإنارة؛ يباع النوع الأول بسعر 25 ريالاً، أما النوع الثاني فيباع بسعر 35 ريالاً. فإذا كانت الطاقة الإنتاجية للمصنع لا تزيد على 450 وحدة إنارة يومياً، وكان على المصنع أن يتبع ما لا يقل عن 100 وحدة إنارة من النوع الأول وما لا يزيد على 200 وحدة إنارة من النوع الثاني، فما عدد وحدات الإنارة اللازم إنتاجها من كل نوع ليكون دخل المصنع اليومي أكبر ما يمكن؟

(18) طلاء: إذا كان الوقت المتاح لمعاذه لطلاء 45 جداراً وسقفًا متساوون في المساحة في أحد المباني هو 20 يوماً، ويستطيع معاذه طلاء 2.5 جدار، أو سقفين في اليوم الواحد.

a) اكتب نظام متباينات خطية يمثل هذا الموقف.

b) مثل نظام المتباينات بيانيًا، وحدد منطقة الحل وإحداثيات رؤوسها.

c) إذا كان معاذه يتقاضى 26 ريالاً عن طلاء الجدار، و 30 ريالاً عن طلاء السقف، فاكتب دالة تمثل المبلغ الكلي الذي سيتقاضاه.

d) ما عدد الجدران والأسقف التي عليه طلاؤها ليتقاضى أكبر مبلغ؟ وما هو هذا المبلغ؟

(19) عقوبات: اكتب العبارة التالية باستخدام المتباينات، ثم مثلها بيانيًا، وحدد مجموعة من الحلول الممكنة وفسرها.

«يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسمائة ألف ريال؛ كل من حاز مادة مخدرة أو باعها أو اشتراها أو نقلها».

(20) شحن: يشحن مزارع متتجاته بالتعاون مع شركة شحن مختصة، وذلك في حاويات مبردة تبلغ حمولتها الواحدة منها 4200 kg، وحجم الحيز الذي توضع فيه البضائع بداخلها 480 ft^3 ، وتوضع المنتجات في أثناء الشحن في صناديق بمقاسين؛ صغيرة حجمها 3 ft^3 وتنزن 25 kg، وكبيرة حجمها 5 ft^3 وتنزن 50 kg، وأجرة شركة الشحن هي 5 ريالات عن كل صندوق من المقاس الصغير، و 8 ريالات عن كل صندوق من المقاس الكبير.

a) جد عدد الصناديق المشحونة من كلا النوعين لتكون الأجرة أكبر ما يمكن.

b) ما أكبر أجرة ممكنة لحاوية الشحن؟

(21) إعادة التدوير: يقوم مصنع بإعادة تدوير ما لا يزيد على 1200 طن من البلاستيك شهرياً لصنع حاويات بمقاسين صغير وكبير، وعلى المصنع أن يستعمل ما لا يقل عن 300 طن في صنع الحاويات الصغيرة وما لا يقل عن 450 طناً في صنع الحاويات الكبيرة. إذا كان المصنع يحقق ربحاً قدره 175 ريالاً لكل طن بلاستيك تم استعماله لصنع الحاويات الصغيرة، و 200 ريال لكل طن تم استعماله لصنع الحاويات الكبيرة. فما أكبر ربح يمكن تحقيقه؟ وما عدد الأطنان المستعملة لكل نوع من الحاويات لتحقيق ذلك الربح؟

مثال 3



الربط مع الحياة

صدر نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية عام 1426هـ.



الربط مع الحياة


تدوير المواد يحمي الإنسان، ويقلل الاستهلاك، ويرشد الطاقة، ويقي البيئة من المخلفات والانبعاثات الضارة.

مسائل مهارات التفكير العليا

(22) **مسألة مفتوحة:** اكتب نظام متباينات خطية على أن تكون منطقة الحل محدودة وتقع في الربع الرابع فقط ومساحتها 20 وحدة مربعة.

(23) **تحد:** جد مساحة المنطقة المحدودة بالممتباينات: $|y| \geq |x| - 3, y \leq -|x| + 3, x \geq |y|$.

(24) حدد نظام المتباينات المختلف عن الأنظمة الثلاثة الأخرى فيما يأتي، ووضح إجابتك.



(25) **تبرير:** حدد إذا كانت الجملة الآتية صحيحة أحياناً أو صحيحة دائماً أو غير صحيحة أبداً. ووضح إجابتك.

"في المنطقة غير المحدودة لا يكون للدالة قيمة عظمى وقيمة صغرى في الوقت نفسه"

تدريب على اختبار

(27) **هندسة:** أيٌ مما يأتي يُعد وصفاً مناسباً للتمثل البياني

للمعادلتين $16x + 4y = 3x - 5$, $4y = 12x + 16$

A مستقيمان لهما المقطع y نفسه.

B مستقيمان متعامدان.

C مستقيمان لهما المقطع x نفسه.

D مستقيمان متوازيان.

(26) حصل عامل على مبلغ 1950 ريالاً أجرة تبليط مساحة من الأرضيات والجدران في أحد البيوت، فإذا كانت أجرة تبليط المتر المربع من الأرضيات 12 ريالاً، وأجرة تبليط المتر المربع من الجدران 15 ريالاً وكان عدد أمتار بلاط الأرضيات يقل عن 3 أمثال عدد أمتار بلاط الجدران بـ $16m^2$ ، فأي أنظمة المعادلات الآتية تمثل هذا الموقف؟

$$12x + 15y = 1950 \quad B \quad x + y = 1950 \quad A$$

$$x + 16 = 3y \quad 3x = y$$

$$x - y = 1950 \quad D \quad 2x + 3y = 15 \quad C$$

$$12x + 15y = 3 \quad x + y = 12$$

مراجعة تراكمية

حل كل نظام مما يأتي بيانياً: (الدرس 1-5)

$$3y \leq 2x - 8 \quad (30)$$

$$4x - 3y < 7 \quad (29)$$

$$3x + 2y \geq 6 \quad (28)$$

$$y \geq \frac{2}{3}x - 1$$

$$2y - x < -6$$

$$4x - y \geq 2$$

حدد مجموعة الأعداد التي يتتمي إليها كل عدد فيما يأتي: (الدرس 1-1)

$$-\frac{1}{3} \quad (32)$$

$$-7 \quad (31)$$



دليل الدراسة والمراجعة

المفردات

الدالة المتعددة التعريف	الأعداد الحقيقية (12)
الخطية (26)	الأعداد النسبية (12)
الدالة الدرجية (26)	الأعداد غير النسبية (12)
دالة أكبر عدد صحيح (26)	الأعداد الصحيحة (12)
دالة القيمة المطلقة (26)	الأعداد الكلية (12)
المتباينة الخطية (32)	الأعداد الطبيعية (12)
منطقة الحل (32)	الدالة المتباينة (18)
الحد (32)	العلاقة المنفصلة (18)
نظام المتباينات الخطية (37)	العلاقة المتصلة (18)
القيود (44)	اختبار الخط الرأسي (18)
البرمجة الخطية (44)	المتغير المستقل (21)
محدودة (44)	المتغير التابع (21)
غير محدودة (44)	رمز الدالة (21)
الحل الأمثل (46)	الدالة المتعددة التعريف (25)

اختبار المفردات

حدد إذا كانت كل من العبارتين الآتيتين صحيحة أم خاطئة؟

- (1) $\sqrt{12}$ يتبع إلى مجموعة الأعداد النسبية.
- (2) تحتوي مجموعة الأعداد النسبية على الكسور العشرية المنتهية والدورية.

اختر المصطلح المناسب بين الأقواس لإكمال كل جملة فيما يأتي:

- (3) تكون الدالة (منفصلة، متباينة) إذا كان كل عنصر في المجال مرتبطة بعنصر مختلف في المدى، على أن لا يكون لأكثر من عنصر في المجال الصورة نفسها.

- (4) (مجال، مدى) العلاقة هو مجموعة إحداثيات x للأزواج المرتبة التي تكون العلاقة.

- (5) تُسمى الدالة التي تكتب باستعمال تعبيرين أو أكثر دالة (خطية، متعددة التعريف).

أكمل كل جملة فيما يأتي بالمصطلح المناسب:

- (6) _____ هي طريقة لإيجاد القيمة الصغرى أو العظمى لدالة تحت شروط معينة يعبر عنها بنظام من المتباينات.

- (7) إيجاد _____ يعني إيجاد السعر الأفضل أو التكلفة مجنة الخطية.

مراجعة ال دروس

1-1

خصائص الأعداد الحقيقية (الصفحتان: 12-17)

مثال 1

حدد مجموعات الأعداد التي يتبعها كل عدد مما يأتي :

$$-\frac{3}{4} \quad (11) \quad \sqrt{4} \quad (10) \quad 1.\bar{3} \quad (9)$$

$\sqrt{50}$ مجموعة الأعداد غير النسبية (I)، ومجموعة الأعداد الحقيقة (R)

مثال 2

بسط العبرة : $-4(a + 3b) + 5b$

$-4(a + 3b) + 5b = -4(a) + -4(3b) + 5b$ خاصية التوزيع

$$\begin{aligned} &= -4a - 12b + 5b \\ &= -4a - 7b \end{aligned}$$

اضرب

بسط

حدد مجموعات الأعداد التي يتبعها كل عدد مما يأتي :

$$4x - 3y + 7x + 5y \quad (12)$$

$$2(a + 3) - 4a + 8b \quad (13)$$

$$4(2m + 5n) - 3(m - 7n) \quad (14)$$

(15) مال : اشتري سعد 3 شطاير بسعر 3.5 ريال للشطيرة الواحدة، و 3 علب عصير بسعر 2.5 ريال للعلبة الواحدة.

(a) استعمل خاصية التوزيع لكتاب عبارتين تمثل كل منها المبلغ الذي دفعه سعد.

(b) أوجد المبلغ الذي دفعه سعد باستعمال خاصية التوزيع.

1-2

العلاقات والدوال (الصفحتان: 18-23)

مثال 3

حدد مجال العلاقة

$\{(6, -4), (-1, 0), (-2, 4), (3, -1), (2, 6)\}$ ومداها. ثم حدد إن كانت تمثل دالة أم لا. وهل هي متباينة أم لا؟

المجال: $\{-4, -2, -1, 2, 3\}$

المدى: $\{-1, 0, 3, 4, 6\}$

كل عنصر في المجال مرتبط بعنصر واحد فقط في المدى، مما يعني أن العلاقة تمثل دالة. العناصر المختلفة في المجال لها صور مختلفة في المدى، إذاً الدالة متباينة.

مثال 4

إذا كانت $3 - 4x = f(x)$ ، فأوجد $f(-2)$.

عوض عن x بـ -2

$$f(-2) = 4(-2) - 3$$

$$\begin{aligned} &= -8 - 3 \\ &= -11 \end{aligned}$$

اضرب

$$\begin{aligned} &= -8 - 3 \\ &= -11 \end{aligned}$$

بسط

حدد مجال كل علاقة مما يأتي ومداها، وبين ما إذا كانت دالة أم لا، وإذا كانت كذلك فهل هي متباينة أم لا؟

$$\{(1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8)\} \quad (16)$$

$$\{(-3, 0), (0, 2), (2, 4), (4, 5), (5, 2)\} \quad (17)$$

$$\{(-4, 1), (3, 3), (1, 1), (-2, 5), (3, -4)\} \quad (18)$$

$$\{(7, -4), (5, -2), (3, 0), (1, 2), (-1, 4)\} \quad (19)$$

إذا كانت $2 - 3x = f(x)$ ، أوجد قيمة كل مما يأتي:

$$f(-3) \quad (21) \quad f(4) \quad (20)$$

$$f(y) \quad (23) \quad f(0) \quad (22)$$

$$f(2w) \quad (25) \quad f(-a) \quad (24)$$

(26) مناسبات: تتقاضى مؤسسة لتجهيز المناسبات 100 ريال عن توصيل اللوازم لمكان المناسبة، و 4 ريالات أجراً يومية عن كل كرسي. ويمكن تمثيل ما تتقاضاه هذه المؤسسة عند استئجار x كرسيًا بالمعادلة: $y = 100 + 4x$. أوجد مجال هذه المعادلة ومداها، ثم حدد ما إذا كانت المعادلة دالة أم لا، وهل هي متصلة أم منفصلة؟




دليل الدراسة والمراجعة

1-3

دوال خاصة (الصفحات: 25-30)

مثال 5

اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانيًا في الشكل أدناه:



دالة الجزء الأيسر من التمثيل البياني هي $f(x) = 3x$. الدائرة غير المظللة عند النقطة $(3, -2)$ ، تعني أن الدالة الخطية معروفة عندما $x < -2$.

دالة الجزء الأوسط من التمثيل البياني هي $f(x) = 1 - x$. وتعني كل من الدائرة المظللة عند النقطة $(-3, -2)$ والدائرة غير المظللة عند النقطة $(1, 2)$ ، أن الدالة معروفة عندما $-2 \leq x < 1$.

دالة الجزء الأيمن من التمثيل البياني هي $f(x) = 2x$. والدائرة المظللة عند النقطة $(2, 4)$ ، تعني أن الدالة معروفة عندما $x \geq 2$.


$$f(x) = \begin{cases} 3x, & x < -2 \\ 1 - x, & -2 \leq x < 1 \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}$$

مثل كل دالة فيما يأتي بيانياً، ثم حدد مجالها ومداها:

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq -1 \\ x + 1, & -1 < x < 3 \\ x, & x \geq 3 \end{cases} \quad (27)$$

$$f(x) = \begin{cases} -3, & x < -1 \\ 4x - 3, & -1 \leq x \leq 3 \\ x, & x > 3 \end{cases} \quad (28)$$

(29) اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانيًا في الشكل أدناه:



مثل كل دالة فيما يأتي بيانياً، ثم حدد كلاً من مجالها ومداها:

$$f(x) = [x] + 2 \quad (30)$$

$$f(x) = [x + 3] \quad (31)$$



1-4


تمثيل المتباينات الخطية ومتباينات القيمة المطلقة بيانياً (الصفحات: 32-36)

مثال 6

مثل المتباينة $6 > 2y - x$ بيانياً.

بما أن المتباينة تحتوي على إشارة $>$ ، فإن حد المتباينة يكون متقطعاً، مثل بيانياً المعادلة المرتبطة $6 = 2y - x$.

اختر النقطة $(0, 0)$ التي لا تقع على حد المتباينة



$x - 2y > 6$

$$0 - 2(0) \geq 6$$

$$\text{X} \quad 0 > 6$$

ظلل المنطقة التي لا تحتوي $(0, 0)$

مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً:

$$y \geq 2x + 1 \quad (33)$$

$$x - 3y < 6 \quad (32)$$

$$y > -3x - 5 \quad (35)$$

$$2x + 4y \leq 12 \quad (34)$$

$$y \geq |2x - 2| \quad (37)$$

$$y > |2x| \quad (36)$$

$$2y \leq |x - 3| \quad (39)$$

$$y + 3 < |x + 1| \quad (38)$$

(40) **شراء:** وفر بندر 46 ريالاً لشراء مجموعة من الدفاتر، والأقراص المدمجة، فإذا كان سعر الدفتر الواحد 4 ريالات، وسعر القرص المدمج 3 ريالات، اكتب متباينة تمثل عدد الدفاتر والأقراص المدمجة التي يمكن شراؤها، ثم مثلها بيانياً.

1-5

حل أنظمة المتباينات الخطية بيانياً (الصفحات: 37-42)


مثال 7

حل نظام المتباينات الآتي بيانياً:

$$y \geq \frac{3}{2}x - 3$$

$$y < 4 - 2x$$

منطقة الحل هي المنطقة التي كل نقطة من نقاطها تتحقق كلتا المتباينتين، وهي المنطقة المظللة في الشكل أدناه.



حل كل نظام مما يأتي بيانياً :

$$|y| > 2 \quad (42)$$

$$y < 2x - 3 \quad (41)$$

$$x > 3$$

$$y \geq 4$$

$$y > x + 1 \quad (44)$$

$$y \geq x + 3 \quad (43)$$

$$x < -2$$

$$2y \leq x - 5$$

(45) **مجوهرات:** أمضى صائغ مجوهرات ما لا يزيد على 3 ساعات في صياغة الخواتم. فإذا كان الزمن الذي يتطلب تجهيز المعدات 15 دقيقة، والزمن الذي تتطلبه صياغة الخاتم الواحد 25 دقيقة، فاكتب نظام متباينات يصف الموقف، ومثله بيانياً.



دليل الدراسة والمراجعة

1-6

البرمجة الخطية والحل الأمثل (الصفحتان: 44-49)

مثال 8

زراعة: يزرع فิصل ما لا يزيد على 300 شتلة من نوعين من الأشجار في مزرعته التي مساحتها 5184 m^2 , حيث تحتاج الشجرة الواحدة من النوع (A) إلى مساحة 6 m^2 , ومن النوع (B) إلى 24 m^2 , وذلك لتوفير مسافة كافية بين الأشجار. إذا كان سعر الشتلة الواحدة من النوع (A) 8 ريالات، وسعر الشتلة الواحدة من النوع (B) 12 ريالاً. فما عدد الشتلات من كل نوع الذي يجعل التكلفة أكبر ما يمكن؟


افرض أن x هي عدد الشتلات من النوع (A)، و y هي عدد الشتلات من النوع (B).

$$\begin{aligned}x &\geq 0, y \geq 0 \\6x + 24y &\leq 5184 \\x + y &\leq 300\end{aligned}$$

مثل المطالبات بيانياً، ولاحظ أن النقاط $(0, 216)$, $(112, 188)$, $(300, 0)$, $(0, 216)$, $(112, 188)$ تمثل رؤوس منطقة الحل.

دالة التكلفة هي : $f(x, y) = 8x + 12y$

القيمة 3152 ريالاً هي القيمة العظمى للتكلفة وتحصل عند النقطة $(112, 188)$. ولذلك إذا زرع فيصل 112 شتلة من النوع (A)، و 188 شتلة من النوع (B) فإن التكلفة تكون أكبر ما يمكن.



(46) **تنسيق أزهار:** يعمل جميل منسقاً للأزهار، ويقوم بتنسيق نوعين من باقات الأزهار. يحتاج النوع الأول منها إلى 18 دقيقة، والنوع الثاني إلى 10 دقائق. ولا يزيد عدد الباقات التي ينجزها أسبوعياً من النوع الثاني عن ضعف عدد باقات النوع الأول. فإذا كان جميل يعمل مدة لا تزيد على 40 ساعة أسبوعياً وكان ربحه في تنسيق الباقة من النوع الأول 10 ريالات، ومن النوع الثاني 25 ريالاً. فحدد عدد الباقات التي يجب عليه تنسيقها من كل نوع أسبوعياً ليحصل على أكبر ربح.

(47) **صناعة:** ينتج مصنع نوعين من الأحذية على مرحلتين، ويحتاج الحذاء من النوع الأول إلى ساعتين في المرحلة الأولى وساعة واحدة في المرحلة الثانية، ويحقق ربحاً قدره 20 ريالاً. أما الحذاء من النوع الثاني فيحتاج إلى ساعة واحدة في المرحلة الأولى و 3 ساعات في المرحلة الثانية ويتحقق ربحاً قدره 15 ريالاً. فإذا كان مجموع ساعات العمل اليومي لموظفي المرحلة الأولى لا يزيد على 40 ساعة ولا يزيد على 60 ساعة لموظفي المرحلة الثانية، مما أكبر ربح يمكن أن تحققه الشركة يومياً؟ وما عدد الأحذية من كل نوع الذي يحقق هذا الربح؟



اختبار الفصل

1

حل كل نظام مما يأتي بيانياً :

$$2x + 3y > 12 \quad (13)$$

$$x + y \leq 4 \quad (12)$$

$$3x - y < 21$$

$$y \geq x$$

$$2y - 5x \leq 6 \quad (15)$$

$$x - y > 0 \quad (14)$$

$$4x + y < -4$$

$$4 + y \leq 2x$$

- (16) **اختيار من متعدد:** استأجر خالد سيارة ليوم واحد من إحدى الشركات، فدفع 100 ريال أجرة يومية وريالاً واحداً عن كل كيلومتر تقطعه السيارة بعد قطعها مسافة 200 كيلومتر، أما سعيد فاستأجر سيارة من شركة أخرى، ليوم واحد أيضاً فدفع 50 ريالاً أجرة يومية وريالين عن كل كيلومتر تقطعه السيارة بعد قطعها مسافة 200 كيلومتر. فما عدد الكيلومترات التي تجعل قيمة الاستئجار من الشركتين متساوية؟

304 C

292 A

275 D

250 B

- (17) **نجارة:** تصنع ورشة نجارة طاولات ومقاعد ثم تقوم بطلائهما. ويبين الجدول الآتي الزمن الذي تتطلبه صناعة وطلاء كل من الطاولة والمقعد:

زمن الطلاء بالساعات	زمن الصناعة بالساعات	المنتج
0.5	3	مقعد
1	2	طاولة

إذا كان مجموع ساعات عمل فنيي صناعة المنتجات 108 ساعات يومياً، ومجموع ساعات عمل فنيي دهان المنتجات 20 ساعة يومياً، وكان ربح الورشة من الطاولة الواحدة 35 ريالاً، ومن المقعد الواحد 25 ريالاً فكم طاولة ومقعداً يجب صنعهما يومياً ليكون الربح أكبر ما يمكن؟

- (a) بفرض أن عدد الطاولات t ، وعدد الكراسي c ، اكتب نظام متبادرات يمثل الموقف.
- (b) مثل منطقة الحل بيانياً.
- (c) جد عدد الطاولات وعدد المقاعد التي يجب صنعها ليكون الربح أكبر ما يمكن. وما أكبر ربح؟

مثل نظام المتبادرات الآتي بيانياً، وحدد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، ثم أوجد القيمة العظمى والصغرى للدالة المعطاة في منطقة الحل:

$$-3 \leq y \leq 5, 4x + y \leq 5, -2x + y \leq 5 \quad (18)$$

$$f(x, y) = 4x - 3y$$

$$\cdot -4(3a + b) - 2(a - 5b)$$

$$(2) \text{ اختيار من متعدد: } \text{إذا كان } 3m + 5 = 23, \text{ فما قيمة}$$

$$?2m - 3$$


9 C

105 A

6 D

 $\frac{47}{3}$ B

- (3) **بستنة:** يريد عبدالله تصميم 3 أحواض للورود في حديقة منزله، فأحاط كلاً منها بسياج.



إذا كانت الأحواض الثلاثة متطابقة ولها الشكل المجاور، فكم قدماً من السياج يحتاج إليه لإحاطة الأحواض الثلاثة؟

$$(4) \text{ إذا كان } 2 = -x, y = \frac{2}{3}, \text{ فأوجد قيمة}$$

- (5) حدد مجال العلاقة المبينة في الجدول الآتي ومداها، ثم حدد إذا كانت تمثل دالة أم لا، وهل هي متباعدة أم لا؟

x	y
-2	3
4	-1
3	2
6	3

إذا كانت $3 + 2x = f(x)$ ، فأوجد قيمة كل مما يأتي:

$$(6) f(-4) \quad (7) f(3y)$$

- (8) **اختيار من متعدد:** إذا كانت تكلفة إنتاج x فطيرة جبن في أحد المخابز يُعبر عنها بالدالة $C(x) = 6 + 0.75x$ ، فأوجد تكلفة إنتاج 20 فطيرة.

13.5 A 21 ريالاً


28.61 B 38.4 ريالاً

$$(9) \text{ مثل الدالة } f(x) \text{ بيانياً.} \\ f(x) = \begin{cases} -x, & x < -2 \\ x + 2, & -2 \leq x \leq 2 \\ 5, & x > 2 \end{cases}$$

مثل كل متباعدة فيما يأتي بيانياً:

$$(10) y \geq 4x - 1 \quad (11) 2x + 6y < -12$$

الإعداد للاختبارات المعيارية



الأسئلة ذات الإجابات القصيرة

تطلب منك الأسئلة ذات الإجابات القصيرة أن تقدم لها حلًّا، متضمنًا الطريقة والبريرات والتفسيرات التي استعملتها. وفي العادة يتم تصحيح هذه الأسئلة وتحدد درجاتها باستعمال سالم التقدير. وهذا مثال على تصحيح هذا النوع من الأسئلة.

سالم التقدير		
الدرجة	المعايير	
2	الإجابة صحيحة مدعومة بتفسيرات كاملة توضح كل خطوة.	درجة كاملة
1	• الإجابة صحيحة، لكن التفسيرات ليست كاملة.	درجة جزئية
1	• الإجابة غير صحيحة، لكن التفسيرات صحيحة.	
0	لم يقدم أي إجابة، أو أن الإجابة ليس لها معنى.	لا يستحق درجة

استراتيجيات حل الأسئلة ذات الإجابة القصيرة

خطوة 1

- اقرأ المسألة جيدًا؛ كي تفهم الشيء الذي تحاول حلّه.
- حدد الحقائق ذات العلاقة.
 - ابحث عن الكلمات المفتاحية والمصطلحات الرياضية.

خطوة 2

- ضع خطة وحل المسألة.
- فسّر ببريرك أو اعرض الطريقة التي ستبعها لحل المسألة.
 - اكتب الحل كاملاً مبيناً الخطوات جميعها.
 - تحقق من إجابتك إذا سمح الوقت بذلك.

مثال

اقرأ المسألة الآتية جيدًا، وحدد المطلوب. ثم استعمل المعلومات الواردة في حل السؤال، واتكتب خطوات الحل.

قدمت شركتا اتصالات عروضاً للجمهور على النحو التالي: قيمة الاشتراك الشهري للشركة A هي 14.5 ريالاً مضافاً إليه 0.05 ريال عن كل دقيقة اتصال، وقيمة الاشتراك الشهري للشركة B هو 20.00 ريالاً مضافاً إليه 0.04 ريال عن كل دقيقة اتصال. أوجد عدد الدقائق التي يمكن أن يستخدمها المشترك، بحيث يدفع المبلغ نفسه شهرياً لكلا الشركتين.



اقرأ السؤال بعناية؛ لديك معلومات عن شركتين مختلفتين للاتصالات، والعروض للاشتراكات الشهرية المقدمة من كل منها. حيث إن قيمة الفاتورة تعتمد على قيمة ثابتة للاشتراك الشهري، بالإضافة إلى مبلغ متغير يعتمد على عدد دقائق الاتصال، والمطلوب منك تحديد عدد الدقائق التي يمكن استخدامها من قبل المشترك لكل من الشركتين بحيث يدفع المبلغ نفسه، ويمكنك تكوين نظام معادلتين آتىين وحله.

إجابة تستحق الدرجة الكاملة (2).

كون نظاماً من معادلتين، وحله.


قيمة الفاتورة الشهرية = قيمة الاشتراك الشهري + تكلفة الدقيقة × عدد الدقائق.

افرض أن y = قيمة الفاتورة الشهرية، و x = عدد الدقائق المستعملة شهرياً.

$$y = 14.5 + 0.05x \quad (\text{الشركة } A)$$

$$y = 20 + 0.04x \quad (\text{الشركة } B)$$

حل النظام بيانياً.



حل النظام هو (550, 42)، أي أن المشترك سيدفع 42 ريالاً إذا اتصل 550 دقيقة شهرياً، سواءً أكان مشتركاً في الشركة A أو B.

خطوات الحل والحسابات والتبريرات واضحة، وتوصيل الطالب إلى الإجابة الصحيحة، إذن تستحق هذه الإجابة درجتين.

تمارين ومسائل

اقرأ كل سؤال فيما يأتي، وحدد المطلوب، ثم استعمل المعلومات الواردة في السؤال، واتكتب خطوات الحل:


- 2) يرغب خالد في شراء بعض الأدوات المدرسية بحيث لا يدفع أكثر من 50 ريالاً، فإذا كان ثمن المسطرة الواحدة 4.75 ريالات، وثمن القلم الواحد 6.5 ريالات، وأراد شراء قطعتين من كل نوع على الأقل، اكتب نظام المتباينات، ومثل منطقة الحل على المستوى الإحداثي. ثم أعط ثلاثة حلول مختلفة.

- 1) افترض علي ومحمود مبلغ 11000 ريال لشراء آلة زراعية لبدء مشروعهم التجاري لقص الحشائش في الحدائق، فإذا كانوا يتلقاون مبلغ 245 ريالاً أجراً من كل زبون لقص حشائش الحديقة الواحدة، ويدفعون 20.5 ريالاً بدل صيانة وثمناً للمحروقات، فبعد كم حديقة سيبدؤون في تحقيق الربح.



أسئلة الاختيار من متعدد

(5) ميل المستقيم الممثل بيانياً على المستوى الإحداثي الآتي هو:



$-\frac{1}{2}$ C

2 D

-2 A

$\frac{1}{2}$ B

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

إذا كانت $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x$ ، فما قيمة $f(-3)$ (1)


-6 C

-7 A

4 D

-1 B

(6) على الشكل أدناه منطقة حل النظام:



$y \leq \frac{1}{2}x - 2$

$y \leq -\frac{2}{3}x - 1$

I المنطقة A

II المنطقة B

III المنطقة C

IV المنطقة D

(2) يمكن حساب حجم المخروط الدائري القائم الذي ارتفاعه h وطول نصف قطر قاعدته r بضرب ثلث π في الارتفاع في مربع نصف قطر القاعدة. فأي المعادلات الآتية تمثل حجم المخروط المجاور؟



$V = \frac{1}{3}\pi rh$ C

$V = \frac{1}{3}\pi rh^2$ D

$V = \frac{1}{3}\pi r^2h$ A

$V = 3\pi r^2h$ B

(7) النقطة التي لا تمثل رأساً لمنطقة حل النظام:

: $x \geq 0, y \geq 0, y \leq -2x + 6$ هي:

(0, 6) C (0, 0) A

(3, 0) D (0, 3) B

(4) مجال العلاقة الموضحة في الجدول الآتي هو:

x	y
-3	4
1	-1
2	0
6	-3

{0, 1, 2, 4, 6} A

{-3, -1, 0, 4} B

{-3, 1, 2, 6} C

{-3, -1} D

أسئلة ذات إجابات قصيرة

(13) تُعد فاطمة نوعين من أطباق الحلوي؛ ويحتاج النوع الأول إلى 5 أكواب من الدقيق، وكوبين من السكر، أما النوع الثاني فيحتاج إلى 5 أكواب من الدقيق، وكوب واحد من السكر. فإذا كان لديها 40 كوبًا من الدقيق، و 15 كوبًا من السكر، وتكلفة إعداد طبق من النوع الأول 12 ريالاً، وطبق من النوع الثاني 8 ريالات.

(a) اكتب نظام متباعدة خطية يمثل عدد الأطباق التي يمكن لفاطمة إعدادها باستعمال الكميات المتوافرة.

(b) مثل نظام المتباعدة الخطية الذي حصلت عليه في (a) بيانياً، واكتب إحداثيات نقاط رؤوس منطقة الحل.

(c) اكتب دالة تمثل التكلفة.


(d) ما عدد الأطباق من كل نوع الذي يجعل التكلفة أكبر ما يمكن؟ وما التكلفة في هذه الحالة؟

أجب عن كلٍ مما يأتي:

(8) بسط العبارة أدناه:

$$-4(3a - b) + 3(-2a + 5b)$$

(9) اكتب معادلة الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانياً في الشكل أدناه:



(10) جد قيمة الدالة المتعددة التعريف في التمرين (9) عند $x = -3$.

أسئلة ذات إجابات مطولة

أجب عن كلٍ مما يأتي موضحاً خطوات الحل:

(11) مثل المتباعدة $2 - |x| \geq y$ بيانياً.

(12) قدر مدير مخبز الريح في كل قطعة كعك يبيعها بـ 0.45 ريال، ولكل فطيرة 0.5 ريال.

(a) يأمل مدير المخبز أن يحصل على ربح لا يقل عن 150 ريالاً من بيع الكعك والفتائر يومياً. افترض أن x عدد قطع الكعك المبيعة، ولا عدد الفتائر المبيعة، اكتب متباعدة تمثل هذا الموقف.

(b) مثل المتباعدة بيانياً.

(c) إذا باع المخبز 180 قطعة كعك و 160 فطيرة في يوم ما، فهل سيحصل على الربح المطلوب؟ فسر إجابتك.

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

إذا لم تستطع حل سؤال ...

فعد إلى ...

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1-6	1-6	1-4	1-3	1-3	1-1	1-6	1-5	مهارة سابقة	1-2	1-1	1-2	1-2	

الفصل 2

المصفوفات Matrices



فيما سبق:

درست حل نظام من المعادلات.

والآن:

- أنظم البيانات في مصفوفة.
- أجري العمليات على المصفوفات.
- أحسب المحددات.
- أجد النظير الضربي لمصفوفة من الرتبة 2×2 .
- استعمل المصفوفات لحل نظام من المعادلات.

لماذا؟

تنظيم البيانات: غالباً ما تستعمل المصفوفات لتنظيم البيانات، فمثلاً إذا نظم الطلاب المشاركون في الألعاب الرياضية المختلفة من مدرستين ثانويتين في مصفوفات مختلفة، فإن أعداد جميع الطلاب المشاركون في هذه الألعاب يمكن الحصول عليها بجمع المصفوفات.

الـ طويات

منظم أفكار




المصفوفات، اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم ملاحظاتك حول المصفوفات، مبتدئاً بورقة A4.

٤ اكتب على كل جيب عنواناً لدرس من دروس الفصل، واكتب عنوان الفصل.

٣ أعد الطyi، ثم ثبت الجيوب مستعملاً الدبّاسة.

٢ اطوي الورقة الناتجة إلى أرباع، ثم قصّ كما في الشكل.

١ اثن حافة الورقة بعرض 2cm بموازاة الضلعين القصيرين.





التهيئة للفصل 2

تشخيص الاستعداد:

أجب عن الاختبار الآتي ، وارجع إلى "المراجعة السريعة" : لمساعدتك على ذلك.

مراجعة سريعة

اختبار سريع

مثال 1

أوجد كلاً من النظير الجمعي والنظير الضريبي للعدد 5
النظير الجمعي للعدد 5 - هو العدد x ، بحيث إن $x = 0$

النظير الضريبي للعدد 5 - هو العدد y ، حيث إن $1 = -5y$ ،
لذا فإن $y = -\frac{1}{5}$.

مثال 2

$$\text{بسط العبارة : } \frac{3}{4}(8x - 4) + 3x$$

$$= \frac{3}{4}(8x) - \frac{3}{4}(4) + 3x$$

خاصية التوزيع

بسط

اجمع الحدود المتشابهة

مثال 3

حل نظام المعادلتين الآتي جبرياً:

$$3y = x - 9$$

$$4x + 5y = 2$$

بما أن معامل x في المعادلة الأولى هو 1 ، فاستعمل طريقة التعويض. أولاً: حل المعادلة بالنسبة للمتغير x .

$$3y = x - 9 \rightarrow x = 3y + 9$$

$$x = 3y + 9 \quad \text{أو} \quad 4(3y + 9) + 5y = 2$$

خاصية التوزيع

اجمع الحدود المتشابهة

قسمة الطرفين على 17

ولإيجاد قيمة x ، استعمل المساواة $2 = y$ في المعادلة الأولى.

$$3(-2) = x - 9$$

بالضرب

اجمع 9 للطرفين

$$-6 = x - 9$$

$$3 = x$$

$$\text{ف يكون الحل } (3, -2).$$

أوجد كلاً من النظير الجمعي والنظير الضريبي لكل عدد مما يأتي: (يُستعمل مع الدروس 2-2 إلى 2-5)

$$-15 \quad (1) \quad 4$$

$$-1.35 \quad (4) \quad 0.2 \quad (3)$$

$$2\frac{1}{3} \quad (6) \quad -\frac{3}{4} \quad (5)$$

بسط كل عبارة مما يأتي: (يُستعمل مع الدروس 1-2 إلى 1-5)

$$6(x + 2y) \quad (7)$$

$$4(x + 5) - 3 \quad (8)$$

$$-4(3x) - (7x - 6) \quad (9)$$

$$5(2x - 5) - \frac{1}{3}(4x + 1) \quad (10)$$

$$6(2x - 1) - 3(y - x) + 0.5(4x - 6) \quad (11)$$

حل نظام المعادلتين في كل مما يأتي جبرياً: (يُستعمل مع الدروس 2-5)

$$2x - 5y = -18 \quad (13) \quad 2x - y = -1 \quad (12)$$

$$3x + 4y = 19 \quad y = x + 3$$

$$4x + 2y = 4 \quad (15) \quad 4y + 6x = -6 \quad (14)$$

$$x = y - 8 \quad 5y - x = 35$$

(16) جوائز: توزع مدرسة جوائز (حقائب وأقلام) كل عام على المتفوقين، بلغ إجمالي ثمنها هذا العام 534 ريالاً، وكان سعر الحقيبة 30 ريالاً، وسعر القلم 9 ريالات، أما في العام السابق فبلغ إجمالي ثمن الجوائز 448 ريالاً، وكان سعر الحقيبة 25 ريالاً، وسعر القلم 8 ريالات. اكتب نظاماً من معادلتين، ثم حله لتجد عدد الحقائب والأقلام المشتراء في كل عام، علماً بأن الحقائب والأقلام لها العدد نفسه في العامين.

مقدمة في المصفوفات

Introduction to Matrices


لماذا؟



هاتف محمول: حصل صالح على عدة عروض لشراء هاتف محمول حسب النوع، وسعة الذاكرة، والسعر. وحتى يكون قادرًا على المقارنة بين العروض بسهولة، نظم البيانات في مصفوفة كما يلي:

	السعر	سعة الذاكرة	النوع
عرض الأول	a	256	2600
عرض الثاني	b	256	2500
عرض الثالث	c	128	2420
عرض الرابع	d	64	2390

تنظيم البيانات: المصفوفة هي ترتيب على هيئة مستطيل لمتغيرات أو أعداد في صفوف أفقية وأعمدة رأسية، محصورة بين قوسين. وتُنظم الأعداد أو البيانات في المصفوفة بحيث يكون الموضع في المصفوفة ذا معنى. وُتسمى كل قيمة في المصفوفة **عنصرًا**. ويرمز إلى المصفوفة عادة باستعمال حرف كبير تخته خط مثل A و B .



يمكنك تحديد نوع المصفوفة **برتبتها**: فالمصفوفة المكونة من m صفًا و n عمودًا يقال عنها مصفوفة من الرتبة $m \times n$ أو من النوع $m \times n$ (تقرأ " m في n "). فالمصفوفة A في الأعلى هي مصفوفة من النوع 3×4 أو من الرتبة 4×3 ؛ لأنها تحتوي على 3 صفوف، و 4 أعمدة. يدل الرمز a_{12} على عنصر في المصفوفة A ، على حين يدل الرمز b_{12} على عنصر في المصفوفة B .

رتبة المصفوفة وعناصرها

مثال 1

استعمل المصفوفة $A = \begin{bmatrix} -18 & 6 & 38 \\ 9 & -9 & 22 \end{bmatrix}$ للإجابة عن كل مما يأتي:

(b) ما قيمة العنصر a_{21} ؟

$$\text{صف 2} \rightarrow \begin{bmatrix} -18 & 6 & 38 \\ 9 & -9 & 22 \end{bmatrix}$$

↑ عمود 1

بما أن العنصر a_{21} موجود في الصف 2، والعمود 1، فإن قيمته هي 9.

(a) حدد رتبة المصفوفة A .

$$\text{صفان} \left\{ \begin{bmatrix} -18 & 6 & 38 \\ 9 & -9 & 22 \end{bmatrix} \right. \quad \left. \begin{array}{c} \text{أعمدة} \\ 3 \end{array} \right.$$

بما أن A فيها صفان و 3 أعمدة، فإن رتبتها 3×2 .

تحقق من فهمك

$$B = \begin{bmatrix} 10 & -8 \\ -2 & 19 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$$

(1A) ما رتبة B ؟

فيما سبق:

درست حل مسائل باستعمال تنظيم البيانات في جداول.
(مهارة سابقة)

والآن:

- أنظم بيانات في مصفوفة.
- أستعمل العمليات على عناصر صفات أو أعمدة مصفوفة لتحليل البيانات.

المفردات:

المصفوفة
matrix

العنصر
element

الرتبة
order

مصفوفة الصف
row matrix

مصفوفة العمود
column matrix

المصفوفة المربعة
square matrix

المصفوفة الصفرية
zero matrix

المصفوفات المتساوية
equal matrices

قراءة الرياضيات

يدل الرمز a_{ij} على العنصر الواقع في الصف i والعمود j من المصفوفة A .

بعض المصفوفات لها تسميات خاصة.

المصفوفة الصفرية جميع عناصرها أصفار.	المصفوفة المربعة عدد الصفوف فيها يساوي عدد الأعمدة.	مصفوفة عمود تحوي عموداً واحداً.	مصفوفة صف تحوي صفاً واحداً.
$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ -1 \end{bmatrix}$	$[8 \quad -5 \quad 2 \quad 4]$

تكون **المصفوفتان متساويتين** إذا كانتا من الرتبة نفسها ، وتساوت عناصرهما المتناظرة.

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & -5 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 6 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -3 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

المصفوفتان متساويتان.

ليست جميع العناصر المتناظرة متساوية.

المصفوفتان لهما رتبتان مختلفتان.

إرشادات للدراسة

العناصر المتناظرة
يدل التناظر على العناصر التي تقع بالضبط في الموقع نفسه من كل مصفوفة.

تستعمل المصفوفات لتنظيم البيانات وتحليلها.

مثال 2 من واقع الحياة

كرة قدم: رصد مدرب أحد فرق كرة القدم إنجازات ثلاثة لاعبين في مباريات الموسم الحالي فكانت على النحو الآتي:

ياسر: 20 مباراة، 31 تسديدة، 20 تمريرة، 30 قطع تمريرات، 4 أهداف.

ماجد: 18 مباراة، 43 تسديدة، 170 تمريرة، 40 قطع تمريرات، 11 هدفاً.

معاذ: 12 مباراة، 24 تسديدة، 113 تمريرة، 15 قطع تمريرات، 4 أهداف.

(a) نظم البيانات في مصفوفة A ، على أن تُرتّب أسماء اللاعبين تنازليًّا حسب عدد التسديدات.

(b) حدد رتبة المصفوفة. وما قيمة a_{23} ؟

	الأهداف	قطع التمريرات	التمريرات	التسديدات	المباريات
ماجد	18	43	170	40	11
ياسر	20	31	20	30	4
معاذ	12	24	113	15	4

(b) هناك 3 صفوف، و 5 أعمدة؛ لذا فإن رتبة المصفوفة 5×3 وقيمة العنصر a_{23} الموجودة في الصف 2 ، والعمود 3 ، هي 20.

أسعار البيتزا (بالريال)

	كثيرة	وسط	صغيرة
ثمار البحر	13	24	35
الخضار	12	23	34
الدجاج	14	25	36
اللحم	15	27	37

تحقق من فهمك

(2) **بيتزا:** يبين الجدول المجاور الأسعار بالريال لأربعة أنواع من البيتزا بثلاثة أحجام في أحد المطاعم.

(A) نظم هذه البيانات في مصفوفة A ، على أن تكون الأسعار مرتبة تصاعديًّا.

(B) حدد رتبة المصفوفة.

(C) ما قيمة العنصر a_{21} ؟

تحليل البيانات: عند تنظيم البيانات في مصفوفة، يسهل تحليلها وتفسيرها. وتعطي مجاميع عناصر الصفوف أو الأعمدة أحياناً معلومات ذات معنى. وفي أحياناً أخرى لا تعطي أي معلومات ذات معنى.

تحليل البيانات باستعمال المصفوفات

مثال 3

		الأهداف			قطع التمريرات	التمريرات التسديدات	المباريات
18	43	170	40	11			
20	31	20	30	4			
12	24	113	15	4			

كرة قدم: إذا أراد مدرب فريق كرة القدم، (في مثال 2) استعمال المصفوفة للحصول على تحليلات إضافية لإحصائيات لاعبيه الثلاثة:
 a) اجمع عناصر كل من العمودين 2 و 3، وفسر النتائج.

مجموع عناصر عمود 2 يساوي 98، وهو يمثل العدد الكلي لتسديدات اللاعبين خلال جميع المباريات.

مجموع عناصر عمود 3 يساوي 303، وهو يمثل العدد الكلي لتمريرات اللاعبين خلال جميع المباريات.

b) أراد المدرب تحديد معدل تسديد اللاعب في المباراة الواحدة، فقرر أن يجمع عناصر العمود 2 ويقسم المجموع على 3 ، فما الناتج؟

الناتج هو 33 تقريباً.

c) هل كانت طريقة المدرب في حساب معدل تسديد اللاعب في المباراة الواحدة صحيحة؟ فسر إجابتك.
 لا؛ لأن مجموع التسديدات في العمود 2 ليس لثلاث مباريات، ويتغير على المدرب بدلاً من ذلك قيمة مجموع عناصر العمود 2 على مجموع عناصر العمود 1 حيث سيكون المعدل الدقيق $1.96 = 98 \div 50$.

d) هل جمع عناصر الصفوف يزود المدرب بيانات ذات معنى؟ فسر إجابتك.
 لا؛ لأن عناصر الصف عبارة عن خمسة أنواع مختلفة من البيانات.

تحقق من فهمك

عدد المحافظات من الفئتين أ، ب في 4 مناطق مختلفة في المملكة		
المنطقة	محافظة فئة ب	محافظة فئة أ
الرياض	12	8
مكة المكرمة	9	7
المدينة المنورة	4	4
القصيم	5	7

المصدر: المملكة العربية السعودية، حقائق وأرقام، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، 1433هـ

3) **محافظات:** بين الجدول المجاور عدد المحافظات من الفئتين أ، ب في 4 مناطق إدارية مختلفة في المملكة.

(A) نظم البيانات في مصفوفة .

(B) اجمع عناصر كل عمود، وفسر النتائج.

(C) اجمع عناصر كل صف، وفسر النتائج.

(D) هل بإيجاد معدل عناصر كل صف يعطي بيانات ذات معنى؟

إرشادات للدراسة

عرض البيانات

يكون من الممكن أحياناً تبديل عناصر الصفوف وعنصر الأعمدة في المصفوفات التي تمثل معلومات من واقع الحياة.

تأكد

حدّد رتبة كل مصفوفة فيما يأتي:

مثال 1

$$\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 9 \\ 17 & 21 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix} \quad (2) \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 & -4 & 0 \\ -2 & 3 & 6 & -8 \end{bmatrix} \quad (1)$$

إذا كانت $\underline{A} = \begin{bmatrix} 1 & -6 & x & -4 \\ -2 & 3 & -1 & 9 \\ 5 & -8 & 2 & 12 \end{bmatrix}$ ، فما قيمة كل عنصر فيما يأتي:

a_{24} (7)

a_{33} (6)

a_{11} (5)

a_{32} (4)

المثالان 3 ، 2 (8) زراعة: يبين الجدول المجاور عدد صناديق الخضروات المنتجة في مزرعتين مختلفتين في أحد المواسم:

المزرعة	خيار	كوسة	بازنجان	طماطم
1	540	570	488	500
2	850	1015	800	820

(a) نظم البيانات في مصفوفة.

(b) ما النوع الأقل إنتاجاً؟

(c) اجمع عناصر كل صف، وهل لهذه المجموع معنى؟ فسر إجابتك.

(d) اجمع عناصر كل عمود، وفسّر إجابتك.

تدريب وحل المسائل

مثال 1 حدد رتبة كل مصفوفة فيما يأتي:

$$\begin{bmatrix} 6 & 11 & -4 & -2 \\ -8 & 5 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 15 & y \\ 8 & -9 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$[-9 \ 6] \quad (9)$$

$$[115] \quad (14)$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ x \\ -3 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 & -1 \\ x & 3y & 0 \\ 8 & 12 & 11 \end{bmatrix} \quad (12)$$

إذا كانت $\underline{A} = \begin{bmatrix} 6 & y \\ -9 & 31 \\ 11 & 5 \end{bmatrix}$ ، فما قيمة كل عنصر فيما يأتي:

a_{12} (18)

b_{13} (17)

b_{22} (16)

a_{21} (15)

مثال 2 (19) يبين الجدول أدناه النقاط التي حصل عليها ثلاثة طلاب في مسابقة علمية تقدم على 3 جولات، نظم هذه البيانات في مصفوفة:

الاسم	الجولة 1	الجولة 2	الجولة 3	المجموع
سعود	221	201	185	607
علي	168	233	159	560
مروان	187	189	211	587

مثال 3 (20) تخزين: ثلاثة مخازن لتوريد التمور؛ الأول فيه 2000kg خلاص و 1200kg برحى و 500kg سكري، والثاني فيه 3000kg خلاص و 1175kg برحى و 2250kg سكري، والثالث فيه 2750kg خلاص و 1500kg برحى و 1700kg سكري.

(a) نظم البيانات في مصفوفة، على أن تكون محتويات المخازن أعمدة المصفوفة.

(b) أوجد مجموع عناصر كل عمود، وماذا يمثل هذا المجموع؟

(c) أوجد مجموع عناصر كل صف، وماذا يمثل هذا المجموع؟



إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 23 & 11 \\ x & -5 \\ -12 & 15 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 9 & -3 & 7 \\ 4x & 18 & -6 \end{bmatrix}$ فحدد كل عنصر مما يأتي:

a_{21} (24)

b_{12} (23)

b_{21} (22)

a_{32} (21)

أسعار حديد التسليح (بالريال)		
المقاس	الرياض	جدة
8mm	2410	2455
14mm	2210	2255
16mm	2200	2245

: إذا كانت $A = \begin{bmatrix} x^2 + 4 & y + 6 \\ x - y & 2 - y \end{bmatrix}$, فحدد كل عنصر مما يأتي:

b_{23} (29)

b_{31} (28)

a_{22} (27)

a_{11} (26)

(25) **حديد التسليح:** يبين الجدول المجاور أسعار حديد التسليح حسب تقرير وزارة التجارة والاستثمار في مدینيتي الرياض وجدة لأحد الأيام.

- (a) اكتب مصفوفة تمثل البيانات المعطاة.
- (b) ما رتبة المصفوفة الناتجة في الفرع a ؟



الربط مع الحياة

(30) **فلك:** استعمل الجدول المجاور الذي يبين بُعد بعض الكواكب عن الأرض والشمس.

- (a) نظم المسافات في مصفوفة A .
- (b) ما رتبة المصفوفة الناتجة؟
- (c) ما قيمة العنصر a_{42} ؟

بعد إعادة تعريف كلمة "كوكب" عام 2006 من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، تبين أن بلوتو لم يعد يصنف كوكباً؛ وذلك بسبب حجمه الصغير.

الكوكب	البعد عن الشمس (مليون ميل)	البعد عن الأرض (مليون ميل)
عطارد	36.00	57
الزهرة	67.24	26
المريخ	141.71	35
المشتري	483.88	370
زحل	887.14	744
أورانس	1783.98	1607
نبتون	2796.46	2680

fact Monster المصدر

الاسم	عدد التمريرات الخامسة	عدد الأهداف
محمد	8	3
معاذ	6	5
صالح	1	8
عبدالله	4	2

(31) **تمثيلات متعددة:** ستكتشف في هذا

السؤال تأثير قلب الصنوف والأعمدة في المصفوفة.

يبين الجدول المجاور عدد كل من التمريرات الخامسة وعدد الأهداف لأربعة لاعبين في مباراة لكرة اليد.

(a) **جدولياً:** نظم البيانات في مصفوفة على أن يمثل عدد الأهداف وعدد التمريرات عموداها.

(b) **جيبرياً:** أوجد مجاميع عناصر كل عمود.

(c) **جدولياً:** بدّل البيانات في المصفوفة على أن تصبح عناصر الأعمدة هي عناصر الصنوف.

(d) **جيبرياً:** أوجد مجاميع عناصر كل صف.

(e) **تحليلياً:** هل هناك أي تأثير في البيانات عند تبديل عناصر الصنوف والأعمدة؟

مسائل مهارات التفكير العليا

تبرير: حدد إذا كانت الجملة الآتية صحيحة أم خاطئة. وفسّر إجابتك:

(32) المصفوفة C مربعة ولها أربعة أعمدة، وتحوي العنصر c_{53} .

(33) **اكتشف الخطأ:** حددت كل من ياسمين وسارة العنصر b_{32} في المصفوفة B .
فهل توصلت إحداهما للحل الصحيح؟ فسر إجابتك.

سارة العنصر b_{32} غير موجود في المصفوفة B ، لأن B مصفوفة من النوع 3×2 .	ياسمين قيمة العنصر b_{32} هي 5.
---	--

(34) **تحدد:** جد قيمة كل من المتغيرات z, y, x التي تتحقق المعادلة:

$$\begin{bmatrix} 2x - y & 3x + 4z \\ 7x - 8z & 5y + 12z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9z - 5x + 1 & 5y - 2x \\ 3y - 4z & 12x + 2y \end{bmatrix}$$

(35) **مسألة مفتوحة:** أنشئ مصفوفة باستعمال بيانات من واقع الحياة تكون مجاميع عناصر أعمدتها ذات معنى، ومجاميع عناصر صفوتها ليست ذات معنى.

(36) **اكتب:** اشرح كيف يمكن أن تساعدك المصفوفات عندما تقرر اختيار الجامعة التي ترغب في الالتحاق بها.

تدريب على اختبار

- | | |
|---------------|------|
| مؤيد | ضد |
| المرشح الأول | 1553 |
| المرشح الثاني | 689 |
| المرشح الثالث | 2088 |
| | 771 |
| | 1633 |
| | 229 |
- (37) **مسح:** نُظمت نتائج استطلاع للرأي في المصفوفة المجاورة:
بالاعتماد على هذه النتائج، أي استنتاج مما يأتي ليس صحيحاً؟
- A هناك 771 صوتاً ضد المرشح الأول.
 - B عدد الأصوات المعارضه للمرشح الأول أكبر من تلك المؤيدة للمرشح الثاني.
 - C فرصة المرشح الثاني للفوز ضئيلة.
 - D عدد الأصوات المؤيدة للمرشح الأول أكبر من عدد الأصوات المؤيدة للمرشح الثالث.

مراجعة تراكمية

(38) **مجلس الإدارة:** ترشح مسفر لمنصب رئيس مجلس الإدارة في إحدى الشركات الكبرى، وكان المُفترض يكتب ثلاثة أسماء بالترتيب على ورقة الاقتراع ، فيحصل المتنافس على 3 نقاط لكل مركز أول، ونقطتين لكل مركز ثان، ونقطة واحدة لكل مركز ثالث. وقد ورد اسم مسفر في 490 ورقة اقتراع للمراكز الثلاثة، وكان مجموع نقاطه 878 نقطة. فإذا علمت أن عدد الأصوات التي حصل عليها من المركز الثاني أكثر بأربع أصوات من ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها من المركز الثالث، فكم عدد الأصوات التي حصل عليها من كل مركز؟ (مهارة سابقة)

النوع	كعكة الشوكولاتة	كعكة الفواكه
التكلفة	19 ₩	13 ₩
سعر البيع	44 ₩	39 ₩

(39) **ثقافة مالية:** يبين الجدول المجاور تكلفة إنتاج كل من الشوكولاتة وكعكة الفواكه وسعر بيعها لدى مخبز. إذا علمت أن المخبز يبيع كعكة الشوكولاتة وكعكة الفواكه معاً في صناديق تحوي من 6 إلى 12 كعكة من كلا النوعين، بحيث يحوي كل صندوق ثلث كعكات على الأقل من كل نوع. فما عدد كعكات كل صندوق من كلا النوعين ليكون الربح أكبر ما يمكن؟ (الدرس 1-5)



احسب قيمة كل عبارة مما يأتي إذا كان $w = 3, x = -2, y = 4, z = 0.5$: (مهارة سابقة)

$$4[3(2z + y) - 2(w + x)] \quad (42)$$

$$5w + 2(x - z) + 2y \quad (41)$$

$$4x - 6y + 2z \quad (40)$$

2-1 تنظيم البيانات



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

تُستخدم الجداول الإلكترونية، لتنظيم البيانات وعرضها، حيث يتم إدخالها في برنامج الجداول الإلكترونية في صفوف وأعمدة كما هو الحال في المصفوفات. وبعد ذلك يمكن استعمالها لعمل الرسوم أو إجراء الحسابات.

مثال

مبيعات محل تمور خلال 4 أسابيع متتالية بالكيلوجرامات				
نوع التمر	1	2	3	4
خلاص	17	22	11	23
مكتومي	31	34	22	29
سكري	55	61	44	71
سلج	41	36	60	77
عجوة	23	29	19	44
خضري	8	18	19	31
منيفي	22	18	30	32
صقعي	26	16	31	39

جمع محل لبيع التمور بيانات عن مبيعاته في أربعة أسابيع متتالية، ونظمها في الجدول المجاور. أدخل البيانات في برنامج الجداول الإلكترونية .

استعمل العمود A لنوع ، والعمود B لمبيعات الأسبوع الأول ، والعمود C لمبيعات الأسبوع الثاني ، والعمود D لمبيعات الأسبوع الثالث ، والعمود E لمبيعات الأسبوع الرابع.

	A	B	C	D	E
1	خلاص	17	22	11	23
2	مكتومي	31	34	22	29
3	سكري	55	61	44	71
4	سلج	41	36	60	77
5	عجوة	23	29	19	44
6	خضري	8	18	19	31
7	منيفي	22	18	30	32
8	صقعي	26	16	31	39

تمارين:

- (1) أدخل البيانات الواردة في فقرة "لماذا؟" بداية الدرس في برنامج الجداول الإلكترونية.
- (2) قارن بين تنظيم البيانات في الجداول الإلكترونية وتنظيمها في المصفوفة.
- (3) يمكنك إيجاد مجاميع مدخلات الصفوف والأعمدة في الجداول الإلكترونية باستعمال الأمر (SUM)
 - (a) يمكنك إيجاد مجموع مدخلات العمود B باستعمال الصيغة $=\text{SUM}(B1:B8)$. أدخل صيغًا مشابهة في الخلايا B9, C9, D9, E9 لتجد مجاميع مدخلات الأعمدة الأخرى. ماذا تمثل مجاميع مدخلات هذه الأعمدة؟
 - (b) أدخل صيغًا مشابهة في الخلايا F1 إلى F8 لإيجاد مجاميع مدخلات الصفوف 1 إلى 8. ماذا تمثل هذه المجاميع في هذه الحالة؟
 - (c) أوجد مجموع مدخلات الصف 9، ومجموع مدخلات العمود F. ماذا تلاحظ؟ فسر إجابتك.



الهدف

استعمل الجداول

الإلكترونية لتنظيم
البيانات وعرضها.



العمليات على المصفوفات

Operations with Matrices

2-2

فيما سبق:

درست تنظيم البيانات في مصفوفات. (الدرس 2-1)

والآن:

- أجمع المصفوفات وأطرحها.
- أضرب مصفوفة في عدد ثابت.

المفردات:

جمع مصفوفتين
adding matrices

طرح مصفوفتين
subtracting matrices

ضرب المصفوفة في
عدد ثابت
scalar multiplication

المادة 2
لدى مؤسسة تجارية للمعدات الثقيلة فروع في كل من: الرياض، والشرقية، وجدة، يتبع كلاً منها ثلاثة معارض.

وتبيّن المصفوفات الآتية معدل النفقات والمبيعات الأسبوعية في معارض المناطق الثلاث:

	الرياض	الشرقية	جدة	
المبيعات	المبيعات	المبيعات	المبيعات	
النفقات	النفقات	النفقات	النفقات	
(1) المعرض	1900	145000	1050	109500
(2) المعرض	2400	225000	1800	135000
(3) المعرض	2700	290000	1800	150500

جمع المصفوفات وطرحها: يمكن جمع مصفوفتين أو طرحهما إذا وفقط إذا كان لهما الرتبة نفسها، حيث تجمع العناصر المتناظرة في حالة الجمع، وتطرح في حالة الطرح.

أضف إلى
مطويتك

جمع المصفوفات وطرحها

مفهوم أساسى

التعبير اللغطي: إذا كانت $\underline{A}, \underline{B}$ مصفوفتين من الرتبة $m \times n$ فإن $\underline{A} + \underline{B}$ هي مصفوفة أيضاً من الرتبة $m \times n$ ويكون كل عنصر فيها هو مجموع العنصرين المتناظرين في \underline{A} و \underline{B} ، وكذلك $\underline{A} - \underline{B}$ هي مصفوفة من الرتبة $m \times n$ أيضاً، وتحصل عليها بطرح العنصرين المتناظرة.

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} \quad \text{لتكن: الرموز:}$$

$$\underline{A} + \underline{B} = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix}, \underline{A} - \underline{B} = \begin{bmatrix} a-e & b-f \\ c-g & d-h \end{bmatrix} \quad \text{فإن:}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -9 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+2 & -5+0 \\ 1+(-9) & 7+10 \end{bmatrix} \quad \text{مثال:}$$

إرشادات للدراسة

إذا كان $\underline{A} + \underline{B} = \underline{C}$
 $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

جمع المصفوفات وطرحها

مثال 1

إذا كانت $\underline{A} = \begin{bmatrix} 16 & 2 \\ -9 & 8 \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}, \underline{C} = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{عُوض } \underline{A} + \underline{B} &= \begin{bmatrix} 16 & 2 \\ -9 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} & \underline{A} + \underline{B} \text{ (a)} \\ &= \begin{bmatrix} 16 + (-4) & 2 + (-1) \\ -9 + (-3) & 8 + (-7) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 12 & 1 \\ -12 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{عُوض } \underline{B} - \underline{C} &= \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix} & \underline{B} - \underline{C} \text{ (b)} \end{aligned}$$

بما أن المصفوفتين \underline{C} لهما رتبتين مختلفتين، فلا يمكن إجراء عملية الطرح $\underline{B} - \underline{C}$.

تحقق من فهمك

$$\begin{bmatrix} -9 & 8 & 3 \\ -2 & 4 & -7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & -3 & 6 \\ -9 & -5 & 18 \end{bmatrix} \quad (1B)$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -9 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 & 12 \\ 8 & -7 \end{bmatrix} \quad (1A)$$

الضرب في عدد ثابت: يمكنك ضرب أي مصفوفة في عدد ثابت، وهذا يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في ذلك العدد الثابت. وتُسمى هذه العملية **ضرب المصفوفة في عدد ثابت**.

مفهوم أساسى

الضرب في عدد ثابت

أضف إلى مطويتك

التعبير اللظي: حاصل ضرب مصفوفة \underline{A} من الرتبة $n \times n$ في عدد ثابت k هي مصفوفة $k\underline{A}$ من الرتبة $n \times n$ وكل عنصر فيها يساوى العنصر المناظر له في المصفوفة \underline{A} مضروباً في العدد الثابت k

الرموز: إذا كانت $\underline{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ و k عدد ثابت فإن:

$$k \cdot \underline{A} = k \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix}$$

مثال: $-3 \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3(4) & -3(1) \\ -3(7) & -3(-2) \end{bmatrix}$

مثال 2

ضرب مصفوفة في عدد ثابت

إذا كانت $\underline{R} = \begin{bmatrix} -12 & 8 & 6 \\ -16 & 4 & 19 \end{bmatrix}$ ، فجد $5\underline{R}$.

عوض $5\underline{R} = 5 \begin{bmatrix} -12 & 8 & 6 \\ -16 & 4 & 19 \end{bmatrix}$

اضرب كل عنصر في المصفوفة في العدد 5 $= \begin{bmatrix} 5(-12) & 5(8) & 5(6) \\ 5(-16) & 5(4) & 5(19) \end{bmatrix}$

بسط $= \begin{bmatrix} -60 & 40 & 30 \\ -80 & 20 & 95 \end{bmatrix}$

تحقق من فهمك

(2) إذا كانت $\underline{T} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 3 & -2 \\ -1 & -4 & -2 & 9 \end{bmatrix}$ ، فأوجد $-4\underline{T}$

ارشادات للدراسة

ضرب المصفوفة في عدد ثابت

إذا كان $\underline{A} = \underline{B}$ فإن: $k\underline{a}_{ij} = b_{ij}$

تنطبق كثير من خصائص العمليات التي تُجرى على الأعداد الحقيقة على المصفوفات. وفيما يأتي ملخص لهذه الخصائص:

مفهوم أساسى

خصائص جمع المصفوفات

أضف إلى مطويتك

الخصائص الآتية صحيحة لأي ثلاثة مصفوفات \underline{A} , \underline{B} , \underline{C} لها الرتبة نفسها ولأي عدد ثابت k :

$\underline{A} + \underline{B} = \underline{B} + \underline{A}$ $(\underline{A} + \underline{B}) + \underline{C} = \underline{A} + (\underline{B} + \underline{C})$ $k(\underline{A} + \underline{B}) = k\underline{A} + k\underline{B}$	الخاصية الابدالية لجمع المصفوفات الخاصية التجميعية لجمع المصفوفات خاصية التوزيع للضرب في عدد
--	---



يمكنك إجراء عمليات متعددة الخطوات على المصفوفات. وترتيب تلك العمليات شبيه بترتيب العمليات على الأعداد الحقيقة.

العمليات على المصفوفات

مثال 3

$$\text{إذا كانت } -4\underline{B} - 3\underline{A} = \begin{bmatrix} -9 & 12 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} -4 & -8 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

عُوض $-4\underline{B} - 3\underline{A} = -4 \begin{bmatrix} -4 & -8 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} -9 & 12 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$

أوجد ناتج ضرب المصفوفات في الثواب $= \begin{bmatrix} -4(-4) & -4(-8) \\ -4(2) & -4(-3) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3(-9) & 3(12) \\ 3(2) & 3(-6) \end{bmatrix}$

بسط $= \begin{bmatrix} 16 & 32 \\ -8 & 12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -27 & 36 \\ 6 & -18 \end{bmatrix}$

اطرح العناصر المتناظرة $= \begin{bmatrix} 16 - (-27) & 32 - 36 \\ -8 - 6 & 12 - (-18) \end{bmatrix}$

بسط $= \begin{bmatrix} 43 & -4 \\ -14 & 30 \end{bmatrix}$

تحقق من فهمك

$$\text{إذا كانت } -6\underline{B} + 7\underline{A} = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 6 & -8 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} 12 & 5 \\ 5 & -4 \\ 4 & -7 \end{bmatrix} \quad (3)$$



الربط مع الحياة

المخطط المالي

يستخدم المخطط المالي المصروفات لتنظيم البيانات التي يستعملها، ووصفها.

استعمال العمليات على المصفوفات

مثال 4

أعمال: ارجع إلى فقرة "لماذا" في بداية الدرس، وعبر عن معدل المبيعات والنفقات لجميع المعارض في خمسة أسابيع.

حتى يتم حساب المبيعات في خمسة أسابيع، يجب ضرب كل مصفوفة في العدد 5 وجمع المصفوفات الناتجة معاً.

ضرب كل مصفوفة في 5 ثم الجمع $5 \begin{bmatrix} 1900 & 145000 \\ 2400 & 225000 \\ 2700 & 290000 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1700 & 122000 \\ 1800 & 145500 \\ 1800 & 160000 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1050 & 109500 \\ 1800 & 135000 \\ 1800 & 150500 \end{bmatrix}$

تطبيق قاعدة الضرب في ثابت $= \begin{bmatrix} 9500 & 725000 \\ 12000 & 1125000 \\ 13500 & 1450000 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8500 & 610000 \\ 9000 & 727500 \\ 9000 & 800000 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5250 & 547500 \\ 9000 & 675000 \\ 9000 & 752500 \end{bmatrix}$

المبيعات $\begin{bmatrix} 23250 & 1882500 \\ 30000 & 2527500 \\ 31500 & 3002500 \end{bmatrix}$
اجماع المصفوفات


تدل المصفوفة النهائية على معدل المبيعات والنفقات في خمسة أسابيع.

تحقق من فهمك

إرشادات للدراسة

العناصر المتناظرة

عند تمثيل البيانات بمصفوفات متعددة، تأكد أن العناصر المتناظرة تمثل البيانات المتناظرة.



مثال 1 أوجد الناتج في كلٌ مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً:

$$\begin{bmatrix} 9 & -8 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 & 2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} -8 & 2 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 11 & -7 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 5 & -13 & -6 \\ 3 & -17 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & -18 & 8 \\ 2 & -11 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} 7 & -12 \\ 15 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 4 & -9 \end{bmatrix} \quad (3)$$

مثال 2 أوجد الناتج في كلٌ مما يأتي:

$$-6 \begin{bmatrix} 15 & -9 & 2 & 3 \\ 6 & -11 & 14 & -2 \\ 4 & -8 & -10 & 27 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$3 \begin{bmatrix} 6 & 4 & 0 \\ -2 & 14 & -8 \\ -4 & -6 & 7 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$\underline{C} = \begin{bmatrix} -4 & -6 \\ 12 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\underline{B} = \begin{bmatrix} 8 & -1 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

مثال 3

فأوجد ناتج كلٌ مما يلي:

$$-8\underline{C} + 3\underline{A} \quad (8)$$

$$4\underline{B} - 2\underline{A} \quad (7)$$

مثال 4 (9) درجات حرارة: تبين المصفوفة \underline{L} المعدل الشهري لدرجات الحرارة الصغرى (بالفهرنهايت) في مدينة ما. وتبيّن المصفوفة \underline{H} المعدل الشهري لدرجات الحرارة العظمى (بالفهرنهايت) في تلك المدينة.

$$\underline{H} = \begin{bmatrix} 39.9 & 45.2 & 55.3 \\ 65.1 & 74.0 & 82.3 \\ 85.9 & 84.6 & 78.1 \\ 66.9 & 54.5 & 44.3 \end{bmatrix} \quad \underline{L} = \begin{bmatrix} 24.1 & 27.7 & 35.9 \\ 44.1 & 53.6 & 62.2 \\ 66.4 & 64.9 & 57.9 \\ 46.4 & 37.3 & 28.4 \end{bmatrix}$$

أوجد المصفوفة التي تمثل الفرق بين المعدل الشهري لدرجات الحرارة العظمى والمعدل الشهري لدرجات الحرارة الصغرى في تلك المدينة؟

تدريب وحل المسائل

مثال 1 أوجد الناتج في كلٌ مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً.

$$\begin{bmatrix} 9 & 5 \\ -2 & 16 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & -3 & 7 \\ 12 & 2 & -4 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 12 & -5 \\ -8 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 11 \\ -7 & 2 \end{bmatrix} \quad (10)$$

الأمثلة 4 (12) مشروبات: يبيّن الجدول المجاور قائمة أسعار المشروبات في مطعم، فإذا رفع المطعم أسعار جميع المشروبات بنسبة 50%.

(a) اكتب المصفوفة \underline{C} التي تمثل الأسعار الحالية.

(b) ما العدد الذي يمكن أن نضرب المصفوفة \underline{C} فيه لإيجاد المصفوفة \underline{N} التي تمثل الأسعار الجديدة؟

(c) جد المصفوفة \underline{N} .

(d) جد المصفوفة $\underline{C} - \underline{N}$. ماذا تمثل هذه المصفوفة في هذه الحالة؟

المشروب	صغير	وسط	واسط	كبير
غازي	3	4	5	
شاي	2	3	4	
قهوة	2	3	4	
عصير	4	5	6	



أوجد الناتج في كلٌ مما يأتي إن أمكن، وإذا تعذر ذلك فاكتب "لا يمكن" مع ذكر السبب:

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 & 3 \\ -8 & 12 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 7 & -9 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 & -8 & 12 \\ -11 & -5 & 3 \\ -1 & 22 & -9 \\ -6 & 31 & 9 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$\begin{bmatrix} 19 \\ -2 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 \\ 8 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 11 \\ -6 & 12 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & -9 & -3 \\ 5 & 14 & 0 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\begin{bmatrix} 62 \\ -37 \\ -4 \end{bmatrix} + [34 \ 76 \ -13] \quad (15)$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 8 & -3 \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ -9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ -7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 9 \\ 16 \end{bmatrix} \quad (17)$$

(19) **كتب:** تحتوي المكتبة A على 10000 كتاب علمي، و5000 كتاب تاريخي و5000 كتاب أدبي. وتحتوي المكتبة B على 15000 كتاب علمي، و10000 كتاب تاريخي و2500 كتاب أدبي. وتحتوي المكتبة C على 4000 كتاب علمي، و700 كتاب تاريخي، و800 كتاب أدبي.

- (a) رتب أعداد الكتب في كل مكتبة في مصفوفات، وارمز إليها بالرموز \underline{A} , \underline{B} , \underline{C} .
- (b) أوجد العدد الكلي للكتب من كل نوع في المكتبات الثلاث، وعبر عن ذلك بمصفوفة.
- (c) كم يزيد عدد الكتب من كل نوع في المكتبة A على التي في المكتبة C؟
- (d) أوجد المصفوفة $\underline{A} + \underline{B}$. هل لهذه المصفوفة معنى في هذه الحالة؟ فسر إجابتك.



الربط مع الحياة

وصل عدد مقتنيات مكتبات جامعة الملك سعود 874971 عنواناً تقع في 2065863 مجلداً ومادة من مختلف أوعية المعلومات، وبلغت المساحة الإجمالية للمكتبات 62634m²، مجهزة بكل تقنيات المكتبات الحديثة وتدير خدماتها آلياً.

أوجد الناتج في كلٌ مما يأتي إن أمكن، وإذا تعذر ذلك فاكتب "لا يمكن" مع ذكر السبب:

$$-4 \begin{bmatrix} -7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -8 \\ 3x \\ -9 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 4 \\ x-6 \\ 12 \end{bmatrix} \quad (21)$$

$$-3 \begin{bmatrix} 18 & -6 & -8 \\ -5 & -3 & 12 \\ 0 & 3x & -y \end{bmatrix} \quad (20)$$

$$-6 \left(\begin{bmatrix} 6 & 3y \\ 4x+1 & -2 \\ -9 & xy \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 8 & -7 \\ x+2 & 2x \end{bmatrix} \right) \quad (23)$$

$$-5 \left(\begin{bmatrix} 4 & -8 \\ 8 & -9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & -6 \end{bmatrix} \right) \quad (22)$$

أجر العمليات على المصفوفات الآتية إن أمكن، وإذا تعذر ذلك فاكتب "لا يمكن" مع ذكر السبب:

$$-\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 12 & -16 \\ 15 & 8 \end{bmatrix} + \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 21 & 18 \\ -4 & -6 \end{bmatrix} \quad (25) \quad -2 \begin{bmatrix} -9.2 & -8.4 \\ 5.6 & -4.3 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 4.1 & -2.9 \\ 7.2 & -8.2 \end{bmatrix} \quad (24)$$

مسائل مهارات التفكير العليا

(26) **برهان:** برهن على أن عملية جمع المصفوفات من النوع 2×2 تبديلية.

(27) **برهان:** برهن على أن عملية جمع المصفوفات من النوع 2×2 تجميعية.

(28) **تحد:** إذا كانت:

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}, 3\underline{A} - 4\underline{B} + 6\underline{C} = \begin{bmatrix} 13 & 22 \\ 10 & 4 \end{bmatrix}$$

فأوجد عناصر المصفوفة \underline{C} .



(29) **تبرير:** حدد إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحة أحياناً، أو صحيحة دائماً، أو غير صحيحة أبداً للصفوفتين \underline{A} ، \underline{B} ، ثم فسر إجابتك.

- (a) إذا كانت $\underline{A} + \underline{B}$ معرفة ، فإن $\underline{B} - \underline{A}$ معرفة.
- (b) إذا كان k عددًا حقيقياً ، فإن $k\underline{A}$ و $k\underline{B}$ معرفتان.
- (c) إذا كانت $\underline{B} - \underline{A}$ غير معرفة ، فإن $\underline{A} - \underline{B}$ غير معرفة.
- (d) إذا كانت \underline{A} و \underline{B} لهما عدد العناصر نفسه ، فإن $\underline{B} + \underline{A}$ معرفة.
- (e) إذا كانت \underline{A} و \underline{B} معرفتين ، فإن $k\underline{A} + k\underline{B}$ معرفة.

(30) **مسألة مفتوحة:** أعط مثلاً على صفوفتين \underline{A} و \underline{B} ، على أن تكون $.4\underline{B} - 3\underline{A} = \begin{bmatrix} -6 & 5 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

(31) **أكتب:** اشرح كيف تجد $4\underline{D} - 3\underline{C}$ لأي صفوفتين \underline{C} ، \underline{D} لهما الرتبة نفسها.

تدريب على اختبار

(33) **رتبة المصفوفة:** إذا كانت \underline{A} ، \underline{B} مصفوفتين من الرتبة

5×3 ، فإن رتبة المصفوفة $\underline{B} - \underline{A}$ هي:

C

D

A

B

(32) حل النظام الآتي:

$$0.06p + 4q = 0.88$$

$$p - q = -2.25$$

$$(-2, 0.25) \quad \textbf{C} \quad (-0.912, -1.338) \quad \textbf{A}$$

$$(-2, -4.25) \quad \textbf{D} \quad (0.912, -3.162) \quad \textbf{B}$$

مراجعة تراكمية

$$\text{إذا كانت } \underline{A} = \begin{bmatrix} -3 & 6 \\ -5 & x \\ 8 & 4y \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} 16 & 4 & x \\ -2 & 9 & y \end{bmatrix}, \underline{C} = \begin{bmatrix} 9 & -5 & 3 & 2 \\ 0 & -6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

b_{23} (36)

c_{13} (35)

a_{32} (34)

حل بيانياً النظام أدناه: (الدرس 1-5)

$$4x + 2y > 8 \quad (37)$$

$$4y - 3x \leq 12$$

(38) **سكان:** في إحصائية عام 1435هـ لأكبر 20 مدينة سعودية من حيث عدد السكان، بلغ عدد سكان مدينة الدمام 903597 نسمة، بما يزيد على عدد سكان مدينة تبوك. اكتب معادلة لإيجاد عدد سكان مدينة تبوك، ثم حلها. (مهارة سابقة)

بسط كل عبارة مما يأتي: (الدرس 1-1)

$$4(2x - 3y) + 2(5x - 6y) \quad (39)$$

$$-3(2a - 5b) - 4(4b + a) \quad (40)$$

$$-7(x - y) + 5(y - x) \quad (41)$$





ضرب المصفوفات

Multiplying Matrices

2-3

المادة

الوحدة

فيما سبق:
درستُ ضرب المصفوفات في عدد ثابت. (الدرس 2-2)

والآن:

- أضرب المصفوفات.
- أستعمل خصائص ضرب المصفوفات.

الشهر وعدد الأقلام				
نوع القلم	محرم	صفر	1	ربيع 2
رصاص	153	217	197	249
حبر سائل	12	6	7	8
حبر جاف	82	146	102	158

إذا علمت أن سعر بيع قلم الرصاص ريال واحد، وقلم الحبر السائل 3 ريالات، وقلم الحبر الجاف ريالان، فإنه يمكنك تلخيص الجدول بمصفوفة عدد الأقلام B ، كما يمكنك التعبير عن مصفوفة سعر بيع كل نوع من الأقلام بالمصفوفة P .

مصفوفة الأسعار P

الحبر الجاف الحبر السائل قلم الرصاص
 $[1 \quad 3 \quad 2]$

مصفوفة عدد الأقلام B

$\begin{bmatrix} 153 & 217 & 197 & 249 \\ 12 & 6 & 7 & 8 \\ 82 & 146 & 102 & 158 \end{bmatrix}$

وباستعمال ضرب المصفوفات، تجد سعر بيع الأقلام في كل شهر.

ضرب المصفوفات: يمكنك ضرب مصفوفتين إذا وفقط إذا كان عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية. وعند ضرب المصفوفة A ذات الرتبة $m \times r$ في المصفوفة B ذات الرتبة $r \times t$ ، فإن الناتج هو المصفوفة AB ذات الرتبة $m \times t$.

$$\underline{A} \cdot \underline{B} = \underline{AB}$$

$m \times r$ $r \times t$ $m \times t$
 متساويان رتبة AB

مثال 1 رتبة مصفوفة ناتج الضرب

هل يمكن إيجاد AB في كلٍّ مما يأتي، وإن كانت كذلك، فأوجد رتبة المصفوفة الناتجة:

بما أن عدد أعمدة المصفوفة A يساوي عدد صفوف المصفوفة B ، فإن مصفوفة حاصل الضرب $A \cdot B$ معرفة، ورتبتها 3×2 .

$A_3 \times 4 \cdot B_4 \times 2$ (a)

$$\underline{A} \cdot \underline{B} = \underline{AB}$$

3×4 4×2 3×2

$A_5 \times 3 \cdot B_5 \times 4$ (b)

$$\underline{A} \cdot \underline{B}$$

5×3 5×4

إرشادات للدراسة

رمز المصفوفة

أحياناً تكتب $A_{m \times n}$ لتعبر عن مصفوفة A رتبتها $m \times n$.

بما أن عدد أعمدة المصفوفة A لا يساوي عدد صفوف المصفوفة B ، فإن مصفوفة حاصل الضرب $A \cdot B$ غير معرفة.

تحقق من فهمك

$A_{3 \times 2} \cdot B_{3 \times 2}$ (1B)

$A_{4 \times 6} \cdot B_{6 \times 2}$ (1A)



يمكنك إيجاد ناتج ضرب مصفوفتين بضرب عناصر صفوف الأولى في عناصر أعمدة الثانية بالترتيب ثم جمع النواتج.

التعبير اللفظي: العنصر في الصف m والعمود n من المصفوفة \underline{AB} هو مجموع نواتج ضرب العناصر في الصف m من المصفوفة \underline{A} ، بعناصر العمود n من المصفوفة \underline{B} بالترتيب.

$$\begin{array}{c} \underline{A} \cdot \underline{B} = \underline{AB} \\ \left[\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix} \right] \cdot \left[\begin{matrix} e & f \\ g & h \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{matrix} \right] \end{array} \quad \text{الرموز:}$$

$$\left[\begin{matrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{matrix} \right] \cdot \left[\begin{matrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} 2 \times 5 + 3 \times 7 & 2 \times 6 + 3 \times 8 \\ 1 \times 5 + 4 \times 7 & 1 \times 6 + 4 \times 8 \end{matrix} \right] \quad \text{مثال:}$$

مثال 2 ضرب المصفوفات المربعة

$$\underline{X} = \left[\begin{matrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{matrix} \right], \underline{Y} = \left[\begin{matrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{matrix} \right]$$

أوجد \underline{XY} إذا كانت

$$\underline{XY} = \left[\begin{matrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{matrix} \right] \cdot \left[\begin{matrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{matrix} \right]$$

الخطوة 1: اضرب عناصر الصف الأول في المصفوفة \underline{X} في عناصر العمود الأول في المصفوفة \underline{Y} بالترتيب، ثم اجمع نواتج الضرب، وضع النتيجة في الصف الأول، العمود الأول من المصفوفة \underline{XY} .

$$\left[\begin{matrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{matrix} \right] \cdot \left[\begin{matrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} 6(-5) + (-3)(3) \\ \quad \quad \quad 6(-4) + (-3)(3) \end{matrix} \right]$$

الخطوة 2: اتبع الخطوات نفسها مع عناصر الصف الأول والعمود الثاني، واتكتب النتيجة في الصف الأول والعمود الثاني.

$$\left[\begin{matrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{matrix} \right] \cdot \left[\begin{matrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} 6(-5) + (-3)(3) & 6(-4) + (-3)(3) \\ \quad \quad \quad 6(-4) + (-3)(3) & 6(-4) + (-3)(3) \end{matrix} \right]$$

الخطوة 3: اتبع الخطوات نفسها مع عناصر الصف الثاني والعمود الأول ، واتكتب النتيجة في الصف الثاني، العمود الأول.

$$\left[\begin{matrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{matrix} \right] \cdot \left[\begin{matrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} 6(-5) + (-3)(3) & 6(-4) + (-3)(3) \\ -10(-5) + (-2)(3) & -10(-4) + (-2)(3) \end{matrix} \right]$$

الخطوة 4: اتبع الخطوات السابقة نفسها مع عناصر الصف الثاني والعمود الثاني.

$$\left[\begin{matrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{matrix} \right] \cdot \left[\begin{matrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} 6(-5) + (-3)(3) & 6(-4) + (-3)(3) \\ -10(-5) + (-2)(3) & -10(-4) + (-2)(3) \end{matrix} \right]$$

الخطوة 5: بسط المصفوفة الناتجة.

$$\left[\begin{matrix} 6(-5) + (-3)(3) & 6(-4) + (-3)(3) \\ -10(-5) + (-2)(3) & -10(-4) + (-2)(3) \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} -39 & -33 \\ 44 & 34 \end{matrix} \right]$$

تحقق من فهمك

$$\underline{U} = \left[\begin{matrix} 5 & 9 \\ -3 & -2 \end{matrix} \right], \underline{V} = \left[\begin{matrix} 2 & -1 \\ 6 & -5 \end{matrix} \right] \quad (2)$$

إذا كانت

تبيه!

المحافظة على الترکيز
من السهل أن تفقد الترکيز عند ضرب المصفوفات، وربما تساعدك تقطيع المصفوفات أو الأعمدة التي لا تقوم بضربها عند إيجاد عناصر مصفوفة الضرب.

ضرب المصفوفات

مثال 3 من واقع الحياة

الفريق	المركز الأول	المركز الثاني	المركز الثالث
A	4	7	3
B	8	9	1
C	10	5	3
D	3	3	6

سباحة: في مسابقة للسباحة بين أربع فرق سجلت 7 نقاط لمن يحل في المركز الأول، و 4 نقاط لمن يحل في المركز الثاني، ونقطتان لمن يحل في المركز الثالث. استعمل الجدول المجاور الذي يبين نتائج مسابقة السباحة لكل فريق لتحديد الفريق الفائز في المسابقة.

افهم: المعطيات:

- جدول يبين عدد مرات حصول 4 فرق على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة للسباحة.
- عدد النقاط التي تتحسب للفريق في كل مركز.

المطلوب:

- تحديد الفريق الفائز.



الربط مع الحياة

تدل البحوث الصحية والرياضية أن ممارسة السباحة نصف ساعة يومياً تخفض ضغط الدم وتقوي القلب وتقلل معدل الكوليسترول في الدم وتزيد كفاءة الدورة الدموية، وتحرق 500 : 250 سعرة حرارية: لذا تعد من أفضل الرياضات لتخفيض الوزن.

خطط: يمكن إيجاد النقاط النهائية التي أحرزها كل فريق بضرب مصفوفة النتائج للفريق في مصفوفة عدد النقاط التي تتحسب لكُل من المراكز (الأول والثاني والثالث).

حل: اكتب كُلًا من النتائج والنقاط التي تم الحصول عليها في مصفوفتين، ورتب المصفوفتين على أن يكون عدد الصفوف في مصفوفة النقاط يساوي عدد الأعمدة في مصفوفة النتائج.

$$\begin{array}{c} \text{النتائج} \\ \underline{R} = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 3 \\ 8 & 9 & 1 \\ 10 & 5 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{النقاط} \\ \underline{P} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \end{array}$$

اضرب المصفوفتين.

$$\underline{RP} = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 3 \\ 8 & 9 & 1 \\ 10 & 5 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4(7) + 7(4) + 3(2) \\ 8(7) + 9(4) + 1(2) \\ 10(7) + 5(4) + 3(2) \\ 3(7) + 3(4) + 6(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 62 \\ 94 \\ 96 \\ 45 \end{bmatrix}$$

تبين مصفوفة حاصل الضرب عدد النقاط التي أحرزها كُل من الفرق A, B, C, D على الترتيب؛ لذا فالفريق C هو الفائز في المسابقة؛ لأنَّه حصل على أكبر مجموع من النقاط وهو 96 نقطة.

تحقق: المصفوفة \underline{R} من الرتبة 3×4 ، والمصفوفة \underline{P} من الرتبة 1×3 ؛ لذا فإنَّ حاصل الضرب سيكون مصفوفة من الرتبة 3×4 .

تحقق من فهمك

(3) مبيعات: ارجع إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس، واستعمل ضرب المصفوفات لتحديد سعر بيع الأقلام في كل شهر.

خصائص ضرب المصفوفات: تذكر أنَّ خصائص جمع الأعداد الحقيقة تبقى صحيحة أيضًا عند جمع المصفوفات، إلا أنَّ بعض خصائص ضرب الأعداد الحقيقة لا تكون صحيحة دائمًا عند ضرب المصفوفات.

اختبار الخاصية الإبدالية

مثال 4

$$\text{إذا كانت } \underline{G} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 4 & -2 & 0 \end{bmatrix}, \underline{H} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -8 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \text{ فأوجد ناتج كل مما يأتي: } \underline{GH} \text{ (a)}$$



HG (b)

$$\underline{HG} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -8 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 4 & -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+12 & 6-6 & -10+0 \\ -2-32 & -6+16 & 10+0 \\ 1+28 & 3-14 & -5+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 0 & -10 \\ -34 & 10 & 10 \\ 29 & -11 & -5 \end{bmatrix}$$

لاحظ أن $\underline{GH} \neq \underline{HG}$.

تحقق من فهمك

إذا كانت $\underline{AB} = \underline{BA}$, فهل $\underline{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$, $\underline{B} = \begin{bmatrix} -3 & 6 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$ (4)

اتضح في المثال 4 أن الخاصية الإبدالية لا تتحقق في ضرب المصفوفات. لذا فإن الترتيب يُعد في غاية الأهمية عند ضرب المصفوفات.

إرشادات للدراسة

البرهان والأمثلة المضادة

لإثبات صحة خاصية في جميع الحالات، يجب إثبات صحتها في الحالة العامة. ولبيان أن خاصية ما ليست صحيحة يكفي إعطاء مثال مضاد لها.

مثال 5 اختبار خاصية التوزيع

إذا كانت $\underline{J} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}$, $\underline{K} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $\underline{L} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ، فجد ناتج كل مما يأتي:

$\underline{J}(\underline{K} + \underline{L})$ (a)

عُوض $\underline{J}(\underline{K} + \underline{L}) = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \right)$

اجمع المصفوفتين $= \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

اضرب المصفوفتين $= \begin{bmatrix} -2+8 & 2+12 \\ 5-4 & -5-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 14 \\ 1 & -11 \end{bmatrix}$

$\underline{JK} + \underline{JL}$ (b)

$$\underline{JK} + \underline{JL} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2(3) + 4(-1) & 2(2) + 4(3) \\ -5(3) + (-2)(-1) & -5(2) + (-2)(3) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2(-4) + 4(3) & 2(-1) + 4(0) \\ -5(-4) + (-2)(3) & -5(-1) + (-2)(0) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 16 \\ -13 & -16 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 14 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 14 \\ 1 & -11 \end{bmatrix}$$

لاحظ أن $\underline{J}(\underline{K} + \underline{L}) = \underline{JK} + \underline{JL}$.

تحقق من فهمك

إذا كانت $\underline{R} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $\underline{S} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$, $\underline{T} = \begin{bmatrix} -3 & 7 \\ -4 & 8 \end{bmatrix}$ (5) فإذا كانت المعادلة

$(\underline{S} + \underline{T})\underline{R} = \underline{SR} + \underline{TR}$ صحيحة للمصفوفات المعطاة أم لا.

في المثال السابق كانت خاصية توزيع الضرب على الجمع صحيحة، ويمكنك إثبات أن هذه الخاصية صحيحة دائمًا إذا كانت عمليتا الضرب والجمع معرفتين.



مفهوم أساسى

خصائص ضرب المصفوفات

تُعد الخصائص الآتية صحيحة لأي ثلات مصفوفات \underline{A} , \underline{B} , \underline{C} , ولأي عدد k ، على أن تكون عمليتاً ضرب أو جمع أيٌ منها معرفتين:

$$(\underline{AB})\underline{C} = \underline{A}(\underline{BC})$$

الخاصية التجميعية لضرب المصفوفات

$$k(\underline{AB}) = (k\underline{A})\underline{B} = \underline{A}(k\underline{B})$$

الخاصية التجميعية لضرب المصفوفات في عدد

$$\underline{C}(\underline{A} + \underline{B}) = \underline{CA} + \underline{CB}$$

خاصية التوزيع من اليسار للمصفوفات

$$(\underline{A} + \underline{B})\underline{C} = \underline{AC} + \underline{BC}$$

خاصية التوزيع من اليمين للمصفوفات



مثال 1 حدد إذا كانت عملية الضرب معروفة في كلٍ مما يأتي أم لا، وإن كانت معروفة فأوجد رتبة المصفوفة الناتجة:

$$\underline{E}_{8 \times 6} \cdot \underline{F}_{6 \times 10} \quad (3)$$

$$\underline{C}_{5 \times 4} \cdot \underline{D}_{5 \times 4} \quad (2)$$

$$\underline{A}_{2 \times 4} \cdot \underline{B}_{4 \times 3} \quad (1)$$

مثال 2 أوجد الناتج في كلٍ مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً:

$$\begin{bmatrix} 10 & -2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 7 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} -9 \\ 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & -10 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\begin{bmatrix} 9 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & -7 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 \\ -7 \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$\begin{bmatrix} -8 & 7 & 4 \\ -5 & -3 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 & -1 \\ -3 & 1 & 8 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -7 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} -4 & 3 & 2 \\ -1 & -5 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 8 & 4 & -1 \\ 5 & 3 & -2 \end{bmatrix} \quad (10)$$

عدد المشتركين في دورات اللياقة البدنية		
الاشتراك	المستوى الأول	المستوى الثاني
الأسبوعي	35	28
الشهري	32	17
السنوي	18	12

مثال 3 **للياقة البدنية**: يبين الجدول المجاور عدد المشتركين في دورات اللياقة البدنية في المستويين الأول والثاني لدى أحد مراكز اللياقة البدنية في مدينة الرياض .
إذا كانت رسوم الاشتراك الأسبوعي 110 ريالات، ورسوم الاشتراك الشهري 165 ريالاً، ورسوم الاشتراك السنوي 439 ريالاً.

(a) اكتب مصفوفة تمثل عدد الأشخاص المسجلين في المستويات كلها، ومصفوفة تمثل رسوم الاشتراك فيها.

(b) ما المبلغ الكلي الذي يحصل عليه المركز من اشتراكات المستويين الأول والثاني .

المثالان 4 , 5 إذا كانت $\underline{X} = \begin{bmatrix} -10 & -3 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}$, $\underline{Y} = \begin{bmatrix} -5 & 6 \\ -1 & 9 \end{bmatrix}$, $\underline{Z} = \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ -8 & -4 \end{bmatrix}$ ، فحدد ما إذا كانت المعادلات الآتية صحيحة للمصفوفات المعطاة أم لا :

$$\underline{X}(\underline{YZ}) = (\underline{XY})\underline{Z} \quad (14)$$

$$\underline{XY} = \underline{YX} \quad (13)$$

تدريب وحل المسائل

مثال 1 حدد إذا كانت عملية الضرب معرفة في كلٌ مما يأتي أم لا، وإن كانت معرفة فأوجد رتبة المصفوفة الناتجة:

$$\underline{M}_{3 \times 1} \cdot \underline{N}_{2 \times 3} \quad (17)$$

$$\underline{A}_{5 \times 5} \cdot \underline{B}_{5 \times 5} \quad (16)$$

$$\underline{P}_{2 \times 3} \cdot \underline{Q}_{3 \times 4} \quad (15)$$

$$\underline{S}_{5 \times 2} \cdot \underline{T}_{2 \times 4} \quad (20)$$

$$\underline{J}_{2 \times 1} \cdot \underline{K}_{2 \times 1} \quad (19)$$

$$\underline{X}_{2 \times 6} \cdot \underline{Y}_{6 \times 3} \quad (18)$$

أوجد الناتج في كلٌ مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً:

$$\begin{bmatrix} 6 \\ -3 \end{bmatrix} \cdot [2 \ -7] \quad (22)$$

$$[1 \ 6] \cdot \begin{bmatrix} -10 \\ 6 \end{bmatrix} \quad (21)$$

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} \quad (24)$$

$$\begin{bmatrix} -3 & -7 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 9 & -3 \end{bmatrix} \quad (23)$$

$$\begin{bmatrix} -6 & 4 & -9 \\ 2 & 8 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad (26)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 6 \\ -4 & -10 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ -2 & -9 \end{bmatrix} \quad (25)$$

$$\begin{bmatrix} -4 \\ 8 \end{bmatrix} \cdot [-3 \ -1] \quad (28)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 9 & -3 \\ 4 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -6 & 7 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad (27)$$

عدد الغرف			
المبني	غرفة بسرير واحد	غرفة بسريرين	غرفة بثلاث أسرة
1	3	2	2
2	2	3	1
3	4	3	0

مثال 2 (29) **أجنحة فندقية**: لدى مؤسسة للأجنحة الفندقية 3 مبانٍ

لإيجار، ويبين الجدول المجاور عدد الغرف في كل مبني.
إذا كانت الأجرة اليومية للغرفة التي تحوي سريراً واحداً 220 ريالاً، وللغرفة التي تحوي سريرين 250 ريالاً، وللغرفة التي تحوي ثلاثة أسرة 360 ريالاً.

- (a) اكتب مصفوفة تمثل عدد الغرف، ثم اكتب مصفوفة أسعار الغرف.
- (b) اكتب مصفوفة تمثل الدخل اليومي للمؤسسة، على فرض أن جميع الغرف تم تأجيرها.
- (c) ما مقدار الدخل اليومي الكلي، على فرض أن جميع الغرف تم تأجيرها.

إذا كانت $2 = k$ ، $\underline{P} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ، $\underline{Q} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$ ، $\underline{R} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$ ، فحدد ما إذا كانت المعادلات

الآتية صحيحة للمصفوفات المعطاة أم لا:

$$\underline{PQR} = \underline{RQP} \quad (31)$$

$$k(\underline{PQ}) = \underline{P}(k\underline{Q}) \quad (30)$$

$$\underline{R}(\underline{P} + \underline{Q}) = \underline{PR} + \underline{QR} \quad (33)$$

$$\underline{PR} + \underline{QR} = (\underline{P} + \underline{Q})\underline{R} \quad (32)$$

الزهور	سعر الشراء	سعر البيع
جوزي	₼ 0.50	₼ 3.00
نرجس	₼ 1.5	₼ 6
زنبق	₼ 2	₼ 7

مثال 5 ، 4 (34) **تنسيق زهور**: اشتري محل تنسيق زهور 200 زهرة جوري ، و 150 زهرة نرجس ، و 100 زهرة زنبق ، و سعر شراء الزهرة من كل نوع مبين في الجدول المجاور، وكذلك سعر بيع الزهرة بعد تغليفها وتنسيقتها في باقة.

مثال 3

المثالان 5 ، 4



الربط مع الحياة

الزنبق يضم حوالي 110 أنواع أهمها الزنبق الأبيض. وتنمو الأزهار من بصيلات محروشة، وتأخذ شكل الأبواقي ولها ست بتلات.

- (a) استعمل ضرب المصفوفات؛ لإيجاد المبلغ الكلي لشراء الزهور.
- (b) استعمل ضرب المصفوفات لإيجاد المبلغ الكلي الذي حصل عليه صاحب المحل من بيع الزهور.
- (c) أوجد مقدار ربح المحل من بيع الزهور.

$$\underline{X} = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 3y & -4.5 \end{bmatrix}, \underline{Y} = \begin{bmatrix} -5 & -1.5 \\ x+2 & y \\ 13 & 1.2 \end{bmatrix}, \underline{Z} = \begin{bmatrix} -3 \\ x+y \end{bmatrix}$$

الضرب في كلٌّ مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً:

$$\underline{YZ} \quad (38)$$

$$(\underline{XX})\underline{Z} \quad (42)$$

$$\underline{ZY} \quad (37)$$

$$\underline{X}(\underline{ZZ}) \quad (41)$$

$$\underline{YX} \quad (36)$$

$$(\underline{XZ})\underline{X} \quad (40)$$

$$\underline{XY} \quad (35)$$

$$(\underline{YX})\underline{Z} \quad (39)$$

مسائل مهارات التفكير العليا

(43) **تبرير:** إذا كانت رتبة المصفوفة \underline{AB} هي 8×5 ، ورتبة المصفوفة \underline{A} هي 6×5 ، فما رتبة المصفوفة \underline{B} ؟

(44) **برهان:** بين أن الخصائص الآتية صحيحة للمصفوفات من النوع 2×2 .

- (a) خاصية التوزيع للضرب في عدد.
- (c) الخاصية التجميعية للضرب.
- (b) خاصية التوزيع للضرب على الجمع.
- (d) الخاصية التجميعية للضرب في عدد.

(45) **مسألة مفتوحة:** اكتب مصفوفتين \underline{A} و \underline{B} على أن تكون $\underline{AB} = \underline{BA}$.

$$(46) \text{ تحدُّ: } \text{جد قيم } a, b, c, d \text{ التي تجعل العبارة } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 11 \\ 20 & 29 \end{bmatrix} \text{ صحيحة.}$$

(47) **اكتب:** ارجع إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس ، واستعمل البيانات المعطاة لشرح كيفية استعمال المصفوفات في إحصاءات المبيعات للمكتبة.

تدريب على اختبار

(49) **رتبة المصفوفة:** ما رتبة المصفوفة الناتجة عن عملية الضرب الآتية؟

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \\ j & k & l \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$1 \times 4 \quad \mathbf{A}$$

$$3 \times 3 \quad \mathbf{B}$$

$$4 \times 1 \quad \mathbf{C}$$

$$4 \times 3 \quad \mathbf{D}$$

(48) في مشغل ثلاث آلات حياكة، فإذا كان إنتاج كل آلة في 3 أشهر كما في الجدول أدناه ، وسعر بيع القطعة الواحدة من إنتاج كل آلة معطى أيضاً، فما المبلغ الذي سيحصل عليه المشغل من مبيعات الأشهر الثلاثة؟

	سعر بيع القطعة	الشهر 1	الشهر 2	الشهر 3
الآلة 1	28	26	19	36
الآلة 2	19	48	27	16
الآلة 3	31	36	11	18

$$5400 \text{ ريال } \mathbf{B} \quad 6012 \text{ ريال } \mathbf{A} \\ 2320 \text{ ريال } \mathbf{D} \quad 1221 \text{ ريال } \mathbf{C}$$

مراجعة تراكمية

أوجد الناتج في كلٌّ مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً: (الدرس 2-2)

$$-4 \left(\begin{bmatrix} 8 & 9 \\ -5 & 5 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -6 & -1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \right) \quad (52) \quad 5 \left(2 \begin{bmatrix} -2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \right) \quad (51) \quad 4 \begin{bmatrix} 8 & -1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \quad (50)$$

اختبار منتصف الفصل

الدروس 2-1 إلى 2-3

أوجد الناتج في كل مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً:

$$\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & -6 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -7 \\ 6 & 3 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (12)$$

- (13) اختصار من متعدد: إذا كانت المصفوفة \underline{Y} من النوع 2×3 ، والمصفوفة \underline{X} من النوع 3×4 ، فما رتبة المصفوفة \underline{YX} ؟

 3×4 **C** 2×3 **A** 4×2 **D** 3×2 **B**

- (14) مبيعات: يبين الجدول الآتي مبيعات محل ألبسة رياضية من القمصان والبناطيل بالدستة، وقد قرر صاحب المحل مضاعفة عدد القمصان والبناطيل قبيل فصل الصيف.

النوع	صغير	وسط	كبير
قميص	10	10	15
بنطال	25	35	45

- (a) اكتب مصفوفة \underline{A} تمثل عدد القمصان والبناطيل في المحل قبل مضاعفة العدد.

- (b) ما العدد الذي يمكن أن نضرب فيه المصفوفة \underline{A} لإيجاد المصفوفة \underline{M} التي تمثل عدد القمصان والبناطيل بعد مضاعفته؟ جد \underline{M} .

- (c) ماذا تمثل المصفوفة $\underline{A} - \underline{M}$ في هذه الحالة؟

- (15) اختصار من متعدد: ناتج الضرب:

$$4 \cdot 0 \cdot -2 \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & -4 \\ 0 & 0 \\ 0 & -8 \end{bmatrix} \quad \text{C}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & -12 \end{bmatrix} \quad \text{A}$$

عملية الضرب غير معّرفه

حدد رتبة كل مصفوفة فيما يأتي:

$$\begin{bmatrix} 10 & -6 & 18 & 0 \\ -7 & 5 & 2 & 4 \\ 3 & 11 & 9 & 7 \end{bmatrix} \quad (2) \quad [3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7] \quad (1)$$

$$\text{إذا كانت } \underline{A} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -5 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} 1 & -9 & 2 \\ 0 & 10 & 4 \end{bmatrix} \text{ فحدد: } b_{22} \quad (4) \quad a_{21} \quad (3)$$

- (5) مبيعات: يبين الجدول الآتي مبيعات محل ألبسة أطفال في أسبوعين مختلفين:

المحل	الأسبوع	الملابس المبيعة				
		قميص	بلوزة	قبعة	بنطال	غطاء
A	1	25	14	18	5	3
	2	32	26	15	4	4
B	1	44	10	13	8	6
	2	18	38	17	2	2

- (a) اكتب مصفوفة تمثل مبيعات كل أسبوع.

- (b) جد مجموع مبيعات الأسبوعين باستعمال جمع المصفوفات.

أوجد الناتج في كل مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً:

$$\begin{bmatrix} 0 & 15 \\ -6 & -10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$-3 \begin{bmatrix} 3 & 5 & 12 \\ 0 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & -5 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$2 \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} -3x \\ 2 \\ x \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} x-2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

- (9) اختصار من متعدد: أوجد ناتج:

$$2 \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -6 & 0 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 9 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 12 & 4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{C} \quad \begin{bmatrix} 42 & 6 \\ -4 & 12 \end{bmatrix} \quad \text{A}$$

$$\begin{bmatrix} 27 & -5 \\ -12 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{D} \quad \begin{bmatrix} 21 & 3 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{B}$$



المحددات وقاعدة كرامر

Determinants and Cramer's Rule

2-4



الماذرة

لتحديد الإقليم الذي يعيش فيه أحد النمور، قام عالم حيوانات بتتبعه بواسطة جهاز GPS، وبعد عدة أيام، تأكد العالم أن الإقليم مثلث الشكل. وأنه من الممكن بعد تحديد إحداثيات رؤوس المنطقة استعمال المصفوفات والمحددات لحساب مساحتها.

المحددات: كل مصفوفة مربعة لها محددة، وتسمى محددة المصفوفة من النوع 2×2 محددة الدرجة الثانية.

القطر الرئيسي لمصفوفة مربعة هو: جميع عناصر المصفوفة التي تمتد من الزاوية اليسرى العلوية للزاوية اليمنى السفلية. أو جميع العناصر a_{ij} حيث $j=i$.

اضف إلى
مطويتك

محددة الدرجة الثانية

مفهوم أساسى

التعبيراللفظي: يرمز لمحددة المصفوفة $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ بالرمز $[a \ b] [c \ d]$ وقيمتها تساوي حاصل ضرب عنصري القطر الرئيس مطروحاً منه حاصل ضرب عنصري القطر الآخر.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - cb \quad \text{بالرموز:}$$

القطر الرئيس

$$\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -3 & 6 \end{vmatrix} = 4(6) - (-3)(5) = 39 \quad \text{مثال:}$$

محددة الدرجة الثانية

مثال 1

أوجد قيمة كل محددة فيما يأتي:

$$\begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} \quad (a)$$

تعريف محددة الدرجة الثانية

$$\begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 5(9) - 8(-4) \\ = 45 + 32 \\ = 77$$

بسط

تعريف محددة الدرجة الثانية

بسط

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 4 & -11 \end{vmatrix} \quad (b)$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 4 & -11 \end{vmatrix} = 0(-11) - 4(6) \\ = 0 - 24 \\ = -24$$

قراءة الرياضيات

المحددات:

يرمز لمحددة المصفوفة
بالرمز $|A|$

تحقق من فهمك

$$\begin{vmatrix} 7 & 5 \\ 9 & -4 \end{vmatrix} \quad (1B)$$

$$\begin{vmatrix} -6 & -7 \\ 10 & 8 \end{vmatrix} \quad (1A)$$



قاعدة الأقطار

يمكن استعمال

قاعدة الأقطار فقط

للمصفوفات من الرتبة

 3×3 أضف إلى
مطويتكحساب محددة المصفوفة 3×3

مفهوم أساسى

الطريقة الأولى: باستعمال قاعدة الأقطار

$$\begin{array}{|ccc|cc|} \hline a & b & c & a & b \\ \hline d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \\ \hline \end{array}$$

أعد كتابة العمود الأول والثاني عن يمين المحددة.

خطوة 1:

$$\begin{array}{|ccc|cc|} \hline a & b & c & a & b \\ \hline d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \\ \hline \end{array}$$

أوجد حاصل ضرب عناصر القطر الرئيس

وثلاثيات العناصر على الموازيات المبينة ثم اجمع.

خطوة 2:

أوجد حاصل ضرب عناصر القطر الآخر وثلاثيات

العناصر على الموازيات المبينة ثم اجمع.

خطوة 3:

لإيجاد قيمة المحددة نطرح ناتج الخطوة 3 من ناتج الخطوة 2.

الطريقة الثانية: باستعمال محددة المصفوفة 2×2 .

$$a \cdot \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \cdot \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \cdot \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

حساب محددة المصفوفة 3×3

مثال 2

أوجد قيمة $\begin{vmatrix} 4 & -8 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -4 & 5 & 9 \end{vmatrix}$
باستعمال قاعدة الأقطار، ثم باستعمال محددة المصفوفة 2×2 .

أولاً: باستعمال قاعدة الأقطار:

الخطوة 1: أعد كتابة العمود الأول والثاني عن يمين المحددة.

$$\begin{vmatrix} 4 & -8 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -4 & 5 & 9 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 4 & -8 \\ -3 & 2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{vmatrix}$$

الخطوة 2: جد حاصل ضرب عناصر الأقطار وموازياتها.

$$\begin{array}{|ccc|cc|} \hline 4 & -8 & 3 & 4 & -8 \\ \hline -3 & 2 & 6 & -3 & 2 \\ \hline -4 & 5 & 9 & -4 & 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|ccc|cc|} \hline 4 & -8 & 3 & 4 & -8 \\ \hline -3 & 2 & 6 & -3 & 2 \\ \hline -4 & 5 & 9 & -4 & 5 \\ \hline \end{array}$$

$$4(2)(9) = 72$$

$$-4(2)(3) = -24$$

$$-8(6)(-4) = 192$$

$$5(6)(4) = 120$$

$$3(-3)(5) = -45$$

$$9(-3)(-8) = 216$$

الخطوة 3: اجمع نواتج الضرب في كل مجموعة.

$$72 + 192 + (-45) = 219$$

$$-24 + 120 + 216 = 312$$

الخطوة 4: اطرح المجموع الثاني من المجموع الأول.

$$219 - 312 = -93$$

فتكون قيمة المحددة هي -93



ثانياً: باستعمال محدد المصفوفة 2×2 :

$$\begin{vmatrix} 4 & -8 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -4 & 5 & 9 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} - (-8) \begin{vmatrix} -3 & 6 \\ -4 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 4 \times (-12) + 8 \times (-3) + 3 \times (-7) = -93$$

تحقق من فهمك

$$\begin{vmatrix} -8 & -4 & 4 \\ 0 & -5 & -8 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} \quad (2B)$$

$$\begin{vmatrix} -5 & 9 & 4 \\ -2 & -1 & 5 \\ -4 & 6 & 2 \end{vmatrix} \quad (2A)$$

تستعمل المحددات أيضاً لإيجاد مساحة المثلث. فإذا كانت إحداثيات رؤوس المثلث معروفة، فيمكنك استعمال الصيغة أدناه لإيجاد مساحة المثلث.

أضف إلى
مطويتك
مفهوم أساسى

مساحة المثلث

التعبير اللغزى: مساحة المثلث الذى إحداثيات رؤوسه $(a, b), (c, d), (e, f)$ هي القيمة المطلقة للمقدار A ، حيث:

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & b & 1 \\ c & d & 1 \\ e & f & 1 \end{vmatrix}$$

مثال: مساحة المثلث فى الشكل المجاور هي:

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

إرشادات للدراسة

صيغة المساحة

لاحظ أنه يجب أن تستعمل القيمة المطلقة للمقدار حتى تضمن أن المساحة غير سالبة.



حساب مساحة المثلث باستعمال المحددات

مثال 3 من واقع الحياة

عالم الحيوان: عد إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس. إذا كانت إحداثيات رؤوس الإقليم الذي يعيش فيه النمر موضحة في الشكل المجاور بالكميلومترات، فاستعمل المحددات لإيجاد مساحة الإقليم.

قاعدة الأقطار

اجمع نواتج ضرب عناصر الأقطار

$$(a, b) = (0, 0)$$

$$(c, d) = (4, 12)$$

$$(e, f) = (-2, 8)$$

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & b & 1 \\ c & d & 1 \\ e & f & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 4 & 12 & 1 \\ -2 & 8 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 0 + 0 + 32 = 32$$

$$-24 + 0 + 0 = -24$$

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 4 & 12 & 1 \\ -2 & 8 & 1 \end{vmatrix}$$

الربط مع الحياة

يعيش النمر في أقاليم قد تصل مساحتها إلى 100 km^2 ، ويحرس النمر إقليمه الذي يعيش فيه ويعرفه بتتبع أثره وأماكن روثه.

إرشادات للدراسة

مساحة المثلث

لا تختلف قيمة مساحة المثلث باختلاف ترتيب الرؤوس في المحددة، أو بتبديل الصفوف فيها.

تحقق من فهمك

(3) خرائط: يقف خالد وسعد ورضا عن ثلات نقاط مختلفة على خريطة المدينة التي يسكنونها، فإذا كانت إحداثيات هذه النقاط هي: (9, 15), (6, 4), (3, 15)، بحيث تمثل كل وحدة على الخريطة 0.5 km. فما مساحة المنطقة المثلثة التي يقفون عند رؤوسها؟

إرشادات للدراسة

المحددات

تستعمل المحددات لتحديد ما إذا كان لنظام المعادلات الخطية حلٌّ وحيد أم لا.

تسمى المصفوفة التي عناصرها معاملات المتغيرات في نظام معادلات بعدة متغيرات بعد ترتيب النظام **مصفوفة المعاملات**.

قاعدة كرامر: يمكنك استعمال المحددات لحل أنظمة معادلات، فإذا كانت قيمة المحددة لمصفوفة المعاملات لا تساوي صفرًا، فإن لنظام حلًاً وحيدًاً. وإذا كانت قيمة المحددة صفرًا، فإنما أن يكون لنظام عدد لا نهائي من الحلول أو لا حل له، وهنالك طريقة لحل أنظمة المعادلات الخطية تُسمى **قاعدة كرامر**.

أضف إلى
مطويتك

قاعدة كرامر

مفهوم أساسى

$$C = \begin{vmatrix} a & b \\ f & g \end{vmatrix}, \text{ حيث } ax + by = m \\ fx + gy = n \quad \text{إذا كانت } C \text{ مصفوفة المعاملات لنظام}$$

$$\frac{\begin{vmatrix} a & m \\ f & n \end{vmatrix}}{|C|} \quad \text{فإن حل هذا النظام هو } x = \frac{\begin{vmatrix} m & b \\ n & g \end{vmatrix}}{|C|} \text{ و } y = \frac{\begin{vmatrix} a & b \\ f & n \end{vmatrix}}{|C|}, \text{ وذلك إذا كانت } |C| \neq 0.$$

مثال 4 حل نظام من معادلتين

$$5x - 6y = 15 \\ 3x + 4y = -29 \quad \text{حل النظام الآتي باستعمال قاعدة كرامر:}$$

احسب محدد مصفوفة المعاملات

$$|C| = \begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 5(4) - (3)(-6) = 38$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 15 & -6 \\ -29 & 4 \end{vmatrix}}{|C|}$$

قاعدة كرامر

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 15 \\ 3 & -29 \end{vmatrix}}{|C|}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} 15 & -6 \\ -29 & 4 \end{vmatrix}}{38}$$

عُوض

$$= \frac{\begin{vmatrix} 5 & 15 \\ 3 & -29 \end{vmatrix}}{38}$$

$$= \frac{15(4) - (-29)(-6)}{38}$$

احسب المحددات

$$= \frac{5(-29) - 3(15)}{38}$$

$$= \frac{60 - 174}{38}$$

اضرب

$$= \frac{-145 - 45}{38}$$

$$= -\frac{114}{38}$$

اجمع واطرح

$$= -\frac{190}{38}$$

$$= -3$$

بسط

$$= -5$$

إرشادات للدراسة

قاعدة كرامر

عندما تكون قيمة محددة مصفوفة المعاملات C صفرًا، فإنه لا يكون لنظام حلٌّ وحيد.



حل النظام هو: $(-3, -5)$

$$x = -3, y = -5 \quad 5(-3) - 6(-5) \stackrel{?}{=} 15 \quad \text{تحقق:}$$

$$\text{بسط} \quad -15 + 30 \stackrel{?}{=} 15$$

$$\checkmark \quad 15 = 15$$

$$x = -3, y = -5 \quad 3(-3) + 4(-5) \stackrel{?}{=} -29$$

$$\text{بسط} \quad -9 - 20 \stackrel{?}{=} -29$$

$$\checkmark \quad -29 = -29$$

تحقق من فهمك

$$8x - 5y = 70 \quad (4B)$$

$$9x + 7y = 3$$

$$7x + 3y = 37 \quad (4A)$$

$$-5x - 7y = -41$$

يمكنك استعمال قاعدة كرامر لحل نظام من ثلاث معادلات أيضاً.

أضف إلى

مطويتك

مفهوم أساسى

استعمال قاعدة كرامر لحل نظام من ثلاث معادلات

$$\underline{C} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ f & g & h \\ j & k & l \end{bmatrix} \quad ax + by + cz = m$$

إذا كانت \underline{C} مصفوفة المعاملات للنظام ، $fx + gy + hz = n$ حيث $jx + ky + lz = p$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} m & b & c \\ n & g & h \\ p & k & l \end{vmatrix}}{|\underline{C}|}, y = \frac{\begin{vmatrix} a & m & c \\ f & n & h \\ j & p & l \end{vmatrix}}{|\underline{C}|}, z = \frac{\begin{vmatrix} a & b & m \\ f & g & n \\ j & k & p \end{vmatrix}}{|\underline{C}|}$$

فإن حل هذا النظام هو \cdot وذلك إذا كانت $|\underline{C}| \neq 0$.

حل نظام من ثلاث معادلات

مثال 5

حل النظام الآتي باستعمال قاعدة كرامر:

$$3x - 2y + 7z = 47$$

$$7x - 6y - 8z = 15$$

احسب محددة مصفوفة المعاملات

$$|\underline{C}| = \begin{vmatrix} 4 & 5 & -6 \\ 3 & -2 & 7 \\ 7 & -6 & -8 \end{vmatrix} = 621$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -14 & 5 & -6 \\ 47 & -2 & 7 \\ 15 & -6 & -8 \end{vmatrix}}{621}$$

$$= \frac{3105}{621} = 5$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -14 & -6 \\ 3 & 47 & 7 \\ 7 & 15 & -8 \end{vmatrix}}{621}$$

$$= -\frac{1242}{621} = -2$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 5 & -14 \\ 3 & -2 & 47 \\ 7 & -6 & 15 \end{vmatrix}}{621}$$

$$= \frac{2484}{621} = 4$$

وعليه يكون حل النظام هو $(5, -2, 4)$

$$\begin{aligned} 3(5) - 2(-2) + 7(4) &\stackrel{?}{=} 47 \\ 15 + 4 + 28 &\stackrel{?}{=} 47 \\ \checkmark \quad 47 &= 47 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4(5) + 5(-2) - 6(4) &\stackrel{?}{=} -14 \\ 20 - 10 - 24 &\stackrel{?}{=} -14 \\ \checkmark \quad -14 &= -14 \\ 7(5) - 6(-2) - 8(4) &\stackrel{?}{=} 15 \\ 35 + 12 - 32 &\stackrel{?}{=} 15 \\ \checkmark \quad 15 &= 15 \end{aligned}$$

إرشادات للدراسة

التحقق من الحل
للتحقق من الحل،
عوض القيم في
المعادلات الأصلية.

تحقق من فهمك

$$\begin{aligned} 6x + 5y + 2z &= -1 \quad (5B) \\ -x + 3y + 7z &= 12 \\ 5x - 7y - 3z &= -52 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x + 5y + 2z &= -7 \quad (5A) \\ -4x + 3y - 5z &= -19 \\ 5x + 4y - 7z &= -15 \end{aligned}$$

تأكد

أوجد قيمة كل محددة مما يأتي:

المثالان 2, 1

$$\begin{array}{|cc|c} \hline -6 & -6 & (2) \\ \hline 8 & 10 & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|cc|c} \hline 16 & -10 & (4) \\ \hline -8 & 5 & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|cc|c} \hline 8 & 6 & (1) \\ \hline 5 & 7 & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|cc|c} \hline -4 & 12 & (3) \\ \hline 9 & 5 & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|ccc|c} \hline 2 & -3 & 5 & (6) \\ \hline -4 & 6 & -2 & \\ \hline 4 & -1 & -6 & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|ccc|c} \hline 3 & -2 & 2 & (5) \\ \hline -4 & 2 & -5 & \\ \hline -3 & 1 & 4 & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|ccc|c} \hline -5 & -3 & 4 & (8) \\ \hline -2 & -4 & -3 & \\ \hline 8 & -2 & 4 & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|ccc|c} \hline 8 & 4 & 0 & (7) \\ \hline -2 & -6 & -1 & \\ \hline 5 & -3 & 6 & \\ \hline \end{array}$$


$$\begin{array}{|ccc|c} \hline -4 & 3 & 0 & (10) \\ \hline 1 & 5 & -2 & \\ \hline -1 & -8 & -3 & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|ccc|c} \hline 8 & 3 & 4 & (9) \\ \hline 2 & 4 & 2 & \\ \hline 1 & 6 & 5 & \\ \hline \end{array}$$



الربط مع الحياة

مثلث برمودا منطقة جغرافية في المحيط الأطلسي على شكل مثلث متساوي الأضلاع (كل ضلع نحو 1500 km)، ومساحته حوالي 1000000 km^2 . وهي منطقة شهيرة بسبب مزاعم عن مخاطر وحوادث وقعت فيها ولم يُحل اللغز حتى الآن.



(11) جغرافيا: استعمل الخريطة الإحداثية المجاورة، التي تظهر منطقة مثلث برمودا، للإجابة بما يأتي:

a) احسب مساحة منطقة مثلث برمودا على الخريطة.

b) إذا كان طول كل وحدة على الخريطة تمثل 175 ميلاً في الواقع، فأوجد مساحة منطقة مثلث برمودا الحقيقية.

استعمل قاعدة كرامر لحل كل نظام معادلات مما يأتي:

$$10c - 7d = -59 \quad (13)$$

$$6c + 5d = -63$$

$$4x - 5y = 39 \quad (12)$$

$$3x + 8y = -6$$

مثال 3

مثال 4

مثال 5

استعمل قاعدة كرامر لحل كل نظام معادلات مما يأتي:

$$6x - 5y + 2z = -49 \quad (15)$$

$$-5x - 3y - 8z = -22$$

$$-3x + 8y - 5z = 55$$

$$4x - 2y + 7z = 26 \quad (14)$$

$$5x + 3y - 5z = -50$$

$$-7x - 8y - 3z = 49$$

تدريب وحل المسائل

أوجد قيمة كل محددة مما يأتي:

المثالان 1, 2

$$\begin{vmatrix} -5 & 8 \\ -6 & -7 \end{vmatrix} \quad (18)$$

$$\begin{vmatrix} -8 & -9 \\ 11 & 12 \end{vmatrix} \quad (17)$$

$$\begin{vmatrix} -7 & 12 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} \quad (16)$$

$$\begin{vmatrix} -5 & -1 & -2 \\ 1 & 8 & 4 \\ 0 & -6 & 9 \end{vmatrix} \quad (21)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & -6 \\ -3 & -4 & -5 \\ -2 & 5 & 8 \end{vmatrix} \quad (20)$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & -2 \\ -1 & -4 & 6 \\ -6 & -2 & 5 \end{vmatrix} \quad (19)$$

(22) علم الآثار: وجد عالم آثار عظام حوت عند الإحداثيات $(0, 3), (4, 7), (5, 9)$ على الخريطة. فإذا كانت الإحداثيات بالأمتار . فجد مساحة المثلث الذي رؤوسه تلك النقاط .

مثال 3

استعمل قاعدة كرامر لحل كل نظام معادلات مما يأتي:

$$10a - 3b = -34 \quad (24)$$

$$3a + 8b = -28$$

$$6x - 5y = 73 \quad (23)$$

$$-7x + 3y = -71$$

$$8x - 4y + 7z = 34 \quad (26)$$

$$5x + 6y + 3z = -21$$

$$3x + 7y - 8z = -85$$

$$5x - 4y + 6z = 58 \quad (25)$$

$$-4x + 6y + 3z = -13$$

$$6x + 3y + 7z = 53$$

المثالان 4, 5

الربط مع الحياة

عشر الباحثون أثناء التنقيب في أحد الكهوف على بقايا بشريّة، وقدروا أنها ترجع إلى ما قبل 200000 سنة.

(27) رحلة مدرسية: نظمت مدرسة ثانوية رحلة إلى المدينة المنورة التي تبعد 615 km عن المدرسة. فإذا كان معدل سرعة الحافلة على الطريق السريع 105 km/h ، ومعدل سرعتها داخل المدن 45 km/h، وكان زمن سير الحافلة 7 ساعات. فاستعمل قاعدة كرامر لإيجاد عدد ساعات سيرها على الطريق السريع، وعدد ساعات سيرها داخل المدن.

استعمل قاعدة كرامر لحل كل نظام معادلات مما يأتي:

$$7x + 8y + 9z = -149 \quad (29)$$

$$-6x + 7y - 5z = 54$$

$$4x + 5y - 2z = -44$$

$$3a - 5b - 9c = 17 \quad (28)$$

$$4a - 3c = 31$$

$$-5a - 4b - 2c = -42$$

(30) صناعة: ينتج مصنع 3 أحجام من علب الطلاء الفارغة، حجم صغير بتكلفة 1.15 ريال للعلبة، وحجم متوسط بتكلفة 1.75 ريال للعلبة، وحجم كبير بتكلفة 2.25 ريال للعلبة، وفي أحد الأيام أنتج من علب الحجم الصغير ضعف ما أنتجه من علب الحجم المتوسط، وكان مجموع ما أنتجه في ذلك اليوم 1385 علبة من جميع الأحجام، بتكلفة إجمالية قدرها 2238.75 ريالاً.

(a) استعمل قاعدة كرامر لإيجاد عدد العلب التي أنتجه المصنع من كل حجم في ذلك اليوم.

(b) إذا زادت تكلفة إنتاج علب الحجم الصغير فقط في اليوم التالي لتصبح 1.25 ريال بعد زيادة قليلة في الحجم، فأوجد تكلفة الإنتاج في اليوم التالي إذا كان إنتاج المصنع مقارنة باليوم السابق أقل بـ 140 علبة من الحجم الصغير، وأكثر بـ 125 علبة من الحجم المتوسط، وأكثر بـ 35 علبة من الحجم الكبير.

(31) بستنة: أراد حمد إنشاء حديقة مثلثية الشكل في فناء منزله، فرسم لها مخططاً على المستوى الإحداثي، وكانت إحداثيات رؤوس الحديقة على المستوى $(-3, 1), (-4, 2), (6, 2)$. جد المساحة الحقيقة للحديقة إذا كانت كل وحدة على المستوى الإحداثي تمثل متراً على الأرض.

مسائل مهارات التفكير العليا

(32) تحدّ: أوجد قيمة محددة مصفوفة من النوع 3×3 ، على أن تكون عناصرها على النحو الآتي:

$$a_{mn} = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } m + n \text{ زوجياً} \\ m + n & \text{إذا كان } m + n \text{ فردياً} \end{cases}$$


(33) مسألة مفتوحة: أعط مثلاً لمصفوفة من الرتبة 2×2 تحقق الشرط المذكور في كلٍ مما يأتي:

a) المحددة تساوي صفرًا.

b) المحددة تساوي 25

c) جميع العناصر أعداد سالبة والمحددة تساوي -32

(34) اكتب: صف التمثيلات البيانية الممكنة لنظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين إذا كانت محددة مصفوفة المعاملات تساوي صفرًا.



(36) أوجد مساحة المثلث المبين في الشكل المجاور.

- A 10 وحدات مربعة
- B 14 وحدة مربعة
- C 12 وحدة مربعة
- D 16 وحدة مربعة

(35) إجابة قصيرة: أعط مثلاً لمصفوفة من الرتبة 2×2 ، بحيث تكون جميع عناصرها أعداداً سالبةً ومحدّدتها تساوي 20.

تدريب على اختبار

مراجعة تراكمية

حدد إذا كانت مصفوفة الضرب معرفة في كل مما يأتي أم لا، وإذا كانت كذلك، فأوجد رتبة المصفوفة الناتجة: (الدرس 2-3)

$$E_{2 \times 7} \cdot E_{7 \times 1} \quad (39)$$

$$C_{5 \times 4} \cdot D_{5 \times 3} \quad (38)$$

$$A_{4 \times 2} \cdot B_{2 \times 6} \quad (37)$$

حل كل نظام مما يأتي: (مهارة سابقة)

$$4y + 6x = 10 \quad (41)$$

$$2x - 7y = 22$$

$$2x - 5y = -26 \quad (40)$$

$$5x + 3y = -34$$





2-5

النظير الضريبي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطية Inverse Matrices and Systems of Linear Equations



المذاكر

يبين الشكل المجاور أسعار وجبة الغداء في مطعم. ولتحديد سعر كل من الشطيرة، وعلبة المقبلات، وعلبة العصير، يمكنك إيجاد قيم المتغيرات w, s, d التي تتحقق المساواة:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ s \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 19 \\ 38 \end{bmatrix}$$

حيث w تمثل سعر الشطيرة، و s تمثل سعر علبة المقبلات، و d تمثل سعر علبة العصير.

مصفوفة الوحدة ونظير المصفوفة الضريبي: تذكر أن عددين من الأعداد الحقيقة يكون كُلُّ منهما نظيرًا ضريبيًّا لآخر إذا كان حاصل ضربهما هو العنصر المحايد لعملية الضرب. وكذلك الحال في المصفوفات، فإن **مصفوفة الوحدة** هي مصفوفة مربعة جميع عناصر قطرها الرئيس تساوي واحدًا، والباقي أصفار.

مصفوفة وحدة من النوع 3×3

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مصفوفة وحدة من النوع 2×2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

أضف إلى
مطويتك

المصفوفة المحايدة لعملية الضرب

مفهوم أساسى

التعبير اللغطي: المصفوفة المحايدة لعملية الضرب ورمزاها I هي مصفوفة الوحدة، والتي إذا ضربت في أي مصفوفة أخرى من الرتبة نفسها كان الناتج هو المصفوفة الأخرى.

لأن مصفوفة مربعة A لها رتبة مصفوفة الوحدة I نفسها،
فإن $A \cdot I = I \cdot A = A$.

الرموز: إذا كانت $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، و $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ فإن

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \quad \text{مثال:}$$

إذا كانت المصفوفتان A, B مربعتين ولهمما الرتبة نفسها، وكان $I = AB = BA$ فإن المصفوفة B تُسمى

نظيرًا ضريبيًّا للمصفوفة A ، وكذلك تُسمى المصفوفة A نظيرًا ضريبيًّا للمصفوفة B . وإذا كان للمصفوفة A نظير ضريبي فإنه يرمز إليه بالرمز A^{-1} ، حيث $I = A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1}$ ، حيث $I = A^{-1} \cdot A$.

فيما سبق:

درست حل نظام معادلات خطية جبرياً. (مهارة سابقة)

والآن:

- أجد النظير الضريبي لمصفوفة من النوع 2×2 .
- أكتب معادلات مصفوفية لنظام من معادلتين وأحلها.

المفردات:

مصفوفة الوحدة
identity matrix

النظير الضريبي للمصفوفة
inverse matrix

المعادلة المصفوفية
matrix equation

مصفوفة التوابع
constant matrix

مصفوفة المتغيرات
variable matrix

التحقق من النظير الضريبي

بما أن عملية ضرب المصفوفات ليست عملية إبدالية، فمن الضروري التأكد من الضرب في الاتجاهين.

مثال 1 التتحقق من النظير الضريبي

حدّد ما إذا كانت كلّ من المصفوفتين تمثل نظيرًا ضريبيًّا للأخرى أم لا فيما يأتي:

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \quad (\text{a})$$

كل من المصفوفتين \underline{A} , \underline{B} تمثل نظيرًا ضريبيًّا للأخرى إذا وفقط إذا كان $\underline{I} = \underline{A} \cdot \underline{B}$.

اكتب المعادلة

$$\underline{A} \cdot \underline{B} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}$$

اضرب المصفوفتين

$$= \begin{bmatrix} -1 + 1 & 2 - 2 \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} & 1 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

بما أن $\underline{I} \neq \underline{A} \cdot \underline{B}$ ، فإن أيًّا منهما لا تمثل نظيرًا ضريبيًّا للأخرى.

$$\underline{F} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \underline{G} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{5}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{bmatrix} \quad (\text{b})$$

كلّ من المصفوفتين \underline{F} , \underline{G} تمثل نظيرًا ضريبيًّا للأخرى إذا وفقط إذا كان $\underline{I} = \underline{G} \cdot \underline{F}$.

اكتب المعادلة

$$\underline{F} \cdot \underline{G} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{5}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{9}{4} - \frac{5}{4} & \frac{15}{8} - \frac{15}{8} \\ -\frac{6}{4} + \frac{6}{4} & -\frac{10}{8} + \frac{18}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

اكتب المعادلة

$$\underline{G} \cdot \underline{F} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{5}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{9}{4} - \frac{10}{8} & -\frac{15}{4} + \frac{30}{8} \\ \frac{3}{4} - \frac{6}{8} & -\frac{5}{4} + \frac{18}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

بما أن $\underline{I} = \underline{G} \cdot \underline{F}$ ، فإن كلاً من المصفوفتين \underline{G} , \underline{F} نظير ضريبي للأخرى.

تحقق من فهمك

$$\underline{X} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}, \underline{Y} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad (\text{1})$$

يمكنك استعمال المحددات؛ لإيجاد النظير الضريبي لمصفوفة ما.

أضف إلى
مطويتك

النظير الضريبي للمصفوفة من النوع 2×2

النظير الضريبي للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ هو $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ وذلك إذا كانت $|A| \neq 0$.

مفهوم أساسي

لاحظ تبديل موضع عنصرى القطر الرئيس، وتغيير إشارته عنصرى القطر الآخر عند حساب A^{-1} .

لاحظ أنه إذا كانت قيمة محددة مصفوفة ما تساوى صفرًا، فليس للمصفوفة نظير ضريبي.

مثال 2

إيجاد النظير الضريبي للمصفوفة

أوجد النظير الضريبي لكل مصفوفة فيما يأتي، إن وجد:

$$\underline{P} = \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad (a)$$

احسب المحددة

$$|\underline{P}| = \begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -7 - (-10) = 3$$

بما أن قيمة المحددة لا تساوي صفرًا، فإن \underline{P}^{-1} موجودة.

تعريف النظير الضريبي للمصفوفة من الرتبة 2×2

$$\underline{P}^{-1} = \frac{1}{|\underline{P}|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$|\underline{P}| = 3 \quad = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$$

بسط

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

تأكد: أوجد ناتجي ضرب المصفوفتين. وإذا كان كلُّ من ناتجي الضرب يساوي I، فإن كلتا المصفوفتين نظير ضريبي للأخرى.

$$\checkmark \quad \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{7}{3} + \frac{10}{3} & \frac{35}{3} - \frac{35}{3} \\ -\frac{2}{3} + \frac{2}{3} & \frac{10}{3} - \frac{7}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{Q} = \begin{bmatrix} -8 & -6 \\ 12 & 9 \end{bmatrix} \quad (b)$$

احسب المحددة

$$|\underline{Q}| = \begin{vmatrix} -8 & -6 \\ 12 & 9 \end{vmatrix} = -72 - (-72) = 0$$

بما أن قيمة المحددة تساوي صفرًا، فإن \underline{Q}^{-1} ليس موجودًا.

تحقق من فهمك

$$\underline{T} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \quad (2B)$$

$$\underline{D} = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \quad (2A)$$

المعادلات المصفوفية: يمكنك استعمال المصفوفات لتمثيل نظام من المعادلات وحله. فمثلاً، يمكنك كتابة **معادلة مصفوفية** لحل نظام معادلتين خطيتين:

$$ax + by = m \\ fx + gy = n \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} ax + by \\ fx + gy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$$

ويمكنك التعبير عما سبق بالمعادلة المصفوفية الآتية:

$$\begin{bmatrix} A \\ \underline{f} & g \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \\ m \\ n \end{bmatrix}$$

مصفوفة المعاملات

مصفوفة المتغيرات

المتغيرات في النظام فقط

مصفوفة الثوابت الثوابت

في النظام فقط

المعادلات المصفوفية

يمكنك استعمال هذه الطريقة لحل نظام معادلات فقط إذا كان لمصفوفة المعاملات \underline{A} نظير ضريبي، أما إذا لم يكن لها نظير ضريبي، فيمكن أن يكون للنظام عدد لانهائي من الحلول، أو لا يوجد له حل.



ثم حل المعادلة المصفوفية بالطريقة نفسها التي تحل بها أي معادلة أخرى من الشكل $ax = b$.

$$\begin{array}{l} \text{المعادلة} \\ \underline{AX} = \underline{B} \\ \underline{A^{-1}AX} = \underline{A^{-1}B} \\ \underline{IX} = \underline{A^{-1}B} \\ \underline{X} = \underline{A^{-1}B} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{اضرب كل طرف في النظير الضريبي} \\ \text{لمصفوفة المعاملات إن وجد} \end{array} \quad \begin{array}{l} ax = b \\ \left(\frac{1}{a}\right)ax = \left(\frac{1}{a}\right)b \\ \underline{A^{-1}A} = \underline{I}, \left(\frac{1}{a}\right)a = 1 \\ \underline{IX} = \underline{X}, 1x = x \end{array} \quad \begin{array}{l} 1x = \frac{b}{a} \\ x = \frac{b}{a} \end{array}$$

لاحظ أن حل المعادلة المصفوفية من الشكل $\underline{AX} = \underline{B}$ هو حاصل ضرب النظير الضريبي لمصفوفة المعاملات في مصفوفة الثوابت.

حل نظام من معادلتين باستعمال المعادلة المصفوفية

مثال 3 من واقع الحياة

سفر: زود سلمان سيارته بالوقود مرتين في أثناء سفره إلى الرياض قادماً من جدة، إذا كان سعر البنزين في المحطة الأولى 1.50 ريال لكل لتر، وفي المحطة الثانية كان السعر 1.45 ريال لكل لتر، وكان مجموع ما زود به سيارته من كل محطة؟

يكتب نظام المعادلتين الذي يمثل هذه الحالة على النحو الآتي:

$$x + y = 100$$

$$1.50x + 1.45y = 149$$

الخطوة 1: اكتب المعادلة المصفوفية بافتراض أن x عدد لترات البنزين من المحطة الأولى، ولا عدد لترات البنزين من المحطة الثانية:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1.50 & 1.45 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 149 \end{bmatrix}$$

الخطوة 2: أوجد النظير الضريبي لمصفوفة المعاملات.

$$A^{-1} = \frac{1}{1.45 - 1.50} \begin{bmatrix} 1.45 & -1 \\ -1.50 & 1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{0.05} \begin{bmatrix} 1.45 & -1 \\ -1.50 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -29 & 20 \\ 30 & -20 \end{bmatrix}$$

الخطوة 3: حل المعادلة المصفوفية باستعمال $\underline{X} = \underline{A^{-1}}\underline{B}$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -29 & 20 \\ 30 & -20 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 100 \\ 149 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 80 \\ 20 \end{bmatrix}$$

إذن الحل هو $(20, 80)$ ، وهذا يعني أن سلمان زود سيارته بـ 80 لترًا من المحطة الأولى و 20 لترًا من الثانية.



الربط مع الحياة

هناك 90% من محطات الوقود العاملة في المملكة يُديرها أفراد يمتلكون هذه المحطات، بينما 10% فقط من هذه المحطات تُديرها شركات متخصصة في مجال تشغيل وإدارة محطات الوقود.



حدّد ما إذا كانت كُلُّ من المصفوفتين تمثل نظيرًا ضربيًّا للأخرى أم لا فيما يأتي:

$$\underline{F} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \underline{G} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

أوجد النظير الضريبي لكل مصفوفة فيما يأتي إن وجد:

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

مثال 1 (5) **نقود:** مع أحمد 25 قطعة نقدية من فئة أربع وأنصاف الريالات، بحيث تبلغ قيمة ما معه 8.5 ريالات. فما عدد الأرباع والأنصاف التي معه؟

استعمل معادلة مصفوفية لحل كل نظام فيما يأتي:

$$-2x + y = -4 \quad (8)$$

$$4x - 2y = 22 \quad (7)$$

$$-2x + y = 9 \quad (6)$$

$$3x + y = 1$$

$$6x + 9y = -3$$

$$x + y = 3$$

تدريب و حل المسائل

حدّد ما إذا كانت كُلُّ من المصفوفتين تمثل نظيرًا ضربيًّا للأخرى أم لا فيما يأتي:

$$\underline{R} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \underline{S} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (11) \quad \underline{M} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \underline{N} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (10) \quad \underline{K} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \underline{L} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

أوجد النظير الضريبي لكل مصفوفة فيما يأتي إن وجد:

$$\begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -6 & -1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

مثال 2 (16) **مشتريات:** دفع سعد 225 ريالًا لشراء 5 أقلام حبر جافة وَ 6 أقلام حبر سائلة، بينما دفع ماجد 120 ريالًا لشراء 3 أقلام جافة من النوع نفسه وَ 3 أقلام سائلة من النوع نفسه. فإذا كان سعر القلم الجاف x . وسعر القلم السائل y ، فاستعمل معادلة مصفوفية؛ لإيجاد سعر القلم الجاف.

مثال 3

(17) سكان: يبين الشكل الآتي نسبة الهجرة السنوية بين إحدى المدن وضواحيها.



اكتب مصفوفة تبين نسبة المهاجرين والباقي في كُلُّ من المدينة والضواحي.

استعمل معادلة مصفوفية لحل كل نظام إن أمكن فيما يأتي:

$$x + y = 4 \quad (20)$$

$$-x + y = 3 \quad (19)$$

$$-x + y = 4 \quad (18)$$

$$-4x + y = 9$$

$$-2x + y = 6$$

$$-x + y = -4$$

$$4x + 2y = 6 \quad (23)$$

$$y - x = 5 \quad (22)$$

$$3x + y = 3 \quad (21)$$

$$6x - 3y = 9$$

$$2y - 2x = 8$$

$$5x + 3y = 6$$

$$2y - 4x = 3 \quad (26)$$

$$4y - x = -2 \quad (25)$$

$$1.6y - 0.2x = 1 \quad (24)$$

$$4x - 3y = -6$$

$$3y - x = 6$$

$$0.4y - 0.1x = 0.5$$

تعنى حكومتنا الرشيدة إلى إقامة العديد من المشاريع في الضواحي بهدف وضع بنية تحتية فاعلة، مما يشجع على الهجرة العكسية أو هجرة السكان من المدن إلى الضواحي.



الربط مع الحياة

مسائل مهارات التفكير العليا

(27) **اكتشف الخطأ:** أنشأت كل من هاجر وفاطمة معادلة مصفوفية لنظام المعادلتين $5x + 7y = 19$, $3y + 4x = 10$. فهل حل أحدهما أو كليهما صحيح؟ فسر إجابتك.

فاطمة

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 10 \end{bmatrix}$$

هاجر

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 10 \end{bmatrix}$$

(28) **تحدد:** صِف المعادلة المصفوفية لنظام معادلتين خطيتين بمتغيرين ذات العدد اللانهائي من الحلول.

(29) **تبسيّر:** حدد إذا كانت الجملة الآتية صحيحة دائمًا، أو صحيحة أحياناً، أو غير صحيحة أبداً، وفسّر إجابتك.
"المصفوفة المربعة لها نظير ضربي".

(30) **مسألة مفتوحة:** اكتب معادلة مصفوفية ليس لها حل.

(31) **اكتب:** اشرح كيف يمكن استعمال معادلات مصفوفية لحل أنظمة معادلات، ومتى يكون استعماله أكثر فاعلية.

تدريب على اختبار

(32) **إجابة قصيرة:** تبيع مكتبة 3 أحجام من الدفاتر: حجم صغير بسعر 2 ريال، وحجم متوسط بسعر 3 ريالات، وحجم كبير بسعر 4 ريالات، فإذا باعت المكتبة 52 دفترًا في أحد الأشهر، وكان عدد الدفاتر المباعة من الحجم المتوسط يزيد على عدد الدفاتر المباعة من الحجم الصغير بـ 7 دفاتر، وكان إجمالي المبيعات 150 ريالاً. فما عدد الدفاتر المباعة من الحجم المتوسط؟

36 D 24 C 17 B 11 A

مراجعة تراكمية

جد قيمة كل محددة فيما يأتي: (الدرس 2-4)



$$\left| \begin{array}{ccc} 8 & 6 & -1 \\ -4 & 5 & 1 \\ -3 & -2 & 9 \end{array} \right| \quad (35)$$

$$\left| \begin{array}{cc} 9 & -7 \\ -5 & -3 \end{array} \right| \quad (34)$$

$$\left| \begin{array}{cc} 8 & -3 \\ 6 & -9 \end{array} \right| \quad (33)$$

(36) **حليب:** تنتج مزرعة أبقار 200 جالون على الأكثر من الحليب الطازج والحليب المبستر يومياً. فإذا كان كل زبون من زبائن المزرعة يحتاج إلى 15 جالوناً على الأقل من الحليب المبستر، و21 جالوناً على الأقل من الحليب الطازج يومياً، وكان ربح المزرعة في الجالون الواحد من الحليب المبستر 8.2 ريالات، ومن الحليب الطازج 7.5 ريالات. فكم عدد الجالونات التي يجب إنتاجها من كل النوعين ليكون الربح أكبر ما يمكن؟ (الدرس 1-6)

حدّد نوع الدالة الممثلة بيانياً في كلّ مما يأتي: (الدرس 1-3)



المصفوفات الموسعة



يمكنك حل نظام معادلات خطية باستعمال الحاسبة البيانية TI-nspire، إذ تحتوي المصفوفة الموسعة على مصفوفة المعاملات مع عمود إضافي إلى اليمين يحوي الثوابت، وباختزال المصفوفة الموسعة يصبح من السهل تحديد حل نظام من المعادلات.

مثال

اكتب مصفوفة موسعة لنظام المعادلات الآتي، ثم حل هذا النظام



باستعمال الحاسبة البيانية:

$$2x + y + z = 1$$

$$3x + 2y + 3z = 12$$

$$4x + y + 2z = -1$$

الخطوات:



- افتح الآلة الحاسبة بالضغط على .

- من الشاشة الظاهرة اختر العمليات الحاسبة ومنها اختر

- مستند جديد

- اختر إضافة تطبيق الحاسبة .

- اضغط على مفتاح ثم اختر المصفوفات والمتغيرات ومنها اختر 1: إنشاء و منها 1: المصفوفة فتظهر شاشة تحدّد من خلالها عدد الصنوف وعدد الأعمدة.

- أدخل عدد الصنوف ثم اضغط وأدخل عدد الأعمدة ثم اضغط

- أدخل معاملات المتغيرات والثوابت مستعملاً للتنقل، ثم اضغط

- اضغط و اختر منها 1: ملف ثم 5: حفظ باسم... ثم سُمّي الملف واضغط

- اضغط ، ثم اختر المصفوفات والمتغيرات ومنها اختر Reduced Row-Echelon Form :5

- استعمل السهم لأعلى لتظلل المصفوفة الموسعة التي كتبتها ثم اضغط ثم اضغط مرة أخرى فيظهر الحل.

ادرس الشكل المختزل للمصفوفة، ولاحظ أن الأعمدة الثلاثة الأولى تشکل مصفوفة محايدة من الرتبة 3×3 ، و تستنتج من الصف الأول أن $-4 = x$ ، ومن الصف الثاني أن $3 = y$ ، ومن الصف الثالث أن $6 = z$ ، وعليه يكون الحل $(-4, 3, 6)$.

تمارين:

اكتب مصفوفة موسعة لكل نظام معادلات فيما يأتي، ثم حلّه باستعمال الحاسبة البيانية:

$$6x - 4y + 2z = -4 \quad (3)$$

$$2x - 2y + 6z = 10$$

$$2x + 2y + 2z = -2$$

$$4x + 6y = 0 \quad (2)$$

$$8x - 2y = 7$$

$$3x + 2y = -4 \quad (1)$$

$$4x + 7y = 13$$

الهدف

استعمل الحاسبة
البيانية TI-nspire
والمصفوفة الموسعة
لحل نظام معادلات
خطية.

دليل الدراسة والمراجعة

ملخص الفصل

المفردات	التعريف
محددة الدرجة الثانية (83)	المصفوفة (62)
محددة الدرجة الثالثة (84)	العنصر (62)
قاعدة الأقطار (84)	الرتبة (62)
مصفوفة المعاملات (86)	مصفوفة الصف (63)
قاعدة كرامر (86)	مصفوفة العمود (63)
مصفوفة الوحدة (91)	المصفوفة المربعة (63)
النظير الضريبي للمصفوفة (91)	المصفوفة الصفرية (63)
المعادلة المتساوية (93)	المصفوفات المتساوية (63)
مصفوفة الثوابت (93)	جمع مصفوقتين (69)
مصفوفة المتغيرات (93)	طرح مصفوقتين (69)
ضرب المصفوفة في عدد ثابت (70)	ضرب المصفوفة في عدد ثابت (83)
المحددة	المحددة

اختبار مفرداتك

اختر الكلمة المناسبة من المفردات أعلاه لتكميل كل جملة فيما يأتي:

1) الترتيب على هيئة مستطيل لمتغيرات أو أعداد في صفوف أفقية وأعمدة رأسية تكتب بين قوسين يسمى _____.

2) عملية ضرب جميع عناصر المصفوفة في عدد تسمى _____.

3) تسمى المصفوفة التي تحوي الثوابت في نظام المعادلات _____.

4) كل قيمة في المصفوفة تسمى _____.

5) يُسمى عدد الصفوف \times عدد الأعمدة في المصفوفة _____ المصفوفة.

6) المصفوفة المربعة التي عناصر القطر الرئيس فيها العدد 1 وبباقي العناصر أصفار هي _____.

7) المصفوفة التي جميع عناصرها أصفار هي _____.

8) قيمة _____ المصفوفة $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ تساوي 1.

9) إذا كان حاصل ضرب مصفوقتين هو مصفوفة الوحدة، فإن كلتا المصفوقتين تكون _____ للأخرى.

المفاهيم الأساسية

المصفوفات (الدرس 2-1)

- المصفوفة: هي ترتيب على هيئة مستطيل لمتغيرات أو أعداد في صفوف أفقية وأعمدة رأسية بين قوسين.
- المصفوفات المتساوية لها الرتبة نفسها، وعناصرها المتناظرة متساوية.

العمليات على المصفوفات (الدرسان 2-2 و 2-3)

- يمكن جمع المصفوفات أو طرحها إذا كان لهما الرتبة نفسها. وذلك بجمع العناصر المتناظرة أو طرحها.
- لضرب مصفوفة في عدد ثابت k ، اضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في هذا العدد.
- يمكن ضرب مصفوقتين إذا كان عدد أعمدة الأولى يساوي عدد صفوف الثانية.

المحددات وقاعدة كرامر (الدرس 2-4)

- قيمة محددة المصفوفة المربعة من الرتبة 2×2 تساوي حاصل ضرب عنصري القطر الرئيس مطروحاً منه حاصل ضرب عنصري القطر الآخر.
- تستعمل المحددات في حل أنظمة المعادلات الخطية، وفي إيجاد مساحة مثلث علمت إحداثيات رؤوسه.

النظير الضريبي للمصفوفة وأنظمة المعادلات

الخطية (الدرس 2-5)

- مصفوفة الوحدة هي مصفوفة مربعة عناصر القطر الرئيس فيها العدد 1 وبباقي العناصر أصفار.
- تكون كل من المصفوقتين نظيراً ضريبياً للأخرى إذا كان حاصل ضربهما يعطي مصفوفة الوحدة.
- لحل معادلة مصفوفية من الشكل $AX = B$ ، أوجد النظير الضريبي لمصفوفة المعاملات، ثم اضرب طرفي المعادلة فيه.

المطويات منظم أفكار



تأكد من أن المفاهيم الأساسية مدونة في مطويتك.

مراجعة ال دروس

2-1 مقدمة في المصفوفات (الصفحات: 62-67)

مثال 1

متاحف: يبين الجدول الآتي عدد زوار متاحف في الفترة الصباحية وال فترة المسائية خلال 3 أيام:

	اليوم الأول	اليوم الثاني	اليوم الثالث
الفترة الصباحية	37	19	26
الفترة المسائية	69	58	75

- (a) اكتب مصفوفة تمثل عدد الزوار.
(b) ما رتبة المصفوفة؟ 3×2
(c) اجمع عناصر كل من الصفين 1 و 2، وفسّر النتائج.
مجموع عناصر الصف 1 هو 82، ويمثل عدد الزوار في الفترة الصباحية لـ 3 أيام. ومجموع عناصر الصف 2 هو 202، ويمثل عدد الزوار في الفترة المسائية لـ 3 أيام.

(10) **نادي رياضي:** يبين الجدول الآتي عدد المشتركين شهرياً وسنويًا في نادي رياضي في 3 رياضات مختلفة:

	تحفيض الوزن	السباحة	اللياقة البدنية
اشتراك شهري	64	108	31
اشتراك سنوي	42	9	68

- (a) نظم بيانات الجدول في المصفوفة A .
(b) ما رتبة المصفوفة A ?
(c) ما قيمة العنصر a_{23} ?
(d) ما قيمة العنصر a_{11} ?
(e) اجمع عناصر كل من الصفين الأول والثاني، وفسّر النتائج.

2-2 العمليات على المصفوفات (الصفحات: 71-76)

مثال 2

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

أوجد ناتج $2B + 3A$ إذا كانت

$$3A = 3 \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, 2B = 2 \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}$$

$$2B + 3A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 27 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 11 \\ 9 & 20 \end{bmatrix}$$

أوجد الناتج في كلٍ مما يأتي، إذا كان ذلك ممكناً:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$3 \left(\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \right) \quad (12)$$

2-3 ضرب المصفوفات (الصفحات: 77-83)

مثال 3

$$X = \begin{bmatrix} 0 & -6 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \end{bmatrix}$$

أوجد XY إذا كانت

$$XY = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -6 & 8 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0(8) + (-6)(-1) \\ 3(8) + 5(-1) \end{bmatrix}$$

بسط

$$= \begin{bmatrix} 6 \\ 19 \end{bmatrix}$$

اضرب المصفوف في الأعمدة

أوجد الناتج في كلٍ مما يأتي، إذا كان ذلك ممكناً:

$$[3 \quad -7] \cdot \begin{bmatrix} 9 \\ -5 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 8 & -5 \end{bmatrix} \quad (14)$$

- (15) **مشتريات** اشتري راشد 4 علب حليب، و 2 kg تفاحاً، و 3 kg بطاطس، وكيساً واحداً من الأرز، وتبيّن المصفوفة أدناه سعر علبة الحليب، والكيلوجرام الواحد من التفاح، والكيلوجرام الواحد من البطاطس، وكذلك سعر كيس الأرز.

$$\begin{array}{cccc} \text{أرز} & \text{بطاطس} & \text{تفاح} & \text{حليب} \\ [15 & 10 & 3 & 25] \end{array}$$

استعمل ضرب المصفوفات لإيجاد إجمالي المبلغ الذي دفعه راشد.



دليل الدراسة والمراجعة

المحددات وقاعدة كرامر (الصفحتان: 85-92) 2-4

مثال 4

$$\cdot \begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

أوجد قيمة:

تعريف محددة الدرجة الثانية

$$\begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 4(5) - 2(-6)$$

بسط

$$= 20 + 12 = 32$$

مثال 5

استعمل قاعدة كرامر لحل النظام:

$$2a + 6b = -1, a + 8b = 2$$

$$b = \frac{1}{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 6 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}}$$

قاعدة كرامر

$$= \frac{4+1}{16-6}$$

$$= \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

احسب المحددات

$$a = \frac{1}{\begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 2 & 8 \\ 2 & 6 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{-8-12}{16-6}$$

$$= \frac{-20}{10} = -2$$

الحل هو .

أوجد قيمة كل محددة فيما يأتي:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ -2 & 5 & 6 \end{vmatrix} \quad (17) \quad \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & -3 \end{vmatrix} \quad (16)$$

استعمل قاعدة كرامر لحل كل نظام معادلات فيما يأتي:

$$3x - y = 0 \quad (18)$$

$$5x + 2y = 22$$

$$5x + 2y = 4 \quad (19)$$

$$3x + 4y + 2z = 6$$

$$7x + 3y + 4z = 29$$

(20) **حرف يدوية:** صنعت شيماء 3 أساور، وعقدت بتكلفة مقدارها 85 ريالاً، وصنعت ليلى سوارين و 4 عقود بتكلفة مقدارها 110 ريالات. فإذا كان للعقود التي صنعتها كل منها التكلفة نفسها، وكذلك الأساور. فجد تكلفة كلٌ من العقد، والسوار.

النظير الضريبي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطية (الصفحتان: 93-98) 2-5

مثال 6

$$\cdot \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 36 \end{bmatrix}$$

حل المعادلة المصفوفية:

الخطوة 1: جد النظير الضريبي لمصفوفة المعاملات.

$$A^{-1} = \frac{1}{-12 - (-15)} \begin{bmatrix} -6 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -6 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

الخطوة 2: حل المعادلة المصفوفية باستعمال B^{-1}

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -6 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 15 \\ 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 90 \\ 27 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 9 \end{bmatrix}$$

إذن الحل هو (30, 9).

أوجد النظير الضريبي لكل مصفوفة فيما يأتي، إن وجد:

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -5 & -13 \end{bmatrix} \quad (22) \quad \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad (21)$$

$$\begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -8 & 4 \end{bmatrix} \quad (23)$$

حل المعادلة المصفوفية فيما يأتي:

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (24)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix} \quad (25)$$

(26) **مشتريات:** اشتري سعود 2 kg مكسرات و 2 kg قهوة بمبلغ 140 ريالاً. واشتري ناصر 3 kg مكسرات وكيلوجراماً قهوة بمبلغ 170 ريالاً. فما سعر الكيلوجرام الواحد من كل النوعين؟

اختبار الفصل

2

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} -7 & 5 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}, \underline{C} = \begin{bmatrix} -4 & 7 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

فأوجد ناتج $\underline{AB} - \underline{AC}$ إذا كانت $\underline{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 7 \\ 9 & 1 & 1 \\ 8 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ ، فحدد قيمة كل عنصر مما يأتي: a_{31} (2) a_{22} (1)(9) استعمل المحددات لإيجاد مساحة Δxyz الذي رؤوسه $x(1, 2), y(3, 6), z(-1, 4)$.

(10) اختبار من متعدد: أوجد قيمة محددة المصفوفة:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ -2 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

 $\frac{1}{44} C - 44 A$ $-\frac{1}{44} D + 44 B$

أوجد النظير الضريبي لكل مصفوفة فيما يأتي، إن وجد:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} \quad (13)$$

استعمل معادلة مصفوفية لحل نظام المعادلين الآتي:

$$2x - y = -9 \quad (15)$$

$$x + 2y = 8$$

استعمل قاعدة كرامر لحل كل نظام معادلات فيما يأتي:

$$x - y + 2z = 0 \quad (16)$$

$$3x + z = 11$$

$$-x + 2y = 0$$

$$6x + 2y + 4z = 2 \quad (17)$$

$$3x + 4y - 8z = -3$$

$$-3x - 6y + 12z = 5$$

$$-3 \begin{bmatrix} 4a \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -6 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 5 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$\begin{bmatrix} -5 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

(7) مبيعات: تبيع مكتبة 3 مجموعات من كتب الأطفال. ويبين الجدول الآتي تكلفة كل مجموعة وسعر بيعها. فإذا باعت المكتبة 20 مجموعة من الكتب التربوية، و32 مجموعة من الكتب العلمية، و14 مجموعة من القصص.

المجموعة	التكلفة	سعر البيع (₪)
تربيوية	100	120
علمية	90	110
قصص	130	150

(a) نظم البيانات في مصفوفات، ثم استعمل ضرب المصفوفات لإيجاد تكلفة الكتب الكلية.

(b) استعمل ضرب المصفوفات لإيجاد المبلغ الكلي الذي تحصلت عليه المكتبة من بيع ذلك العدد من مجموعات الكتب.

(c) استعمل العمليات على المصفوفات لمعرفة ربح المكتبة.



الأعداد للاختبارات المعيارية

أسئلة الإجابات الشبكية

من المحتمل أن تواجه في الاختبارات المعيارية بالإضافة إلى أسئلة الاختيار من متعدد، وأسئلة الإجابات القصيرة، وأسئلة الإجابات المطولة، أسئلة الإجابات الشبكية. ويطلب هذا النوع من الأسئلة كتابة الإجابة في نموذج خاص، وذلك بتضليل الدوائر التي تمثل الإجابات الصحيحة.

استراتيجيات حل أسئلة الإجابات الشبكية

			3
		/	/
	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

3			
	/	/	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

الخطوة 1

- اقرأ المسألة بإمعان، ثم حلها.
- تأكد من أن إجابتكم لها معنى.
- إذا كان الوقت كافياً، فتحقق من إجابتكم.

1	/	4	
		/	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

3	.	5	
	/	/	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

الخطوة 2

- اكتب إجابتكم في مربع الإجابة.
- اكتب عدداً واحداً فقط أو رمزاً في كل مربع إجابة على نموذج الإجابة الشبكية.
- لاتكتب أي أرقام أو رموز خارج مربعات الإجابة.
- يمكن أن تكون إجابات هذه الأسئلة أعداداً كافية، أو كسوراً عشرية، أو كسوراً اعتيادية.

الخطوة 3

دون الإجابة في نموذج الإجابة الشبكية.

- ظلل دائرة واحدة فقط لكل مربع إجابة، وتأكد من أنك ظللت قيمة مناظرة للتي في المربع.
- ظلل بصورة واضحة وكاملة.

مثال

	/	/	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

اقرأ المسألة الآتية جيداً، وحدد ما تحتاج إلى معرفته، ثم استعمل المعطيات لحلها.

زُود محمد سيارته بالوقود مرتين في أثناء سفره إلى الرياض قادماً من مكة المكرمة. فإذا كان سعر البنزين في المحطة الأولى 1.50 ريال لكل لتر، وفي المحطة الثانية كان السعر 1.45 ريال لكل لتر، وكان مجموع ما زُود به سيارته من البنزين 100 لتر بسعر إجمالي 147.25 ريالاً. فكم لتر بنزين زُود به سيارته من كل محطة؟

اقرأ المسألة جيداً، إذ يمكن حلها باستعمال نظام من معادلتين.

لتكن x تمثل عدد اللترات من المحطة الأولى، و y تمثل عدد اللترات من المحطة الثانية،
لذا يكتب نظام المعادلتين الذي يمثل هذه الحالة على النحو الآتي:

$$x + y = 100$$

$$1.50x + 1.45y = 147.25$$

من الممكن حل هذا النظام جبرياً، ولكن يمكن حلّه بشكل أسرع وبطريقة
أسهل باستعمال المصفوفات والحسابية البيانية.

حل المسألة

أدخل كلاً من مصفوفة المعاملات ومصفوفة الثوابت إلى الحاسبة البيانية، ثم أوجد الحل
باستعمال النظير الضريبي.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1.50 & 1.45 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 147.25 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 \\ 55 \end{bmatrix}$$

إذن زُود محمد سيارته بـ 45 لترًا من المحطة الأولى، و 55 لترًا من المحطة الثانية.

		4	5
		1	1
		0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

تمارين ومسائل

اقرأ كل مسألة، وحدد ما تحتاج إلى معرفته، ثم استعمل المعطيات لحلّها. انسخ نموذج الإجابة، واستعمله في الإجابة.


(2) أوجد محددة المصفوفة:
$$H = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ -5 & -7 & -1 \\ 4 & -8 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) أوجد محددة المصفوفة



أسئلة الاختيار من متعدد

(5) ما النظام الذي تمثل حله المنطقة المظللة في الشكل أدناه؟



$4x + 2y \geq 8, 3x + 4y \leq 12, 2x - 6y < 12$ A

$4x + 2y \geq 8, 3x + 4y \geq 12, 2x - 6y < 12$ B

$4x + 2y \leq 8, 3x + 4y \leq 12, 2x - 6y < 12$ C

$4x + 2y \leq 8, 3x + 4y \geq 12, 2x - 6y < 12$ D

$$\text{؟ } \underline{D} = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 9 & 2 \\ 1 & 0 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} \quad \text{ما رتبة المصفوفة:}$$

4×8 C 4×2 A

8×4 D 2×4 B

(7) أيٌّ من الدوال الآتية يكون مداها: $\{f(x) | f(x) \geq 0\}$

$f(x) = [x]$ A

$f(x) = |-x + 1|$ B

$f(x) = -|x|$ C

$f(x) = -[x] + 1$ D

$\underline{X} = \begin{bmatrix} a+b & 2 \\ 7 & c+d \end{bmatrix}, \underline{Y} = \begin{bmatrix} 8 & d \\ b & a \end{bmatrix}$ إذا كان

وكان $\underline{Y} = \underline{X}$ فإن قيمة c تساوي:

-1 A

2 B

-2 C

1 D

اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

$\underline{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, إذا كانت

$\underline{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

فما قيمة $? 2\underline{A} + 3\underline{B}$

$\begin{bmatrix} -5 & 15 & 30 \\ 15 & 25 & 15 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} -6 & 3 & 9 \\ 0 & 9 & 5 \end{bmatrix}$ A

$\begin{bmatrix} -1 & 8 & 15 \\ 9 & 12 & 7 \end{bmatrix}$ D $\begin{bmatrix} -4 & 2 & 6 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}$ B

أوجد ناتج: $[3, 1] \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ إذا كان ذلك ممكناً.

$\begin{bmatrix} 8 & -4 \\ 12 & 6 \end{bmatrix}$ C [-3] A

D الضرب غير معروف [11] B

(3) في أيٍّ من الدوال الآتية يكون $0 \neq f\left(\frac{-1}{3}\right)$

$f(x) = -|3x| + 1$ A

$f(x) = [3x + 1]$ B

$f(x) = |3x| + 1$ C

$f(x) = [3x] + 1$ D

(4) النقاط $D(-6, 2), E(3, 5), F(8, -7)$ هي رؤوس $\triangle DEF$ احسب مساحة هذا المثلث:

54.5 وحدة مربعة. A

58 وحدة مربعة. B

60 وحدة مربعة.

61.5 وحدة مربعة.

أسئلة ذات إجابات قصيرة

أجب عن كلٍ مما يأتي:

(12) مع عمر 14 قطعة نقدية من فئة الريال، ونصف الريال. فإذا كانت القيمة الكلية لهذه القطع النقدية هي 10.5 ريالات، فاستعمل هذه المعلومات للإجابة عن كل سؤال مما يأتي:

(a) افرض أن d تمثل عدد الريالات التي يملكها عمر، و q عدد أنصاف الريالات التي يملكها. اكتب نظام معادلات يمثل هذه الحالة.

(b) اكتب معادلة مصفوفية يمكن أن تستعمل لإيجاد قيمة كلٍ من q و d .

(c) حل المعادلة المصفوفية في الفرع b باستعمال النظرير الضريبي. ما عدد الريالات وأنصاف الريالات التي يملكها عمر؟

(13) مثل بيانياً نظام المتباينات الآتي، ثم حدد رؤوس منطقة الحل وجد القيمة العظمى للدالة المعطاة في منطقة الحل:

$$x \geq 0, y \geq 0$$

$$x + 2y \leq 14$$

$$3x + 4y \leq 36$$

$$f(x, y) = 8x + 12y$$

(14) صُف بالكلمات متى يمكن ضرب مصفوفتين، ومتى لا يمكن ضربهما، وأعط مثالاً على ذلك.

(9) هل يوجد للمصفوفة \underline{B} نظير ضريبي؟ فسر إجابتك.

$$\underline{B} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -9 & 6 \end{bmatrix}$$

(10) احسب قيمة محددة للمصفوفة:

$$\underline{W} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & -4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

أسئلة ذات إجابات مطولة

أجب عن كلٍ مما يأتي موضحاً خطوات الحل:


(11) يستعمل حمد شبكة إحداثيات ليصمم أرضية جديدة في فناء منزله. فإذا كانت الأرضية تمثل حل نظام المتباينات $y \leq -x + 32$, $x \leq 16$, $y \geq 0$, $x \geq 0$, وكانت كل وحدة على شبكة الإحداثيات تمثل قدماً واحدة على الأرض، فما مساحة الأرضية بالقدم المربع؟

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	إذا لم تستطع حل سؤال...
2-3	1-6	2-5	1-5	2-4	2-5	2-1	1-4	2-1	1-5	2-4	1-3	2-3	2-2	فعد إلى ...

كثيرات الحدود ودوالها

Polynomials and Polynomial Functions



فيما سبق:

درست تمثيل الدوال التربيعية بيانياً، وحل المعادلات التربيعية.

والآن:

- أتعرف الأعداد المركبة، وأجري العمليات عليها.
- أحل معادلات تربيعية.
- أجمع كثيرات الحدود وأطرحها وأضربها وأقسمها.
- أحل دوال كثيرات الحدود.
- أصنف التمثيل البياني لدوال كثيرات الحدود.
- أجد قيم دوال كثيرات الحدود، وأحل معادلات كثيرات الحدود.
- أجد عوامل دوال كثيرات الحدود وأصفارها.
- أحدد عدد جذور معادلة كثيرة حدود وأنواعها.

لماذا؟


مواصلات: يمكن استعمال دوال كثيرات الحدود لتحديد جداول انطلاق الحافلات، والطاقة الاستيعابية للطرق السريعة، والأنماث المرورية، ومتوسط تكاليف الوقود، وأسعار كل من السيارات الجديدة والمستعملة.

المطويات


منظم أفكار

كثيرات الحدود ودوالها: اعمل المطوية لتساعدك على تنظيم ملاحظاتك حول كثيرات الحدود ودوالها، ابدأ بورقة A4.


4 عنون الأقسام الأربع بالعناوين:
الأعداد المركبة، كثيرات
الحدود، دوال كثيرات الحدود،
معادلات كثيرات الحدود.




3 ثبت الحافتين الطرفيتين
للثانية كما يظهر في
الشكل أدناه.



2 اثن الورقة بصورة موازية
للضلوع الأقصر إلى أربعة
أقسام متساوية العرض.



1 اثن الورقة بعرض
5cm بصورة موازية
للضلوع الأطول.





التهيئة للفصل 3

تشخيص الاستعداد:

أجب عن الاختبار الآتي ، وارجع إلى "المراجعة السريعة" : لمساعدتك على ذلك.

مراجعة سريعة

اختبار سريع

مثال 1

أعد كتابة العبارة $z - 3 - 2xy$ على صورة جمع.

العبارة الأصلية

$$2xy - 3 - z$$

أعد الكتابة باستعمال الجمع

$$= 2xy + (-3) + (-z)$$

مثال 2

استعمل خاصية التوزيع لإعادة كتابة العبارة الآتية دون أقواس:

$$-3(a + b - c)$$

العبارة الأصلية

$$-3(a + b - c)$$

خاصية التوزيع

$$= -3(a) + (-3)(b) + (-3)(-c)$$

بسط

$$= -3a - 3b + 3c$$

مثال 3

حل المعادلة: $x^2 - 6x + 12 = 19$

يمكن استعمال طريقة إكمال المربع.

المعادلة الأصلية

$$x^2 - 6x + 12 = 19$$

اطرح 12 من كلا الطرفين

$$x^2 - 6x = 7$$

اضف 9 لكلا الطرفين

$$x^2 - 6x + 9 = 7 + 9$$

حل 9 من كلا الطرفين

$$(x - 3)^2 = 16$$

أوجد الجذر التربيعي لكلا الطرفين

$$x - 3 = \pm 4$$

اضف 3 لكلا الطرفين

$$x = 3 \pm 4$$

الحلان هما: 7, -1

أعد كتابة كل من العبارات الآتية في صورة جمع:

(يستعمل مع الدرس 3-4)

$$5 - 3y \quad (2)$$

$$-5 - 13 \quad (1)$$

$$3x^2y - 14xy^2 \quad (4)$$

$$5mr - 7mp \quad (3)$$

(5) **محاضرات:** حضر 20 شخصاً محاضرة، ثم غادروا القاعة في مجموعات ثنائية، فغادرت منهم 3 مجموعة. اكتب عدد الأشخاص الباقين على صورة جمع.

استعمل خاصية التوزيع لإعادة كتابة كل عبارة فيما يأتي دون أقواس: (يستعمل مع الدرس 3-4)

$$-1(3b^2 + 2b - 1) \quad (7)$$

$$-4(a + 5) \quad (6)$$

$$-\frac{3}{4}(3z + 5) \quad (9)$$

$$-\frac{1}{2}(2m - 5) \quad (8)$$

(10) **هدايا:** وزع معلم قلماً وحقيبة على كل طالب في صف يضم 15 طالباً. إذا كان ثمن القلم 8 ريالات، والحقيبة 18 ريالاً، فاكتب عبارة تمثل ثمن الأقلام والحقائب. استعمل خاصية التوزيع لحساب الثمن.

حل كل معادلة فيما يأتي : (يستعمل مع الدرس 3-7)

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \quad (12)$$

$$x^2 + 2x - 8 = 0 \quad (11)$$


$$x^2 - x = 0 \quad (14)$$

$$x^2 - x - 20 = 0 \quad (13)$$

(15) **فيزياء:** إذا سقط جسم من ارتفاع 50ft عن سطح الأرض فإن ارتفاعه عن سطحها بعد t ثانية يعبر عنه بالصيغة $h = -16t^2 + 50$. استعمل المعادلة $-16t^2 + 50 = 0$ لحساب الزمن الذي يستغرقه الجسم حتى يصل إلى الأرض.

الأعداد المركبة

Complex Numbers



لماذا؟
بالنظر إلى الشكل المجاور، تلاحظ أن التمثيل البياني للمعادلة $y = x^2 + 2x + 4$ لا يقطع المحور x ، لذا ليس للمعادلة جذور حقيقية، فهل يعني ذلك أنه ليس للمعادلة حلول؟

للتأكد من ذلك استعمل الآلة الحاسبة بالضغط على مفتاح **on**، ومنها اختر **menu** ثم اختر **1 إضافة تطبيق الحاسبة** ثم اضغط **menu** واختر منها **1 مستند جديد** ثم اختر **1 أدوات كثیرات الحدود** ثم اختر **3 العمليات الجبرية** **2: الجذور الحقيقة لكثیرات الحدود**

ثم أدخل $4 + 2x + x^2$ واضغط **enter** فيظهر على الشاشة الكلمة خطأ، وهذا يعني أنه لا توجد حلول حقيقة للمعادلة، ولكن هناك حلول تخيلية.

الأعداد التخيلية البحتة: قادت المعادلات "الالمعادلة السابقة" الرياضيين إلى تعريف الأعداد التخيلية، ووحدتها التخيلية i ، حيث تعرف **الوحدة التخيلية i** على أنها الجذر التربيعي الموجب للعدد -1 ، وبعبارة أخرى فإن $\sqrt{-1} = i$ ، وهذا يعني أن $-1 = i^2$ والأعداد في الصورة $i\sqrt{3}$, i , $-2i$, $6i$, تسمى **أعداداً تخيلية بحثة**، وهي جذور تربيعية لأعداد حقيقة سالبة.

لأي عدد حقيقي موجب مثل b , فإن: $\sqrt{-b^2} = \sqrt{b^2} \cdot \sqrt{-1} = bi$

مثال 1

بسط كلّاً مما يأتي :

$$\begin{aligned} &= \sqrt{-216} \quad (\text{b}) \\ \sqrt{-216} &= \sqrt{-1 \cdot 6^2 \cdot 6} \\ &= \sqrt{-1} \cdot \sqrt{6^2} \sqrt{6} \\ &= i \cdot 6 \cdot \sqrt{6} \\ &= 6i\sqrt{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{-27} \quad (\text{a}) \\ \sqrt{-27} &= \sqrt{-1 \cdot 3^2 \cdot 3} \\ &= \sqrt{-1} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{3} \\ &= i \cdot 3 \cdot \sqrt{3} \\ &= 3i\sqrt{3} \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

$$\sqrt{-125} \quad (\text{1B})$$

$$\sqrt{-18} \quad (\text{1A})$$

تحقق الأعداد التخيلية البحتة كلاً من الخصائص (التجميعية والتبديلية) على الضرب، ويبيّن الجدول الآتي بعض قوى الوحدة التخيلية i :

$i^1 = i$	$i^2 = -1$	$i^3 = i^2 \cdot i = -i$	$i^4 = (i^2)^2 = 1$
$i^5 = (i^2)^2 \cdot i = i$	$i^6 = (i^2)^3 = -1$	$i^7 = (i^2)^3 \cdot i = -i$	$i^8 = (i^2)^4 = 1$

فيما سبق :

درست تبسيط الجذور التربيعية.
(مهارة سابقة)

والآن :

- أجري العمليات على الأعداد التخيلية البحتة.
- أجري العمليات على الأعداد المركبة.

المفردات

الوحدة التخيلية
imaginary unit

العدد التخييلي البحت
pure imaginary number

العدد المركب
complex number

المركبان المترافقان
complex conjugates

ضرب الأعداد التخيلية البحتة

مثال 2

أوجد ناتج كلٌ مما يأتي :

$$-5i \cdot 3i \quad (\text{a})$$

اضرب	$-5i \cdot 3i = -15i^2$
$i^2 = -1$	$= -15(-1)$
بسط	$= 15$

$$\sqrt{-6} \cdot \sqrt{-15} \quad (\text{b})$$

$i = \sqrt{-1}$	$\sqrt{-6} \cdot \sqrt{-15} = i\sqrt{6} \cdot i\sqrt{15}$
اضرب	$= i^2\sqrt{90}$
بسط	$= -1 \cdot \sqrt{9} \cdot \sqrt{10}$
اضرب	$= -3\sqrt{10}$

تحقق من فهمك

$$i^{31} \quad (2C)$$

$$\sqrt{-20} \cdot \sqrt{-12} \quad (2B)$$

$$3i \cdot 4i \quad (2A)$$

إرشادات للدراسة

خصائص الجذر

التربيعي

راجع خصائص الجذر التربيعي التي درستها في الصف الثالث المتوسط.

يمكنك حل بعض المعادلات التربيعية باستعمال خصائص الجذر التربيعي .

معادلة حلولها أعداد تخيلية بحثة

مثال 3

$$\text{حل المعادلة : } 4x^2 + 256 = 0$$

$$\text{المعادلة الأصلية}$$

$$4x^2 + 256 = 0$$

$$\text{اطرح 256 من كلا الطرفين}$$

$$4x^2 = -256$$

$$\text{اقسم كلا الطرفين على 4}$$

$$x^2 = -64$$

$$\text{خاصية الجذر التربيعي}$$

$$x = \pm\sqrt{-64}$$

$$\sqrt{-64} = \sqrt{64} \cdot \sqrt{-1} = 8i$$

$$x = \pm 8i$$

تحقق من فهمك

$$x^2 + 4 = 0 \quad (3B)$$

$$4x^2 + 100 = 0 \quad (3A)$$

العمليات على الأعداد المركبة : تكون العبارة $2+3i$ من حدين غير متشابهين ولا يمكن جمعهما، وهما العدد الحقيقي 2 والعدد التخييلي $3i$ ، ويسمى هذا النوع من العبارات **العدد المركب**.

أضف إلى
مطويتي

الأعداد المركبة (C)

مفهوم أساسى


التعبير اللغطي: العدد المركب هو أي عدد يمكن كتابته على الصورة $a + bi$ ؛ حيث a و b عدادان حقيقيان، و i الوحدة التخيلية، ويسمى a الجزء الحقيقي، و bi الجزء التخييلي.

$$1 - 3i = 1 + (-3)i$$

$$5 + 2i$$

مثالان:

يوضح شكل فن المجاور مجموعة الأعداد المركبة .



- إذا كانت $b = 0$ فإن العدد المركب يكون عدداً حقيقياً.

- إذا كانت $b \neq 0$ فإن العدد المركب يكون عدداً تخيلياً.

- إذا كانت $a = 0, b \neq 0$ فإن العدد المركب يكون عدداً تخيلياً بحثاً.

يتساوى عددان مركبان إذا وفقط إذا تساوى الجزأين الحقيقيين، والجزأين التخيليين؛ أي أن:

$$a = c, b = d \text{ إذا وفقط إذا كان } a + bi = c + di$$

تساوي الأعداد المركبة

مثال 4

أوجد قيمتي x, y الحقيقيتين اللتين يجعلان المعادلة: $7 + 6i = 7 + (y - 3)i = 7 + 3x - 5$ صحيحة.

ساو الجزأين الحقيقيين أحدهما الآخر، وكذلك الجزآن التخيليان.

$$y - 3 = 6 \quad \text{الجزآن التخيليان}$$

$$3x - 5 = 7$$

$$\text{اجمع 3 لكلا الطرفين.} \quad y = 9$$

$$\text{اجمع 5 لكلا الطرفين} \quad 3x = 12$$

$$\text{اقسم لكلا الطرفين على 3} \quad x = 4$$

تحقق من فهنك

(4) أوجد قيمتي x, y الحقيقيتين اللتين يجعلان المعادلة: $5x + 1 + (3 + 2y)i = 2x - 2 + (y - 6)i$ صحيحة.

وي يمكنك استعمال كلٌ من الخاصية التبديلية والخاصية التجميعية وخاصية التوزيع عند جمع الأعداد المركبة وضربها، ولكي تجمع أو تطرح أعداداً مركبة، جمع الأجزاء المشابهة؛ أي جمٌّ الأجزاء الحقيقة معًا وجمٌّ الأجزاء التخيلية معًا.

جمع الأعداد المركبة وطريقها

مثال 5

أوجد ناتج كلٌ مما يأتي :

$$(5 - 7i) + (2 + 4i) \quad (\text{a})$$

$$(5 - 7i) + (2 + 4i) = (5 + 2) + (-7 + 4)i$$

بسط

$$= 7 - 3i$$

$$(4 - 8i) - (3 - 6i) \quad (\text{b})$$

$$(4 - 8i) - (3 - 6i) = (4 - 3) + [-8 - (-6)]i$$

بسط

$$= 1 - 2i$$

تحقق من فهنك

$$(4 + 6i) - (-1 + 2i) \quad (\text{5B})$$

$$(-2 + 5i) + (1 - 7i) \quad (\text{5A})$$

إرشادات للدراسة

العواقة :

في الأعداد المركبة

تستعمل كلمة العواقة

بدلًا من المقاومة.

تستعمل الأعداد المركبة في مسائل الكهرباء، ففي الدوائر الكهربائية ذات التيار المتناوب يمكنك تمثيل فرق الجهد، وشدة التيار، والعواقة بأعداد مركبة، ولضرب هذه الأعداد تستعمل طريقة التوزيع بالترتيب.



ضرب الأعداد المركبة

مثال 6 من واقع الحياة

كهرباء: يرتبط فرق الجهد V ، وشدة التيار C ، والمعاوقة I في الدوائر الكهربائية ذات التيار المتناوب بالصيغة $V = C \cdot I$. أوجد فرق الجهد في دائرة كهربائية ذات تيار متعدد إذا كانت شدة تيارها $i = 2 + 3i$ أمبير، ومعاوقتها $3 - 9i$ أوم.



الربط مع الحياة

مصابيح الزينة من الأمثلة على الدوائر الكهربائية الموصولة على التوالى، ويؤثر عدد المصابيح فيها في شدة التيار، فينعكس هذا على شدة الإضاءة.

$$\begin{aligned}
 \text{الصيغة الرياضية} \quad & V = C \cdot I \\
 C = 2 + 4i, I = 9 - 3i \quad & = (2 + 4i) \cdot (9 - 3i) \\
 \text{باستخدام طريقة التوزيع بالترتيب} \quad & = 2(9) + 2(-3i) + 4i(9) + 4i(-3i) \\
 \text{اضرب} \quad & = 18 - 6i + 36i - 12i^2 \\
 i^2 = -1 \quad & = 18 + 30i - 12(-1) \\
 \text{اجمع} \quad & = 30 + 30i \\
 \text{وعليه فإن فرق الجهد هو } & 30i + 30 \text{ فولت.}
 \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

(6) **كهرباء:** أوجد فرق الجهد لتيار متناوب شدته $i = 4 - 2i$ أمبير، ومعاوقته $2 + 3i$ أوم.

يسمى العددان المركبان $a + bi$ ، $a - bi$ مركبين مترافقين، وناتج ضربهما هو عدد حقيقي دائمًا على الصورة $a^2 + b^2$. ويمكنك استعمال هذه الحقيقة لإيجاد ناتج قسمة عددين مركبين.

قسمة الأعداد المركبة

مثال 7

أوجد ناتج كلٌ مما يأتي:

$$\begin{aligned}
 \frac{2i}{3+6i} \quad (\text{a}) \quad & \frac{2i}{3+6i} = \frac{2i}{3+6i} \cdot \frac{3-6i}{3-6i} \\
 & = \frac{6i - 12i^2}{9 - 36i^2} \\
 & = \frac{6i - 12(-1)}{9 - 36(-1)} \\
 & = \frac{6i + 12}{45} \\
 & = \frac{4}{15} + \frac{2}{15}i \\
 \frac{4+i}{5i} \quad (\text{b}) \quad & \frac{4+i}{5i} = \frac{4+i}{5i} \cdot \frac{i}{i} \\
 & = \frac{4i + i^2}{5i^2} \\
 & = \frac{4i - 1}{-5} \\
 & = \frac{1}{5} - \frac{4}{5}i
 \end{aligned}$$

إرشادات للدراسة

قراءة الرياضيات
يمكنك حل الفرع b من المثال 7 بضرب كل من البسط والمقام في العدد $-5i$ ، ولكن للاختصار تم الضرب في العدد i فقط.

تحقق من فهمك



أوجُد ناتج كُلّ ممَا يأتِي:

$\sqrt{-32}$ (2)

$\sqrt{-81}$ (1)

المثالان 2 ، 1

$3\sqrt{-24} \cdot 2\sqrt{-18}$ (4)

$(4i)(-3i)$ (3)

i^{63} (6)

i^{40} (5)

حُلَّ كُلَّ معادلة ممَا يأتِي :

$2x^2 + 24 = 0$ (8)

$4x^2 + 32 = 0$ (7)

مثال 3

في كُلَّ معادلة ممَا يأتِي أوجُد قيمَي a ، b الحقيقيتين اللتين تجعلانها صحيحة :

$4b - 5 + (-a - 3)i = 7 - 8i$ (10)

$3a + (4b + 2)i = 9 - 6i$ (9)

مثال 4

بَسْط كُلَّا ممَا يأتِي :

$(7 + 4i) - (1 + 2i)$ (12)

$(-1 + 5i) + (-2 - 3i)$ (11)

الأمثلة 5 ، 6 ، 7

$(3 + 2i)(-2 + 4i)$ (14)

$(6 - 8i)(9 + 2i)$ (13)

$\frac{2+i}{5+6i}$ (16)

$\frac{3-i}{4+2i}$ (15)

(17) كهرباء : تبلغ شدة التيار في أحد أجزاء دائرة كهربائية موصولة على التوالي $3i - 5$ أمبير، وفي الجزء الآخر من الدائرة $i + 7$ أمبير. اجمع هذين العددين المركبين لإيجاد شدة التيار الكلية في الدائرة.

تدريب وحل المسائل

أوجُد ناتج كُلَّ ممَا يأتِي :

$\sqrt{-169}$ (19)

$\sqrt{-121}$ (18)

المثالان 2 ، 1

$\sqrt{-75}$ (21)

$\sqrt{-100}$ (20)

$4i(-6i)^2$ (23)

$(-3i)(-7i)(2i)$ (22)

i^{25} (25)

i^{11} (24)

$4i\left(\frac{1}{2}i\right)^2(-2i)^2$ (27)

$\sqrt{-10} \cdot \sqrt{-24}$ (26)

حُلَّ كُلَّ معادلة ممَا يأتِي :

$3x^2 + 48 = 0$ (29)

$4x^2 + 4 = 0$ (28)

مثال 3

$6x^2 + 108 = 0$ (31)

$2x^2 + 10 = 0$ (30)

في كُلَّ معادلة ممَا يأتِي أوجُد قيمَي x ، y الحقيقيتين اللتين تجعلانها صحيحة :

$2x + 7 + (3 - y)i = -4 + 6i$ (33)

$x + 1 + 2yi = 3 - 6i$ (32)

مثال 4



$(2x - 4y)i + x + 5y = 15 + 58i$ (35)

$5 + y + (3x - 7)i = 9 - 3i$ (34)

أوجُد ناتج كُلٌّ مما يأتي :

$$(11 - 8i) - (2 - 8i) \quad (37)$$

$$(-3 + i) + (-4 - i) \quad (36)$$

الأمثلة 5 , 6 , 7

$$(3 + 5i)(5 - 3i) \quad (39)$$

$$(1 + 2i)(1 - 2i) \quad (38)$$

$$\frac{2i}{1+i} \quad (41)$$

$$(4 - i)(6 - 6i) \quad (40)$$

$$\frac{5+i}{3i} \quad (43)$$

$$\frac{5}{2+4i} \quad (42)$$

$$(8 - 5i) - (7 + i) \quad (45)$$

$$(4 - 6i) + (4 + 6i) \quad (44)$$

$$(1 + i)(2 + 3i)(4 - 3i) \quad (47)$$

$$(-6 - i)(3 - 3i) \quad (46)$$

$$\frac{2 - i\sqrt{3}}{2 + i\sqrt{3}} \quad (49)$$

$$\frac{4 - i\sqrt{2}}{4 + i\sqrt{2}} \quad (48)$$

- (50) **كهرباء :** تبلغ المعاوقة في أحد أجزاء دائرة كهربائية $7 + 8i$ أوم، وفي الجزء الآخر منها $4i - 13$ أوم. اجمع هذين العددين المركبين لإيجاد المعاوقة الكلية في الدائرة الكهربائية.

كهرباء : استعمل الصيغة $V = C \cdot I$ ، حيث V فرق الجهد، و C شدة التيار، و I المعاوقة في

حل السؤالين 51 ، 52 :

- (51) إذا كانت شدة التيار في دائرة كهربائية $6i + 3$ أمبير، والمعاوقة $i - 5$ أوم ، فكم يكون فرق الجهد ؟

- (52) إذا كان فرق الجهد في دائرة كهربائية $12i - 20$ فولت، والمuaوقة $4i - 6$ أوم ، فكم تكون شدة التيار ؟

$$(53) \text{ أوجُد ناتج جمع } 7 + 3x^2 + (2 + 6i)x - 8i \text{ إلى } ix^2 - (4 + 5i)x + 7 .$$

$$(54) \text{ بسط العبارة: } [(2 + i)x^2 - ix + 5 + i] - [(-3 + 4i)x^2 + (5 - 5i)x - 6]$$



الربط مع الحياة

الكهرباء هي عدد من التأثيرات الفيزيائية تشمل مجموعة متنوعة من الظواهر الناتجة عن وجود شحنة كهربائية وتدفقها. وتضم هذه الظواهر: البرق، والكهرباء الساكنة، والمجال وال卉 الكهرومغناطيسيين.

- (55) **تمثيلات متعددة :** ستكتشف في هذه المسألة جمع الأعداد المركبة في المستوى المركب. فالمستوى المركب يشبه إلى حد بعيد المستوى الحقيقي، وفيه تكون الأعداد الحقيقة على المحور الأفقي والأعداد التخيلية البحتة على المحور الرأسى.

- a) **بيانياً :** مثل العدد $4i + 3$ بيانياً في المستوى المركب، وذلك برسم قطعة مستقيمة من نقطة الأصل إلى النقطة $(3, 4)$ ، وسُمِّ تلك النقطة A .

- b) **بيانياً :** مثل العدد $5i - 2$ بيانياً في المستوى المركب وذلك برسم قطعة مستقيمة من نقطة الأصل إلى النقطة $(-2, -5)$ ، وسُمِّها B .

- c) **بيانياً :** إذا كانت النقطتان A, B ونقطة الأصل ثلاثة رؤوس لمتوازي أضلاع فأكمل رسمه بإضافة النقطة الرابعة C .

- d) **تحليلياً :** ما العدد المركب الذي تمثله النقطة C ؟ وما العلاقة بين النقاط A, B, C ؟



مسائل مهارات التفكير العليا

(56) **اكتشف الخطأ:** قامت كلٌّ من صفاء ومنال بتبسيط $(2i)(3i)(4i)$ ، فأيُّ منها على صواب؟ ووضح إجابتك.

منال

$$24i^3 = -24$$

صفاء

$$24i^3 = -24i$$

(57) **تحدد:** بسط العدد المركب $(1 + 2i)^3$.

(58) **تبرير:** حدد إذا كانت الجملة الآتية صحيحة دائمًا، أو صحيحة أحياناً، أو غير صحيحة أبداً. وضح إجابتك:

"يتكون كل عدد مركب من جزء حقيقي وجزء تخيلي"

(59) **مسألة مفتوحة:** اكتب عددين مركبين يكون ناتج ضربهما يساوي 20.

(60) **اكتب:** وضح كيف ترتبط الأعداد المركبة بالمعادلات التربيعية، وكيف تحدد إذا كان للمعادلة التربيعية حلول مركبة فقط أم لا؟

تدريب على اختبار

(62) قيمة $(3 + 6i)^2$ تساوي:

36 – 27i (A)

9 + 36 (B)

9 – 36 (C)

–27 + 36i (D)

(61) ما قيمتا x, y الحقيقيتان اللتان تجعلان $(5 + 4i) - (x+yi) = (-1-3i)$ صحيحة؟

$x = 6, y = 7$ (A)

$x = 4, y = i$ (B)

$x = 4, y = i$ (C)

$x = 4, y = 7$ (D)

مراجعة تراكمية

حلَّ كُلَّ معادلة مما يأتي مستعملاً التحليل إلى العوامل: (مهارة سابقة)

$$6x^2 = 5x + 4 \quad (65)$$

$$4x^2 - 12 = 22x \quad (64)$$

$$2x^2 + 7x = 15 \quad (63)$$

نظريَّة الأعداد: استعمل معادلة تربيعية لإيجاد عددين حقيقيين يحققان كلاً ممَّا يأتي، (إذا كان ذلك ممكناً): (مهارة سابقة)

$$(67) \text{مجموعهما } -3, \text{ وناتج ضربهما } 40.$$

$$(66) \text{مجموعهما } 21, \text{ وناتج ضربهما } -108.$$

هل تمثل كُلَّ من ثلاثيات الحدود الآتية مربعاً كاملاً أم لا؟ (مهارة سابقة)

$$x^2 - 12x + 36 \quad (69)$$

$$x^2 + 16x + 64 \quad (68)$$

$$x^2 + 5x + 6.25 \quad (71)$$

$$x^2 + 8x - 16 \quad (70)$$





3-2

القانون العام والمميز

The Quadratic Formula and the Discriminant

المادة:



أطلق سهم نحو هدف على الأرض، ويمكن التعبير عن ارتفاعه عن الأرض بالدالة التربيعية:

$$h = -4.9t^2 + 117t + 42$$

حيث h ارتفاع السهم بعد t ثانية من إطلاقه، وللتنبؤ بالزمن اللازم لوصول السهم إلى الهدف، نحل المعادلة:

$$-4.9t^2 + 117t + 42 = 0$$

ومن الصعب حل هذه المعادلة باستعمال التحليل إلى العوامل، أو التمثيل البياني، أو إكمال المربع.

فيما سبق:

درست حل معادلات تربيعية
بإكمال المربع.
(مهارة سابقة)

والآن:

- أحل معادلات تربيعية باستعمال القانون العام.
- استعمل المميز لأحدد عدد جذور معادلة تربيعية وأنواعها.

المفردات

القانون العام

Quadratic Formula

المميز

discriminant

القانون العام: تمكنت سابقاً من حل بعض المعادلات التربيعية بالتمثيل البياني، أو بالتحليل إلى العوامل، أو باستعمال خاصية الجذر التربيعي، أو بإكمال المربع، أو باستعمال القانون العام؛ وهو قانون يمكن استعماله لحل أي معادلة تربيعية، ويمكن استناد هذا القانون من خلال حل معادلة تربيعية على الصورة القياسية.

مثال

الحالة العامة

$$2x^2 + 8x + 1 = 0$$

معادلة تربيعية على الصورة القياسية

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x^2 + 4x + \frac{1}{2} = 0$$

اقسم كلا الطرفين على a

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + 4x = -\frac{1}{2}$$

اطرح $\frac{c}{a}$ من كلا الطرفين

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

$$x^2 + 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = -\frac{1}{2} + \left(\frac{4}{2}\right)^2$$

أكمل المربع

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$(x + 2)^2 = -\frac{1}{2} + \left(\frac{4}{2}\right)^2$$

حل الطرف الأيسر

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

$$(x + 2)^2 = \frac{7}{2}$$

بسط الطرف الأيمن

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$x + 2 = \pm \sqrt{\frac{7}{2}}$$

خاصية الجذر التربيعي

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = -2 \pm \sqrt{\frac{7}{2}}$$

اطرح $\frac{b}{2a}$ من كلا الطرفين

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{14}}{2}$$

بسط

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

تعرف المعادلة: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ بالقانون العام لحل المعادلات التربيعية.

التعبير اللغطي: يمكن حل المعادلة التربيعية المكتوبة على الصورة: $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ باستعمال القانون:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x^2 + 5x + 6 = 0 \rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(1)(6)}}{2(1)}$$

مثال:

القانون العام

على الرغم من أن طريقة التحليل إلى العوامل قد تكون الأسهل لحل بعض المعادلات التربيعية، إلا أن القانون العام يحل أي معادلة تربيعية.

معادلة لها جذران نسبيان

مثال 1

حل المعادلة: $x^2 - 10x = 11$ باستعمال القانون العام.

أولاً اكتب المعادلة على الصورة $0 = ax^2 + bx + c$ ، وحدد قيم كل من a, b, c .

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ \downarrow &\quad \downarrow &\quad \downarrow \\ x^2 - 10x &= 11 \end{aligned} \rightarrow \quad 1x^2 - 10x - 11 = 0$$

ثم عوض بعد ذلك بتلك القيم في القانون العام.

القانون العام

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

عوض عن: a بالعدد 1، b بالعدد -10، c بالعدد -11.

$$= \frac{-(-10) \pm \sqrt{(-10)^2 - 4(1)(-11)}}{2(1)}$$

اضرب

$$= \frac{10 \pm \sqrt{100 + 44}}{2}$$

بسط

$$= \frac{10 \pm \sqrt{144}}{2}$$

$\sqrt{144} = 12$

$$= \frac{10 \pm 12}{2}$$

اكتب x على صورة معادلتين

$$x = \frac{10 - 12}{2} \quad \text{أو} \quad x = \frac{10 + 12}{2}$$

بسط

$$= -1 \quad = 11$$

وعليه يكون الحالن هما: 11، -1.

تحقق: عرض كلتا القيمتين في المعادلة الأصلية.

$$\begin{aligned} x^2 - 10x &= 11 & x^2 - 10x &= 11 \\ (11)^2 - 10(11) &\stackrel{?}{=} 11 & (-1)^2 - 10(-1) &\stackrel{?}{=} 11 \\ 121 - 110 &\stackrel{?}{=} 11 & 1 + 10 &\stackrel{?}{=} 11 \\ \checkmark \quad 11 &= 11 & \checkmark \quad 11 &= 11 \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

$2x^2 + 25x + 33 = 0$ (1B)


$x^2 + 6x = 16$ (1A)



تاریخ الیاضیات

براهام جوبتا

(598-668 م) عالم ریاضیات هندی، وهو أول من أوجد حلًا عامًا للمعادلة التربيعية في الصورة $ax^2 + bx = c$ ، وهو ما يُسمى الآن القانون العام لحل المعادلة التربيعية.



[−10, 10] scl: 1 by [−6.67, 6.67] scl: 1

مثال 2

معادلة لها جذر نسبي واحد (مكرر مرتين)

حُلَّ المعادلة: $0 = x^2 + 8x + 16$ باستعمال القانون العام .
حدُّد قيم كلٍّ من a, b, c ، وعوّض هذه القيم في القانون العام .

$$\text{القانون العام} \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

عُوض عن a بالعدد 1، وعن b بالعدد 8، وعن c بالعدد 16

$$= \frac{-(8) \pm \sqrt{(8)^2 - 4(1)(16)}}{2(1)}$$

بسط

$$= \frac{-8 \pm \sqrt{0}}{2}$$

$$\sqrt{0} = 0$$

$$= \frac{-8}{2} = -4$$

الحل هو 4 - (مكرر مرتين) .

تحقق: تحقق من صحة الحل بتمثيل الدالة المرتبطة بالمعادلة $y = x^2 + 8x + 16$ بيانياً. مستعملاً خاصية الصفر في الحاسبة البينية للحصول على قيمة صفر الدالة المرتبطة وهو: $x = -4$.

تحقق من فهمك

$$x^2 + 34x + 289 = 0 \quad (2B)$$

$$x^2 - 16x + 64 = 0 \quad (2A)$$

يمكنك التعبير عن الجذور غير النسبية بكتابتها في الصورة الجذرية .

الجذور غير النسبية

مثال 3

حُلَّ المعادلة: $0 = 2x^2 + 6x - 7 = 0$ باستعمال القانون العام .

$$\text{القانون العام} \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

عُوض عن a بالعدد 2، وعن b بالعدد 6، وعن c بالعدد -7

$$= \frac{-(6) \pm \sqrt{(6)^2 - 4(2)(-7)}}{2(2)}$$


بسط

$$= \frac{-6 \pm \sqrt{92}}{4}$$

$$\sqrt{92} = \sqrt{4(23)} = 2\sqrt{23}$$

$$= \frac{-6 \pm 2\sqrt{23}}{4} = \frac{-3 \pm \sqrt{23}}{2}$$

الحالان التقريريَان هما: 0.9 ، -3.9



[−10, 10] scl: 1 by [−15, 7] scl: 1

إرشادات للدراسة

إظهار كامل التمثيل

البيانِي:

لإظهار التمثيل البياني للدالة كاملاً على الشاشة.

اضغط مفتاح ومنها

اختر 4: تكبير/تصغير النافذة

ثم اختر 1: إعدادات النافذة

لتحدد التدرج المناسب

للمتغير فاختر مثلاً

القيمة الصفرى 15

القيمة العائلى 7

و

تحقق من فهمك

$$x^2 - 8x + 9 = 0 \quad (3B)$$

$$3x^2 + 5x + 1 = 0 \quad (3A)$$



الأعداد المركبة
تذكّر أن تكتب حلّك
في الصورة $a + bi$
وهذه الصورة تُسمى
الصورة القياسيّة للعدد
المركب.

مثال 4 الجذور المركبة

حُلّ المعادلة: $-x^2 - 6x - 10 = 0$ باستعمال القانون العام.

$$\text{القانون العام} \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\text{عُوض عن } a \text{ بالعدد 1 ، وعن } b \text{ بالعدد 6} , \text{ وعن } c \text{ بالعدد 10}$$

$$= \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(1)(10)}}{2(1)}$$


$$\text{بسط} \quad = \frac{6 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$\sqrt{-4} = \sqrt{4 \cdot (-1)} = 2i$$

$$= \frac{6 \pm 2i}{2}$$

$$\text{بسط} \quad = 3 \pm i$$

الحالان هما: $i + 3$ و $i - 3$ وهما عدوان مركبان متراافقان.



تحقق: يظهر التمثيل البياني للدالة المرتبطة بالمعادلة أن الحلّين عدوان مركبان، ولكن لا يساعدك التمثيل البياني على إيجادهما. وللحصول على صحة الحلّين المركبين، عُوضهما في المعادلة الأصلية.

المعادلة الأصلية

$$x^2 - 6x = -10$$

$$x = 3 + i$$

$$(3 + i)^2 - 6(3 + i) \stackrel{?}{=} -10$$

أُوجد مفكوك $(3 + i)^2$ وخاصية التوزيع

$$9 + 6i + i^2 - 18 - 6i \stackrel{?}{=} -10$$

بسط

$$-9 + i^2 \stackrel{?}{=} -10$$

$$i^2 = -1$$

$$\checkmark -9 - 1 = -10$$

المعادلة الأصلية

$$x^2 - 6x = -10$$

$$x = 3 - i$$

$$(3 - i)^2 - 6(3 - i) \stackrel{?}{=} -10$$

أُوجد مفكوك $(3 - i)^2$ وخاصية التوزيع

$$9 - 6i + i^2 - 18 + 6i \stackrel{?}{=} -10$$

بسط.

$$-9 + i^2 \stackrel{?}{=} -10$$

$$i^2 = -1$$

$$\checkmark -9 - 1 = -10$$

تحقق من فهمك

$$x^2 - 4x = -13 \quad (4B)$$

$$3x^2 + 5x + 4 = 0 \quad (4A)$$

الجذور والمميز: في المعادلة التربيعية، لاحظ العلاقة بين قيمة ما تحت الجذر وجذور المعادلة التربيعية في الأمثلة السابقة. العبارة $4ac - b^2$ تُسمى **المميز**.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \leftarrow \text{المميز}$$


ويمكنك استعمال المميز لتحديد عدد جذور المعادلة التربيعية وأنواعها، والجدول في الصفحة الآتية يلخص الأنواع الممكنة للجذور، وذلك للتأكد من صحة حلّك.



مفهوم أساسى

المميز

في المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ ، حيث a, b, c أعداد نسبية، $a \neq 0$.

مثال على التمثيل البياني للدالة المرتبطة بالمعادلة	عدد الجذور وأنواعها	قيمة المميز
	جذران حقيقيان نسبيان	$b^2 - 4ac > 0$ والعبارة $b^2 - 4ac$ مربع كامل.
	جذران حقيقيان غير نسبيان	$b^2 - 4ac > 0$ والعبارة $b^2 - 4ac$ ليست مربعاً كاملاً.
	جذر حقيقي مكرر مرتين	$b^2 - 4ac = 0$
	جذران مركبان متراافقان	$b^2 - 4ac < 0$

إرشادات للدراسة

الجذور

تذكر أن حلول المعادلة تسمى جذوراً وهي قيم x التي يقطع عندها التمثيل البياني للدالة المرتبطة بالمعادلة المحسوبة على المحور x .

مثال 5 وصف الجذور

أوجد قيمة المميز لكل من المعادلين التربيعيتين الآتيتين ، وحدد عدد جذور كلّ منها وأنواعها:

$$x^2 + 22x + 121 = 0 \quad (\text{b})$$

$$a = 1, b = 22, c = 121$$

$$b^2 - 4ac = (22)^2 - 4(1)(121)$$

$$= 484 - 484$$

$$= 0$$

المميز يساوي صفرًا؛ لذا يوجد

جذر حقيقي واحد مكرر مرتين.

$$7x^2 - 11x + 5 = 0 \quad (\text{a})$$

$$a = 7, b = -11, c = 5$$

$$b^2 - 4ac = (-11)^2 - 4(7)(5)$$

$$= 121 - 140$$

$$= -19$$

المميز سالب؛ لذا يوجد

جذران مركبان متراافقان.

تحقق من فهتمك

$$-7x + 15x^2 - 4 = 0 \quad (\text{5B})$$

$$-5x^2 + 8x - 1 = 0 \quad (\text{5A})$$



درست فيما سبق طرائق مختلفة لحل المعادلات التربيعية، والجدول أدناه يلخص تلك الطرائق.

ملخص المفهوم		
حالات استعمالها	إمكانية استعمالها	الطريقة
عندما لا يطلب إيجاد الحل الدقيق، وأفضل استعمال لها عند التحقق من معقولة الحلول التي يتم إيجادها بالطرائق الجبرية.	أحياناً	التمثيل البياني
عندما يساوي الحد الثابت صفرًا مثال: $x^2 - 7x = 0$ أو عندما يكون من السهل إيجاد العوامل. مثال: $x^2 - 5x + 6 = 0$	أحياناً	التحليل إلى العوامل
مع المعادلات المكتوبة على صورة مربع كامل يساوي ثابتاً. مثال: $(x - 5)^2 = 18$	أحياناً	خاصية الجذر التربيعي
مع المعادلات المكتوبة على الصورة: $x^2 + bx + c = 0$ مثال: $x^2 + 6x - 14 = 0$	دائماً	إكمال المربع
عندما لا يمكن استعمال بقية الطرائق أو عندما يكون من الصعب استعمالها. مثال: $2.3x^2 - 1.8x + 9.7 = 0$	دائماً	القانون العام

تأكد

حُلَّ كُلَّ معادلة مما يأتي باستعمال القانون العام:

$$x^2 + 8x + 5 = 0 \quad (2)$$

$$x^2 + 12x - 9 = 0 \quad (1)$$

الأمثلة 1,4

$$9x^2 + 6x - 4 = 0 \quad (4)$$

$$4x^2 - 5x - 2 = 0 \quad (3)$$

$$22x = 12x^2 + 6 \quad (6)$$

$$10x^2 - 3 = 13x \quad (5)$$

$$x^2 + 3 = -6x + 8 \quad (8)$$

$$-3x^2 + 4x = -8 \quad (7)$$

مثال 5

أجب عن الفرعين a ، b لـ كُلَّ معادلة تربيعية مما يأتي:

(a) أوجد قيمة المميز.

(b) أوجد عدد الجذور، وحدد أنواعها.

$$2x^2 - 6x + 9 = 0 \quad (10)$$

$$3x^2 + 8x + 2 = 0 \quad (9)$$

$$5x^2 + 2x + 4 = 0 \quad (12)$$

$$-16x^2 + 8x - 1 = 0 \quad (11)$$



حُلَّ كُلَّ معادلة مما يأتي باستعمال القانون العام:

$$4x^2 - 6 = -12x \quad (14)$$

$$x^2 + 45x = -200 \quad (13)$$

الأمثلة 1,4

$$12x^2 + 9x - 2 = -17 \quad (16)$$

$$5x^2 - 9 = 11x \quad (15)$$

أجب عن الفرعين a ، b لكلٌّ معادلة تربيعية مما يأتي:

(a) أوجد قيمة المميز.

مثال 5

(b) أوجد عدد الجذور، وحدد أنواعها.

$$2x^2 + 4x + 7 = 0 \quad (19)$$

$$3x^2 - 3x + 8 = 0 \quad (18)$$

$$2x^2 + 3x - 3 = 0 \quad (17)$$

$$x^2 + 2x - 4 = -9 \quad (22)$$

$$x^2 - 6x = -9 \quad (21)$$

$$-5x^2 + 4x + 1 = 0 \quad (20)$$

$$8x^2 = -2x + 1 \quad (25)$$

$$5x^2 + 8x = 0 \quad (24)$$

$$-6x^2 + 5 = -4x + 8 \quad (23)$$

$$0.6x^2 + 1.4x = 4.8 \quad (28)$$

$$0.8x^2 + 2.6x = -3.2 \quad (27)$$

$$4x - 3 = -12x^2 \quad (26)$$

العام	عدد الإصابات لكل 100000
2000	92
2002	90
2004	85
2010	?
2017	?

(29) **التدخين:** تبذل دول العالم جهوداً مكثفة للتوعية بأنحطاط التدخين، وقد أثمرت عن تناقص أعداد المدخنين. وفي إحدى البلدان أجريت دراسة حول الإصابات بمرض سرطان الرئة بين كل 100000 شخص في بعض الأعوام، وكانت نتائجها التقريرية كما في الجدول المجاور. ويمكن تمثيل العدد التقريري للمصابين بالدالة $y = -0.26x^2 - 0.55x + 91.81$ ، حيث x عدد السنوات بعد عام 2000.



الربط مع الحياة

تأسس برنامج مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية في 23/2/1423هـ؛ لمكافحة التدخين بكافة أنواعه ووسائله. ويقدم خدماته في كافة المجالات التوعوية والعلمية والاستشارية المتعلقة بالتدخين وأضراره وطرق مكافحته في مدن ومحافظات المملكة.

المصدر: البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة www.moh.gov.sa/depts/TCP/Pages/About.aspx

(30) **نظرية الأعداد:** يعطى مجموع الأعداد الصحيحة المتتالية $n, n-1, n-2, \dots, 1$ بالقانون

$$S = \frac{1}{2}n(n+1).$$

أ) احسب عدد المصابين بسرطان الرئة لكل 100000 شخص في عامي 2017, 2010 .

ب) استعمل القانون العام لإيجاد قيمة x عندما $y = 50$.

ج) اعتماداً على الدالة التربيعية، متى يصبح معدل الإصابة يساوي صفرًا؟ وهل هذا التوقع معقول؟ فسر إجابتك.

(31) **تر فيه:** يُعطي ارتفاع لعبة تر فيهية عن سطح الأرض وهي تتحرك بسرعة تصل إلى 80 ft/s بالدالة:

$h = -16t^2 - 64t + 60$ ، حيث t الارتفاع بالأقدام، و t الزمن بالثاني. فإذا علمت أنها ترتفع مسافة 60 ، فما الزمن الذي يستغرقه هبوطها من ارتفاع 60 إلى 0 ft



مسائل مهارات التفكير العليا

(32) **اكتشف الخطأ:** حددت كُل من هدى وندي عدد حلول للمعادلة $7 = 5x - 3x^2$. فمن منهما إجابتها صحيحة؟ وُضِّح إجابتك.

ندي	هدى
$3x^2 - 5x = 7$	$3x^2 - 5x = 7$
$b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4(3)(7)$	$3x^2 - 5x - 7 = 0$
$= -59$	$b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4(3)(-7)$
وبما أن المميز سالب فلا توجد للمعادلة حلول حقيقية.	$= 109$
	وبما أن المميز موجب فلهذه المعادلة حلان حقيقيان.

(33) **تحدد:** حل المعادلة $0 = 4ix^2 - 4ix + 5i$ باستعمال القانون العام.

(34) **تبسيط:** حدد ما إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحة دائمًا أو صحيحة أحياناً أو غير صحيحة أبداً.

وُضِّح إجابتك:

(a) إذا كانت إشارتا كُل من المعاملين a, c في المعادلة التربيعية المكتوبة على الصورة القياسية مختلفتين، فإن جذري المعادلة حقيقيان.

(b) إذا كان مميز المعادلة التربيعية أكبر من 1، فإن لها جذرين حقيقيين غير نسبيين.

(35) **اكتب:** صف ثالث طرائق مختلفة لحل المعادلة: $0 = 15 - 2x - x^2$. وأيها تفضل؟ ولماذا؟

تدريب على اختبار

(36) أي المعادلات الآتية لها جذر حقيقي مكرر مرتين؟

- 64 A
- 8 B
- 8 C
- 64 D

$x^2 - 2x + 5 = 0$ A

$x^2 - 2x - 5 = 0$ B

$x^2 = 19$ C

$x^2 - 8x = -16$ D

مراجعة تراكمية

أوجد قيمة c التي تجعل كل ثلاثة حدود مما يأتي مربعاً كاملاً. ثم اكتبها على صورة مربع كامل: (مهارة سابقة)

$x^2 + \frac{4}{5}x + c$ (40)

$x^2 + 2.4x + c$ (39)

$x^2 + 13x + c$ (38)

بسط كلاً مما يأتي: (الدرس 3-1)

$(4\sqrt{-9}) \cdot (2\sqrt{-25})$ (43)

$\sqrt{-16}$ (42)

i^{26} (41)



3-2 مجموع الجذريين وحاصل ضربهما



رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

الهدف

أكتب المعادلة

التربيعية بمعرفة

مجموع جذريها

حاصل ضربهما.

إذا علمت جذري معادلة تربيعية فإنه يمكنك كتابتها باستعمال مجموع جذريها وحاصل ضربهما.

للمعادلة التربيعية: $0 = x^2 + 5x - 24$ جذران هما -8 ،

ومجموعهما 5 ، وحاصل ضربهما -24 .

مجموع الجذريين:

$$x^2 + 5x - 24 = 0$$

$$-24 \text{ هو الحد الثابت}$$

$$3 + (-8) = -5$$

$$3 + (-8) = -5$$

$$\text{حاصل ضرب الجذريين: } 3 \cdot (-8) = -24$$

ويمكن تعميم ذلك لأية معادلة تربيعية باستعمال القانون العام لحل المعادلة التربيعية، فإذا كان جذراً المعادلة

التربيعية r_1, r_2 فإن:

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

مجموع الجذريين

$$r_1 + r_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

بسط

$$= \frac{-2b + 0}{2a} = -\frac{b}{a}$$

مجموع الجذريين:

$$\text{مجموع الجذريين يساوي } -\frac{b}{a}$$

اضرب الجذريين

$$r_1 \cdot r_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

حاصل ضرب الجذريين

$$= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2}$$

$$= \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2}$$

بسط

$$= \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

$$\text{حاصل ضرب الجذريين يساوي } \frac{c}{a}$$

مما سبق يمكن التوصل للقانون الآتي الذي يستعمل لكتابة أية معادلة تربيعية عُلِّم جذراها.

أضف إلى
مطويتك

مجموع جذري معادلة وحاصل ضربهما

مفهوم أساسى

إذا كان r_1, r_2 جذري المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$. $a \neq 0$

$$\cdot r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}, \quad r_1 \cdot r_2 = \frac{c}{a}$$



النشاط 1

استعمال مجموع جذريين وحاصل ضربهما

اكتب المعادلة التربيعية التي جذراها -2 ، -7 .

الخطوة 1 : أوجد مجموع الجذريين:

$$\begin{aligned} r_1 + r_2 &= 2 + (-7) \\ &= -5 \end{aligned}$$

الخطوة 2 : أوجد حاصل ضرب الجذريين:

$$\begin{aligned} r_1 \cdot r_2 &= 2 \cdot (-7) \\ &= -14 \end{aligned}$$

الخطوة 3 : اكتب المعادلة:

بما أن $b = 5$ ، $c = -14$ ، فإذا كانت $a = 1$ فإن:

وبالتالي المعادلة: $x^2 + 5x - 14 = 0$ تتحقق المطلوب.

النشاط 2

استعمال مجموع جذريين وحاصل ضربهما

اكتب المعادلة التربيعية التي جذراها $\frac{3}{4}$ ، $-\frac{12}{5}$.

الخطوة 1 : أوجد حاصل ضرب الجذريين:

$$\begin{aligned} r_1 \cdot r_2 &= \frac{3}{4} \left(-\frac{12}{5} \right) \\ &= -\frac{36}{20} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \text{أوجد مجموع الجذريين:} \\ r_1 + r_2 &= \frac{3}{4} + \left(-\frac{12}{5} \right) \\ &= \frac{15}{20} - \frac{48}{20} = -\frac{33}{20} \end{aligned}$$

الخطوة 3 : اكتب المعادلة:

بما أن $b = -33$ ، $c = -\frac{33}{20}$ ، فإذا كانت $a = 20$ فإن:

وبالتالي المعادلة: $20x^2 + 33x - 36 = 0$ تتحقق المطلوب.

تمارين:

اكتب المعادلة التربيعية التي جذراها العددان المعطيان في كل مما يأتي:

$$4 \pm \sqrt{3} \quad (4) \qquad \pm \frac{2}{5} \quad (3) \qquad -7, \frac{2}{3} \quad (2) \qquad -\frac{3}{4}, \frac{5}{8} \quad (1)$$

$$\overline{5} \pm 8i \quad (8) \qquad 7 \pm 3i \quad (7) \qquad \frac{-2 \pm 3\sqrt{5}}{7} \quad (6) \qquad 1 \pm \sqrt{6} \quad (5)$$

اكتب المعادلة التربيعية التي تحقق كلاً مما يأتي:

$$(10) \text{ مجموع جذريها } 4 \text{ ، وحاصل ضربهما } \frac{5}{21} .$$





العمليات على كثيرات الحدود

Operations with Polynomials

3-3

فيما سبق:

درست إيجاد قيم القوى.
(مهارة سابقة)

والآن:

- أضرب وحيادات حد وعبارات تتضمن قوى، وأقسمها وأبسطها.
- أجمع كثيرات حدود، وأطرحها وأضربها.

المفردات:

التبسيط
simplifying

درجة كثيرة الحدود
Degree of a polynomial



الماذرة
يستغرق وصول ضوء الشمس إلى الأرض 8 دقائق تقريباً؛ إذ يسير الضوء بسرعة كبيرة تصل إلى $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ تقريباً.

ما الوقت الذي سيستغرقه وصول الضوء إلينا من مجرة تبعد مسافة 10^{21} m تقريباً؟

ضرب وحيادات الحد وقسمتها تذكر أن وحيدة الحد هي: عدد، أو متغير، أو حاصل ضرب عدد في متغير واحد أو أكثر بأسن صحيحة غير سالبة، وتكون من حد واحد فقط. والجدول الآتي يلخص خصائص الأسس التي تساعد على ضرب وقسمة وحيادات الحد وتبسيطها، حيث إن عملية **تبسيط** عبارات تتضمن قوى تعني إعادة كتابتها دون أقواس أو أسس سالبة.

أضف إلى

مطويتك

خصائص الأسس

ملخص المفهوم

لأي عددين حقيقيين a, b ، x وعددان صحيحان a, b :

مثال	التعريف	الخاصية
$3^2 \cdot 3^4 = 3^{2+4} = 3^6$ $p^2 \cdot p^9 = p^{2+9} = p^{11}$	$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$	ضرب القوى
$\frac{9^5}{9^2} = 9^{5-2} = 9^3$ $\frac{b^6}{b^4} = b^{6-4} = b^2$	$x \neq 0$ ، حيث $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$	قسمة القوى
$3^{-5} = \frac{1}{3^5}$ $\frac{1}{b^{-7}} = b^7$	$x \neq 0$ ، حيث $x^{-a} = \frac{1}{x^a}$ ، $\frac{1}{x^{-a}} = x^a$	الأس السالب
$(3^3)^2 = 3^{3 \cdot 2} = 3^6$ $(d^2)^4 = d^{2 \cdot 4} = d^8$	$(x^a)^b = x^{ab}$	قوة القوة
$(2k)^4 = 2^4 k^4 = 16k^4$ $(ab)^3 = a^3 b^3$	$(xy)^a = x^a y^a$	قوة ناتج الضرب
$\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{x^2}{y^2}$ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-5} = \frac{b^5}{a^5}$	$\left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a}$ ، $y \neq 0$ ، $\left(\frac{x}{y}\right)^{-a} = \left(\frac{y}{x}\right)^a = \frac{y^a}{x^a}$ ، $x \neq 0$ ، $y \neq 0$	قوة ناتج القسمة
$7^0 = 1$	$x^0 = 1$ ، $x \neq 0$	القوة الصفرية

عند تبسيط وحيدة الحد، تأكد من أنك قد كتبتها في أبسط صورة.

تبسيط وحدات الحد

مفهوم أساسي

تكون وحيدة الحد في أبسط صورة عندما:

- لا تتضمن قوى قوة.
- يظهر كل أساس مرة واحدة.
- تكون جميع الكسور المتضمنة في أبسط صورة.
- لا تتضمن أقواساً أو أساساً سالبة.

مثال 1 تبسيط العبارات

بسط كل عبارة فيما يأتي مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفرًا:

$$(2a^{-2})(3a^3b^2)(c^{-2}) \quad (\text{a})$$

اضرب 2 في 3 ، واضرب a^{-2} في a^3

$$(2a^{-2})(3a^3b^2)(c^{-2}) = 6ab^2 c^{-2}$$

تعريف الأساس السالبة

$$= 6ab^2 \left(\frac{1}{c^2}\right)$$

بسط

$$= \frac{6ab^2}{c^2}$$

$$\frac{q^2r^4}{q^7r^3} \quad (\text{b})$$

قسمة القوى

$$\frac{q^2r^4}{q^7r^3} = q^{2-7} \cdot r^{4-3}$$

اطرح الأساس

$$= q^{-5}r$$

تعريف الأساس السالبة

$$= \frac{r}{q^5} \quad \left(\frac{-2a^4}{b^2}\right)^3 \quad (\text{c})$$

قوة ناتج القسمة

$$\left(\frac{-2a^4}{b^2}\right)^3 = \frac{(-2a^4)^3}{(b^2)^3}$$

قوة ناتج الضرب

$$= \frac{(-2)^3(a^4)^3}{(b^2)^3}$$

قوة القوة

$$= \frac{-8a^{12}}{b^6}$$

إرشادات للدراسة

تحقق

يمكنك التحقق من إجابتك دائمًا باستعمال تعريف الأساس، فمثلاً:

$$\frac{q^2}{q^7} = \frac{q \cdot q}{q \cdot q \cdot q \cdot q \cdot q \cdot q \cdot q}$$

$$= \frac{1}{q^5}$$

تحقق من فهنك

$$\frac{15c^5d^3}{-3c^2d^7} \quad (\text{1B})$$

$$(2x^{-3}y^3)(-7x^5y^{-6}) \quad (\text{1A})$$

$$(-2x^3y^2)^5 \quad (\text{1D})$$

$$\left(\frac{a}{4}\right)^{-3} \quad (\text{1C})$$



كثيرات الحدود

تذكرة أن كثيرات الحدود هي وحيدة حد أو مجموع وحدات حد، وتسمى كل وحيدة حد منها حداً في كثيرة الحدود. ودرجة وحيدة الحد هي مجموع أسس كل متغيراتها.

مثال 2

درجة كثيرات الحدود

حدد ما إذا كانت كل عبارة فيما يأتي كثيرات حدود أم لا، وإن كانت كذلك فاذكر درجتها:

$$\frac{1}{4}x^4y^3 - 8x^5 \quad (a)$$

تعد هذه العبارة كثيرات حدود؛ لأن كل حد فيها هو وحيدة حد؛ ودرجة الحد الأول فيها تساوي $4 + 3 = 7$ ، ودرجة الحد الثاني 5 ؛ لذا فإن درجة كثيرات الحدود 7 .

$$\sqrt{x} + x + 4 \quad (b)$$

هذه العبارة ليست كثيرات حدود؛ لأن \sqrt{x} ليس وحيدة حد.

$$x^{-3} + 2x^{-2} + 6 \quad (c)$$

هذه العبارة ليست كثيرات حدود؛ لأن كلاً من x^{-3}, x^{-2} ليس وحيدة حد؛ حيث $x^{-3} = \frac{1}{x^3}, x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ ، ووحدات الحد لا تتضمن متغيرات في المقام.

تحقق من فهمك

$$x^5y + 9x^4y^3 - 2xy \quad (2B)$$

$$\frac{x}{y} + 3x^2 \quad (2A)$$

يمكنك إجراء العمليات المطلوبة على كثيرات الحدود وتبسيطها تماماً كما تبسيط وحيدة الحد، ثم تجمع الحدود المتشابهة.

مثال 3

جمع كثيرات الحدود وطرحها

أوجد ناتج كل مما يأتي، واكتبه في أبسط صورة:

$$(4x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 1) \quad (a)$$

تخلص من الأقواس وجمع الحدود المتشابهة.

العبارة الأصلية

وزع العدد -1

جمع الحدود المتشابهة

اجمع الحدود المتشابهة

$$(4x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 1)$$

$$= 4x^2 - 5x + 6 - 2x^2 - 3x + 1$$

$$= (4x^2 - 2x^2) + (-5x - 3x) + (6 + 1)$$

$$= 2x^2 - 8x + 7$$

$$(6x^2 - 7x + 8) + (-4x^2 + 9x - 5) \quad (b)$$

رتّب الحدود المتشابهة رأسياً، وأوجد ناتج الجمع.

$$\begin{array}{r} 6x^2 - 7x + 8 \\ (+) -4x^2 + 9x - 5 \\ \hline 2x^2 + 2x + 3 \end{array}$$

تحقق من فهمك

$$(3x^2 - 6) + (-x + 1) \quad (3B)$$

$$(-x^2 - 3x + 4) - (x^2 + 2x + 5) \quad (3A)$$

طرائق بديلة

لاحظ أن المثال $3a$

يستعمل طريقة الجمع

الأفقي. على حين

يستعمل المثال $3b$

طريقة الجمع الرأسى،

وكلاهما تؤدي إلى

الإجابة الصحيحة.



يمكنك استعمال خاصية التوزيع لضرب كثيرات الحدود.

مثال 4 ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود

أوجد ناتج: $6(2x^2 - 4x + 6)$ ، واكتبه في أبسط صورة.

$$\begin{array}{l} \text{خاصية التوزيع} \\ \text{اضرب في وحيدة الحد} \end{array} \quad \begin{array}{l} 3x(2x^2 - 4x + 6) = 3x(2x^2) + 3x(-4x) + 3x(6) \\ = 6x^3 - 12x^2 + 18x \end{array}$$

تحقق من فهمك

$$-2a(-3a^2 - 11a + 20) \quad (4B)$$

$$\frac{4}{3}x^2(6x^2 + 9x - 12) \quad (4A)$$

مثال 5 ضرب كثيرات الحدود

أوجد ناتج: $(n^2 + 4n - 6)(n + 2)$ ، واكتبه في أبسط صورة.

$$\begin{array}{l} \text{خاصية التوزيع} \\ \text{اضرب وحدات الحد} \\ \text{اجمع الحدود المتشابهة} \end{array} \quad \begin{array}{l} (n^2 + 4n - 6)(n + 2) = n^2(n + 2) + 4n(n + 2) + (-6)(n + 2) \\ = n^2 \cdot n + n^2 \cdot 2 + 4n \cdot n + 4n \cdot 2 + (-6) \cdot n + (-6) \cdot 2 \\ = n^3 + 2n^2 + 4n^2 + 8n - 6n - 12 \\ = n^3 + 6n^2 + 2n - 12 \end{array}$$

تحقق من فهمك

$$(2x^2 - 4x + 5)(3x - 1) \quad (5B)$$

$$(x^2 + 4x + 16)(x - 4) \quad (5A)$$

يمكنك استعمال كثيرات الحدود لتمثيل مواقف من واقع الحياة.

كتابة عبارة كثيرة حدود

مثال 6 من واقع الحياة

قيادة: تتطلب أنظمة إحدى شركات النقل البري أن تكون مدة قيادة سائقي الشاحنات 10 ساعات يومياً، تخللها فترة استراحة، فإذا قاد أحد سائقي الشركة شاحنته في فترة ما قبل الاستراحة بسرعة 90km/h ، وبعد الاستراحة بسرعة 100km/h ، فاكتتب كثيرة حدود تمثل المسافة التي قطعها .

قاد السائق سيارته بسرعة 90km/h في فترة ما قبل الاستراحة، و 100km/h في فترة ما بعد الاستراحة.

ليكن x عدد ساعات القيادة قبل الاستراحة.

$$90x + 100(10 - x)$$

التعبير اللفظي

المتغير

العبارة

خاصية التوزيع
اجمع الحدود المتشابهة

$$\begin{aligned} 90x + 100(10 - x) &= 90x + 1000 - 100x \\ &= 1000 - 10x \end{aligned}$$

فتكون كثيرة الحدود هي $1000 - 10x$.

تحقق من فهمك

(6) استثمار: استثمر فيصل مبلغ 90000 ريال في مشروعين أحدهما صناعي نسبة ربحه السنوي 18%， والآخر مشروع عقاري نسبة ربحه السنوي 42%， فإذا كانت x تمثل المبلغ الذي استثمره فيصل في المشروع العقاري، فاكتتب كثيرة حدود تمثل ربحه في المشروعين بعد عام واحد.

ارشادات للدراسة

قانون المسافة

تذكرة أن:

المسافة = السرعة × الزمن



الربط مع الحياة

تعقد معظم الدول دورات تدريبية متخصصة واختبارات مشددة لقائدي الشاحنات للتأكد من مستوى تأهيلهم لقيادة، ووعيتهم بكيفية التعامل مع الطرق السريعة، بما يقلل المخاطر ويؤمن حركة السير.

مثال 1 بسط كلاً مما يأتي مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفرًا:

$$(6g^5h^{-4})^3 \quad (4) \qquad \left(\frac{2a^2}{3b}\right)^3 \quad (3) \qquad \frac{12x^4y^2}{2xy^5} \quad (2) \qquad (2a^3b^{-2})(-4a^2b^4) \quad (1)$$

حدد ما إذا كانت كل عبارة فيما يأتي كثيرة حدود أم لا، وإن كانت كذلك فاذكر درجتها:

$$\frac{ab^3 - 1}{az^4 + 3} \quad (8) \qquad x^2 + \sqrt{x} \quad (7) \qquad \frac{1}{2}x^2 - 7y \quad (6) \qquad 3x + 4y \quad (5)$$

أوجد ناتج كلاً مما يأتي واكتبه في أبسط صورة:
الأمثلة 3 , 4 , 5

$$(3a + 4b) + (6a - 6b) \quad (10) \qquad (x^2 - 5x + 2) - (3x^2 + x - 1) \quad (9)$$

$$(n - 9)(n + 7) \quad (12) \qquad 3x^2(2xy - 3xy^2 + 4x^2y^3) \quad (11)$$

مثال 6 (رياضة): يمارس عثمان رياضتي الركض السريع ورفع الأثقال مدة 75 دقيقة يومياً. وعند ركضه يحرق 10 سعرات حرارية في الدقيقة، أما عندما يرفع الأثقال فيحرق 7.5 سعرات حرارية في الدقيقة. فإذا مارس رفع الأثقال x دقيقة في أحد الأيام، فاكتب كثيرة حدود تمثل عدد السعرات الحرارية التي حرقتها في ممارسته للرياضتين ذلك اليوم.

تمارين ومسائل

مثال 1 بسط كلاً مما يأتي مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفرًا:

$$(n^5)^4 \quad (17) \qquad \frac{-7x^5y^5z^4}{21x^7y^5z^2} \quad (16) \qquad \frac{-y^3z^5}{y^2z^3} \quad (15) \qquad (5x^3y^{-5})(4xy^3) \quad (14)$$

حدد ما إذا كانت كل عبارة فيما يأتي كثيرة حدود أم لا، وإن كانت كذلك فاذكر درجتها:

$$\sqrt{m - 7} \quad (21) \qquad \frac{5np}{n^2} - \frac{2g}{h} \quad (20) \qquad a^3 - 11 \quad (19) \qquad 2x^2 - 3x + 5 \quad (18)$$

أوجد ناتج كلاً مما يأتي، واكتبه في أبسط صورة:
الأمثلة 3 , 4 , 5

$$4x(2x^2 + y) \quad (23) \qquad (6a^2 + 5a + 10) - (4a^2 + 6a + 12) \quad (22)$$

$$(a + b)(a^3 - 3ab - b^2) \quad (25) \qquad (x - y)(x^2 + 2xy + y^2) \quad (24)$$

مثال 6 (مزرعة): استأجر سلمان عاملين بالتناوب لتنسيق مزرعته، فإذا تقاضى الأول 200 ريال عن كل يوم عمل، وتقاضى الثاني 150 ريالاً عن كل يوم عمل، واحتاجت المزرعة إلى 15 يوم عمل لتنسيقها، فاكتب كثيرة حدود تمثل تكلفة تنسيق المزرعة إذا عمل الأول مدة x يوماً.

بسط كلاً مما يأتي مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفرًا:

$$(a^2b^3)(ab)^{-2} \quad (29) \qquad \left(\frac{4x^{-2}y^3}{xy^{-4}}\right)^{-2} \quad (28) \qquad \left(\frac{8x^2y^3}{24x^3y^2}\right)^4 \quad (27)$$

$$\frac{1}{4}g^2(8g + 12h - 16gh^2) \quad (32) \qquad \frac{3c^2d(2c^3d^5)}{15c^4d^2} \quad (31) \qquad (-3x^3y)^2(4xy^2) \quad (30)$$

$$a^{-3}b^2(ba^3 + b^{-1}a^2 + b^{-2}a) \quad (34) \qquad x^{-2}(x^4 - 3x^3 + x^{-1}) \quad (33)$$


$$(2x - 2y)^3 \quad (36) \qquad (n^2 - 7)(2n^3 + 4) \quad (35)$$





الربط مع الحياة

يصعب التنبؤ بالطقس على كوكب المريخ، نظراً إلى بيئته المتقلبة. ويبعد أن فيه أعمق واد، وأكبر بركان في المجموعة الشمسية.



- (37) فلك:** ارجع إلى فقرة "لماذا" في بداية هذا الدرس.
- a) ما الوقت الذي يستغرقه الضوء حتى يصل من المجرة المذكورة إلى الأرض؟
b) ما الوقت الذي يستغرقه الضوء حتى يصل من الشمس إلى المريخ إذا كانت المسافة بينهما $2.28 \times 10^{11} \text{ m}$
- (38)** إذا كان $3 - 5^k + 7 = 5^{2k}$, فما قيمة k ؟
- (39)** ما قيمة k التي تجعل $q^{4k} \cdot q^5 = q^{41}$ صحيحة؟

- (40) تمثيلات متعددة:** استعمل النموذج المجاور الذي يمثل حاصل ضرب $x + 4$ في $x + 3$.
- a) هندسياً: مساحة المستطيل تساوي حاصل ضرب طوله في عرضه، أوجد حاصل ضرب $x + 3$ في $x + 4$ باستعمال النموذج.
- b) جبرياً: استعمل طريقة التوزيع بالترتيب لإيجاد حاصل ضرب $x + 4$ في $x + 3$.
- c) لفظياً: وضح كيف يمثل النموذج كل حد في حاصل الضرب.

مسائل مهارات التفكير العليا

- (41) برهان:** وضح كيف يمكن برهنة خاصية الأسس السالبة باستعمال خاصيتي قسمة القوى والقوة الصفرية؟
- (42) تحدّ:** ما الذي يحدث للمقدار $y - x$ عندما تزداد قيمة y على كل $0 < x, y > 1$ ؟
- (43) تبرير:** فسر لماذا تكون العبارة 0^{-2} غير معروفة؟
- (44) مسألة مفتوحة:** اكتب ثلاثة عبارات مختلفة مكافئة لـ x^{12} .
- (45) اكتب:** وضح لماذا تُعد خصائص الأسس مهمة في الفلك؟ وضمن توضيحك طريقة إيجاد الزمن اللازم لوصول الضوء من مصدر ما إلى أحد الكواكب.

تدريب على اختبار

- (46) إجابة قصيرة:** بسط المقدار $\frac{(2x^2)^3}{12x^4}$.

$x - 1$	C	x	A
$x - 2$	D	$x + 1$	B

مراجعة تراكمية

حل كل كثيرة حدود فيما يأتي: (مهارة سابقة)

$$x^2 + 2x + 6 + 3x \quad (49)$$

$$12ax^3 + 20bx^2 + 32cx \quad (48)$$

$$2my + 7x + 7m + 2xy \quad (51)$$

$$12y^2 + 9y + 8y + 6 \quad (50)$$

$$10x^2 - 14xy - 15x + 21y \quad (53)$$

$$8ax - 6x - 12a + 9 \quad (52)$$




قسمة كثيرات الحدود

Dividing Polynomials

3-4

المادة:

تحتاج سلمى إلى $(140x^2 + 60x)$ بوصة مربعة من الورق لعمل غلاف لكتاب طوله $10x$ بوصات. ويظهر الشكل أدناه الجزء الذي تركته للثني على جانبي الغلاف. فإذا كان عرض كعب الغلاف $2x$ بوصة، وعرض كل من الغلاف الأمامي والخلفي $6x$ بوصة، فما عرض كل من جزأي الثني؟ يمكنك استعمال قسمة كثيرات الحدود لمساعدتك على إيجاد الجواب.



القسمة الطويلة: تعلمت في الدرس (3-3) قسمة وحدات الحد، لذا يمكنك قسمة كثيرة حدود على وحيدة حد مستعملاً المهارات نفسها.

قسمة كثيرة حدود على وحيدة حد

مثال 1

$$\text{بسط العبارة: } \frac{6x^4y^3 + 12x^3y^2 - 18x^2y}{3xy}$$

اقسم كل حد في البسط على المقام

$$\begin{aligned} \frac{6x^4y^3 + 12x^3y^2 - 18x^2y}{3xy} &= \frac{6x^4y^3}{3xy} + \frac{12x^3y^2}{3xy} - \frac{18x^2y}{3xy} \\ &= \frac{6}{3} \cdot x^{4-1}y^{3-1} + \frac{12}{3} \cdot x^{3-1}y^{2-1} - \frac{18}{3} \cdot x^{2-1}y^{1-1} \\ &= 2x^3y^2 + 4x^2y - 6x \end{aligned}$$

$$(18x^2y + 27x^3y^2z)(3xy)^{-1} \quad (1B) \quad (20c^4d^2f - 16cdf^2 + 4cdf) \div (4cdf) \quad (1A)$$

يمكنك استعمال عملية مشابهة للقسمة الطويلة لقسمة كثيرة حدود على كثيرة حدود أخرى. وتسمى خطواتها خوارزمية القسمة.

قسمة كثيرة حدود على كثيرة حدود أخرى

مثال 2

استعمل القسمة الطويلة لإيجاد ناتج: $(5 - x - 40) \div (x^2 + 3x - 40)$.

اضرب المقسوم عليه في x

اطرح

اضرب المقسوم عليه في 8

اطرح

$$\begin{array}{r} x + 8 \\ x - 5 \sqrt{x^2 + 3x - 40} \\ (-) x^2 - 5x \\ \hline 8x - 40 \\ (-) 8x - 40 \\ \hline 0 \end{array}$$

ناتج القسمة هو $8 + x$ ، والباقي 0.

تحقق من فهمك

$$(x^2 + 7x - 30) \div (x - 3) \quad (2A)$$



$$(x^2 - 13x + 12) \div (x - 1) \quad (2B)$$

فيما سبق:

درست قسمة وحدات الحد. (الدرس 3-3)

والآن:

- أقسم كثيرات الحدود مستعملاً القسمة الطويلة.
- أقسم كثيرات الحدود مستعملاً القسمة التربيعية.

المفردات:

القسمة التربيعية
Synthetic division

إرشادات للدراسة

خطوات خوارزمية
قسمة كثيرة حدود على أخرى:

- اكتب كثيرة الحدود في كل من المقسوم والمقسوم عليه، بحيث تكون حدودها مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب درجتها.

- ابدأ بقسمة الحد الأول في المقسوم على الحد الأول في المقسوم عليه، ووضع الإجابة في المكان المخصص لذلك.

- ضرب ناتج القسمة في الخطوة السابقة في المقسوم عليه، واكتب الإجابة تحت المقسوم، واطرحه من المقسوم.

- استمر بقسمة الحد الثاني ... إلخ، حتى تصل إلى أن يكون باقي القسمة 0، أو كثيرة حدود درجة أقل من درجة المقسوم عليه.

قد ينبع باقي عن قسمة كثيرتي حدود كما في قسمة الأعداد الكلية، فمثلاً عند إيجاد $3 \div 11$ يكون الناتج 3 والباقي 2، وتنكتب عادةً على الصورة $\frac{2}{3} + 3$. ويمكنك كتابة نتيجة قسمة كثيرتي حدود مع باقي بالطريقة نفسها.

مثال 3 على اختبار

أي مما يأتي يكافئ العبارة: $(a^2 + 7a - 11)(3 - a)^{-1}$ ؟

$$-a - 10 + \frac{19}{3-a} \quad C$$

$$a + 10 - \frac{19}{3-a} \quad A$$

$$-a - 10 - \frac{19}{3-a} \quad D$$

$$-a + 10 \quad B$$

إرشادات للدراسة

الاختيار من متعدد

يمكنك حذف بعض

البدائل عن طريق

اختيار قيمة للمتغير a

ثم تعويض هذه القيمة

في العبارة الأصلية وفي

البدائل وإيجاد قيمة

كل منها.

اقرأ فقرة الاختبار

بما أن العامل الثاني مرفوع للأس 1، فهذه إذن مسألة قسمة.

$$(a^2 + 7a - 11)(3 - a)^{-1} = \frac{a^2 + 7a - 11}{3 - a}$$

حل فقرة الاختبار

لتسهيل عملية القسمة، أعد كتابة $a - 3$ على الصورة $-a + 3$.

$$-a(-a + 3) = a^2 - 3a$$

$$\begin{array}{r} -a - 10 \\ -a + 3 \sqrt{a^2 + 7a - 11} \\ \hline (-) \end{array}$$

$$7a - (-3a) = 10a$$

$$10a - 11$$

$$-10(-a + 3) = 10a - 30$$

$$(-) \quad 10a - 30$$

$$-11 - (-30) = 19$$

$$19$$

ناتج القسمة هو $10a - a - 11$ ، والباقي 19.

لذا فإن $-a - 10 + \frac{19}{3-a} = -a - 10 + \frac{19}{3-a}$ ، ومن ثم تكون الإجابة هي البديل C.

تحقق من فهمك

(3) أي مما يأتي يكافئ العبارة: $(r^2 + 5r + 7)(1 - r)^{-1}$ ؟

$$r - 6 + \frac{13}{1-r} \quad C$$

$$-r - 6 + \frac{13}{1-r} \quad A$$

$$r + 6 - \frac{13}{1-r} \quad D$$

$$r + 6 \quad B$$

القسمة التركيبية: القسمة التركيبية هي طريقة مبسطة لقسمة كثيرة حدود على ثنائية حد.

أضف إلى
مطويتك

القسمة التركيبية

مفهوم أساسى

الخطوة 1: اكتب معاملات المقسوم بعد ترتيب حدوده تنازلياً بحسب درجتها. تأكد من أن المقسوم عليه على الصورة $x - 2$ ، ثم اكتب الثابت 2 في الصندوق، وابكتب المعامل الأول أسفل الخط الأفقي.

اضرب المعامل الأول في 2، وابكتب الناتج أسفل المعامل الذي يليه.

اجمع ناتج الضرب مع المعامل الذي فوقه.

كرر الخطوتين 3 ، 2 على ناتج الجمع في الخطوة السابقة حتى تصل إلى ناتج جمع

الخطوة 2:

الخطوة 3:

الخطوة 4:

العددين في العمود الأخير. الأعداد في الصف الأخير تمثل معاملات ناتج القسمة، ودرجة الحد الأول أقل بواحد من درجة المقسوم، والعدد الأخير هو الباقي.

مثال 4

القسمة التركيبية

استعمل القسمة التركيبية؛ لإيجاد ناتج: $(x - 4) \div (2x^3 - 13x^2 + 26x - 24)$

$$\begin{array}{r} 4 \\[-1ex] | \\[-1ex] 2 \quad -13 \quad 26 \quad -24 \\[-1ex] \hline 2 \quad \quad \quad | \end{array}$$

الخطوة 1: اكتب معاملات المقسم. واكتب الثابت r في الصندوق، وهو في هذا المثال 4. ثم اكتب المعامل الأول وهو 2 أسفل الخط الأفقي.

$$\begin{array}{r} 4 \\[-1ex] | \\[-1ex] 2 \quad -13 \quad 26 \quad -24 \\[-1ex] \hline 8 \quad \quad \quad | \end{array}$$

الخطوة 2: اضرب المعامل الأول في الثابت r : $2 \times 4 = 8$ ، واكتب الناتج أسفل المعامل الثاني.

$$\begin{array}{r} 4 \\[-1ex] | \\[-1ex] 2 \quad -13 \quad 26 \quad -24 \\[-1ex] \hline 8 \quad \quad \quad | \end{array}$$

الخطوة 3: اجمع ناتج الضرب مع المعامل الثاني:
 $-13 + 8 = -5$

$$\begin{array}{r} 4 \\[-1ex] | \\[-1ex] 2 \quad -13 \quad 26 \quad -24 \\[-1ex] \hline 8 \quad -20 \quad 24 \\[-1ex] \hline 2 \quad -5 \quad | \end{array}$$

الخطوة 4: اضرب المجموع وهو -5 في الثابت r : $-5 \times 4 = -20$ ،

واكتب الناتج أسفل المعامل التالي، ثم اجمع:

$= -20 + 26 = 6$. اضرب المجموع وهو 6 في الثابت r :

$= 6 \times 4 = 24$ ، واكتب ناتج الضرب تحت المعامل التالي،

ثم اجمع: $-24 + 24 = 0$.

إذن ناتج القسمة هو $6 + 5x - 2x^2$ ، والباقي 0.

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 5x + 6 \\[-1ex] (\times) \quad \quad \quad x - 4 \\[-1ex] \hline -8x^2 + 20x - 24 \end{array}$$

تحقق: اضرب ناتج القسمة في المقسم عليه،
فيكون الناتج هو المقسم.

$$\begin{array}{r} (+) \quad 2x^3 - 5x^2 + 6x \\[-1ex] \hline 2x^3 - 13x^2 + 26x - 24 \end{array}$$

تنبيه!

القسمة التركيبية

تذكر أن الحدود تجمع
ولا تطرح عند إجراء
القسمة التركيبية.

ارشادات للدراسة

القسمة التركيبية

إذا لم يوجد أحد الحدود
في كثيرة حدود المقسم
فأضفه ولتكن معامله
صفراً. فمثلاً إذا كان
المقسم

$$2x^3 - 4x^2 + 6$$

فاكتبه في صورة
 $2x^3 - 4x^2 + 0x + 6$

تحقق من فهمك

$$(2x^3 + 3x^2 - 4x + 15) \div (x + 3) \quad (4A)$$

$$(3x^3 - 8x^2 + 11x - 14) \div (x - 2) \quad (4B)$$

$$(4a^4 + 2a^2 - 4a + 12) \div (a + 2) \quad (4C)$$

$$(6b^4 - 8b^3 + 12b - 14) \div (b - 2) \quad (4D)$$



ولإجراء القسمة التربيعية يجب أن يكون المقسم عليه على الصورة $r - x$ ، وإذا كان معامل x في المقسم عليه لا يساوي الواحد، فيجب إعادة كتابة عبارة القسمة بحيث يمكنك استعمال القسمة التربيعية.

معامل x في المقسم عليه لا يساوي 1

مثال 5

استعمل القسمة التربيعية؛ لإيجاد ناتج: $(1 + 3x^4 - 5x^3 + x^2 + 7x) \div (3x + 1)$.

أعد كتابة العبارة ليكون معامل x في المقسم عليه 1 وذلك بقسمة كل من البسط والمقام على 3.

$$\frac{3x^4 - 5x^3 + x^2 + 7x}{3x + 1} = \frac{(3x^4 - 5x^3 + x^2 + 7x) \div 3}{(3x + 1) \div 3}$$

$$= \frac{x^4 - \frac{5}{3}x^3 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{7}{3}x}{x + \frac{1}{3}}$$

وبما أن المقسم لا يحتوي حدا ثابتاً، فضع صفرًا مكانه.

$$x-r = x + \frac{1}{3}, r = -\frac{1}{3} \rightarrow \begin{array}{r|rrrrr} & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} & 0 \\ & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \hline 1 & -2 & 1 & 2 & -\frac{2}{3} \end{array}$$

وعليه فإن الناتج هو $\frac{2}{x + \frac{1}{3}} = \frac{2}{3x + 1}$. وأخيراً بسط الكسر

اضرب كلاً من البسط والمقام في العدد 3

$$\frac{\frac{2}{3}}{x + \frac{1}{3}} = \frac{3 \times \frac{2}{3}}{3 \times (x + \frac{1}{3})}$$

$$\text{بسط} = \frac{2}{3x + 1}$$

وعليه يكون الناتج هو $x^3 - 2x^2 + x + 2 - \frac{2}{3x + 1}$.

تحقق: أوجد ناتج القسمة مستعملاً القسمة الطويلة.

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x^2 + x + 2 \\ 3x + 1 \sqrt{3x^4 - 5x^3 + x^2 + 7x} \\ (-) 3x^4 + x^3 \\ \hline (-) -6x^3 + x^2 + 7x \\ (-) -6x^3 - 2x^2 \\ \hline (-) 3x^2 + 7x \\ (-) 3x^2 + x \\ \hline (-) 6x \\ (-) 6x + 2 \\ \hline -2 \end{array}$$

وعليه يكون الناتج هو $\checkmark . x^3 - 2x^2 + x + 2 - \frac{2}{3x + 1}$

تحقق من فهمك 

$$(8y^5 - 2y^4 - 16y^2 + 4) \div (4y - 1) \quad (5B)$$

$$(8x^4 - 4x^2 + x + 4) \div (2x + 1) \quad (5A)$$

$$(6c^3 - 17c^2 + 6c + 8) \div (3c - 4) \quad (5D)$$

$$(15b^3 + 8b^2 - 21b + 6) \div (5b - 4) \quad (5C)$$

تنبية!

قسمة جميع الحدود

تذكرة أن تقسم جميع الحدود في البسط والمقام على معامل x في المقام.



مثال 1 بسط كلّ عبارة فيما يأتي :

$$(3a^2b - 6ab + 5ab^2)(ab)^{-1} \quad (2)$$

$$\frac{4xy^2 - 2xy + 2x^2y}{xy} \quad (1)$$

استعمل القسمة الطويلة (خوارزمية القسمة) أو القسمة التركيبية؛ لإيجاد الناتج في كلّ مما يأتي :

$$(2a^2 - 4a - 8) \div (a + 1) \quad (4)$$

$$(x^2 - 6x - 20) \div (x + 2) \quad (3)$$

$$(y^5 - 3y^2 - 20) \div (y - 2) \quad (6)$$

$$(3z^4 - 6z^3 - 9z^2 + 3z - 6) \div (z + 3) \quad (5)$$

مثال 3 اختار من متعدد: أيٌ مما يأتي يكافئ العبارة : $(x^2 + 3x - 9)(4 - x)^{-1}$

$$-x - 7 - \frac{19}{4 - x} \quad \text{D}$$

$$x + 7 - \frac{19}{4 - x} \quad \text{C}$$

$$-x - 7 \quad \text{B}$$

$$-x - 7 + \frac{19}{4 - x} \quad \text{A}$$

استعمل القسمة التركيبية؛ لإيجاد الناتج في كلّ مما يأتي :

$$(18a^2 + 6a + 9) \div (3a - 2) \quad (9)$$

$$(10x^2 + 15x + 20) \div (5x + 5) \quad (8)$$

$$\frac{27y^2 + 27y - 30}{9y - 6} \quad (11)$$

$$\frac{12b^2 + 23b + 15}{3b + 8} \quad (10)$$

تدريب وحل المسائل

مثال 1 بسط كلّ عبارة فيما يأتي :

$$\frac{7g^3h^2 + 3g^2h - 2gh^3}{gh} \quad (14)$$

$$\frac{5x^2y - 10xy + 15xy^2}{5xy} \quad (13)$$

$$\frac{24a^3b^2 - 16a^2b^3}{8ab} \quad (12)$$

$$\frac{9n^3p^3 - 18n^2p^2 + 21n^2p^3}{3n^2p^2} \quad (17)$$

$$\frac{16c^4d^4 - 24c^2d^2}{4c^2d^2} \quad (16)$$

$$\frac{4a^3b - 6ab + 2ab^2}{2ab} \quad (15)$$

استعمل القسمة الطويلة (خوارزمية القسمة) أو القسمة التركيبية؛ لإيجاد الناتج في كلّ مما يأتي :

$$(b^3 - 4b^2 + b - 2) \div (b + 1) \quad (19)$$

$$(a^2 - 8a - 26) \div (a + 2) \quad (18)$$

$$(x^5 - 4x^3 + 4x^2) \div (x - 4) \quad (21)$$

$$(z^4 - 3z^3 + 2z^2 - 4z + 4)(z - 1)^{-1} \quad (20)$$

$$(g^4 - 3g^2 - 18) \div (g - 2) \quad (23)$$

$$\frac{y^3 + 11y^2 - 10y + 6}{y + 2} \quad (22)$$

مثال 3 أيٌ مما يأتي يكافئ العبارة : $(x^2 + x - 6)(2 - x)^{-1}$

$$-x - 3 \quad \text{D}$$

$$-x + 1 \quad \text{C}$$

$$-x - 1 \quad \text{B}$$

$$x + 3 \quad \text{A}$$

استعمل القسمة التركيبية؛ لإيجاد الناتج في كلّ مما يأتي :

$$\frac{6x^5 + 5x^4 + x^3 - 3x^2 + x}{3x + 1} \quad (26)$$

$$(6a^2 - 3a + 9) \div (3a - 2) \quad (25)$$

27 هندسة: صُمم صندوق على شكل متوازي مستطيلات بحيث ترتبط أبعاده بعلاقة معينة بدلالة المتغير x .

إذا كان حجم الصندوق $30 = 6x^3 + 31x^2 + 53x + 30$ ، وارتفاعه x ، فما عرض قاعدته، وما طولها؟

28 فيزياء: يرتبط فرق جهد التيار V بشدة التيار C ، والقوة P بالمعادلة $\frac{P}{C} = V$. فإذا عُبر عن القوة بالدالة $C = t + 4$ ، وشدة التيار بالمعادلة $P(t) = t^3 + 9t^2 + 26t + 24$ ، فاكتب عبارة تمثل فرق الجهد V .

بسط كلّ عبارة فيما يأتي :

$$(a^3b^2 - a^2b + 2b)(-ab)^{-1} \quad (31)$$

$$(28c^3d^2 - 21cd^2) \div (14cd) \quad (30)$$

$$(x^4 - y^4) \div (x - y) \quad (29)$$

$$\frac{3z^5 + 5z^4 + z + 5}{z + 2} \quad (34)$$

$$\frac{p^3 + 2p^2 - 7p - 21}{p + 3} \quad (33)$$

$$\frac{n^3 + 3n^2 - 5n - 4}{n + 4} \quad (32)$$

٣٥) أعمال: يمكن تقدير عدد النسخ المباعة من مجلة باستعمال المعادلة $n = \frac{3500a^2}{a^2 + 100}$ ، حيث a المبلغ الذي تنفقه المجلة على الإعلان بمئات الريالات، و n عدد النسخ المباعة من المجلة.

(a) أجر عملية القسمة المعبر عنها بالمقدار: $\frac{3500a^2}{a^2 + 100}$

(b) كم نسخة يبعت من المجلة إذا أنفق على الدعاية والإعلان 6000 ريال؟



الربط مع الحياة

فن الإعلان جزء من النشاط الترويجي المتعدد العناصر، ولكنه يتفوق من حيث إمكانية تحقيقه اتصالاً على نطاق واسع جداً في وقت محدود. ومع التطور التقني تتطور تصميم وإخراج الدعاية والإعلانات. ومن أنواع الإعلانات: الإعلان المطبوع، الإعلان المباشر، الإعلان الخارجي، الإعلان المسموع/ المرئي، الإعلان التفاعلي.

مسائل مهارات التفكير العليا

٣٧) اكتشف الخطأ: قسم كلٌّ من خليفة وجمال $1 - 3x - 2x^3 - 4x^2 + 3x + 2$ على $x - 3$ ، فقال خليفة: إن الباقي 26، وقال جمال: إن الباقي 100-. فما إجابته صحيحة؟ فسر إجابتك.

٣٨) تحدّ: إذا قسمت كثيرة حدود على ثانية حد وكان الباقي 0، فما الذي تستنتجه عن العلاقة بينهما؟

٣٩) تبرير: راجع أحد أسئلة القسمة في هذا الدرس، وبيّن العلاقة بين درجة كل من: المقسم، والمقسوم عليه، وناتج القسمة.

٤٠) مسألة مفتوحة: اكتب عبارة تتضمن قسمة كثيرتي حدود، بحيث يكون الباقي 3.

٤١) حدد العبارة المختلفة عن العبارات الثلاث الأخرى، وفسّر إجابتك.

$3xy + 6x^2$

$\frac{5}{x^2}$

$x + 5$

$5b + 11c - 9ad^2$

٤٢) اكتب: استعن بالمعلومات المعطاة في فقرة "لماذا؟" في بداية هذا الدرس، واتكتب تعليمات متسلسلة لعمل غلاف لكتاب الرياضيات باستعمال قسمة كثيرات الحدود.

تدريب على اختبار

٤٤) أيُّ كثيرات الحدود الآتية درجة 3؟

$x^2 + x + 12^3$ C

$x^3 + x^2 - 2x^4$ A

$1 + x + x^3$ D

$-2x^2 - 3x + 4$ B

٤٣) أيُّ مما يأتي يكفي العبارة:

$?(-4x^2 + 2x + 3) - 3(2x^2 - 5x + 1)$

$-10x^2 + 17x$ C

$2x^2$ A

$2x^2 + 17x$ D

$-10x^2$ B

مراجعة تراكمية

بسط كلَّ عبارة فيما يأتي : (الدرس ٣-٣)

$(3ab^2)^{-2}(2a^2b)^2$ (47)

$(xy)^2(2xy^2z)^3$ (46)

$4a(2a - 3) + 3a(5a - 4)$ (45)

إذا كان $3 + 3x + x^2$ ، فأوجد قيمة كل مما يأتي : (الدرس ١-٢)

$h(2b + 1)$ (51)

$f(c)$ (50)

$h(3)$ (49)

$f(-6)$ (48)



اختبار منتصف الفصل

استعمل القسمة الطويلة (خوارزمية القسمة)؛ لإيجاد الناتج في كلٌ مما يأتي:

$$(4r^3 - 8r^2 - 13r + 20) \div (2r - 5) \quad (13)$$

$$\frac{3x^3 - 16x^2 + 9x - 24}{x - 5} \quad (14)$$

استعمل القسمة التركيبية؛ لإيجاد الناتج في كلٌ مما يأتي:

$$(4x^3 - 6x^2 + 6x - 3) \div (2x - 1) \quad (15)$$

$$(x^4 + 3x^3 - 2x^2 - 4x + 10) \div (x + 3) \quad (16)$$

(17) استعمل القسمة الطويلة لإيجاد ناتج:
 $(x^2 + 2x - 24) \div (x - 4)$

بسط كلاً مما يأتي:

$$(15 - 3i) - (4 - 12i) \quad (2) \quad \sqrt{-81} \quad (1)$$

$$\frac{3-i}{2+5i} \quad (4) \quad i^{37} \quad (3)$$

حل كلاً من المعادلين الآتيين:

$$x^2 - 8x - 9 = 0 \quad (5)$$

$$-4.8x^2 + 1.6x + 24 = 0 \quad (6)$$


بسط كلاً مما يأتي مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفرًا:

$$4t(3rt - r) \quad (8) \quad (3x^2y^{-3})(-2x^3y^5) \quad (7)$$

$$(p^2r^3 - pr^4) \cdot 2 \quad (10) \quad 3a^4b^3c - 6a^2b^5c^3 \quad (9)$$

$$(4m^2 - 6m + 5) - (6m^2 + 3m - 1) \quad (11)$$

(12) **اختيار من متعدد:** إذا علمت أن حجم متوازي المستطيلات في الشكل أدناه هو $3 - 6x^3 + 19x^2 + 2x$ ، فأُكثِّرُ كثيرة حدود فيما يأتي تمثل مساحة قاعدته؟



$$6x^4 + 37x^3 + 59x^2 + 3x - 9 \quad \mathbf{A}$$

$$6x^2 + x + 1 \quad \mathbf{B}$$

$$6x^2 + x - 1 \quad \mathbf{C}$$

$$6x + 1 \quad \mathbf{D}$$




3-5

دوال كثیرات الحدود Polynomial Functions



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa



لماذا؟
يمكن تمثيل حجم الهواء في رئتي الإنسان خلال دورة تنفس مدتها t ثانية بالدالة: $v(t) = -0.037t^3 + 0.152t^2 + 0.173t$ ، حيث v الحجم باللترات، t الزمن بالثاني. وهذه الدالة مثال على دالة كثيرة حدود.

فيما سبق:

درست تحليل التمثيل البياني للدوال التربيعية.
(مهارة سابقة)

والآن:

- أجد قيم دوال كثیرات الحدود.
- أتعرف الأشكال العامة للتمثيل البياني لدوال كثیرات الحدود، وأحدد عدد أصفارها الحقيقة.

المفردات:

كثیرة حدود بمتغير واحد
polynomial in one variable

المعامل الرئيس
leading coefficient

دالة كثیرة الحدود
polynomial function

دالة القوة
power function

سلوك طرفي التمثيل
البياني
end behavior

صفر الدالة
zero of a function

المعامل الرئيس	الدرجة	مثال	كثیرة الحدود
12	0	12	الثابتة
4	1	4x - 9	الخطية
5	2	5x ² - 6x - 9	التربيعية
8	3	8x ³ + 12x ² - 3x + 1	التكعيبية
a_n	n	$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$	الصيغة العامة

درجة كثیرة الحدود ومعاملها الرئيس

مثال 1

حدد الدرجة والمعامل الرئيس لكل كثیرة حدود بمتغير واحد فيما يأتي، وإذا لم تكن كثیرة حدود بمتغير واحد، فاذكر السبب:

$$8x^5 - 4x^3 + 2x^2 - x - 3 \quad (\text{a})$$

هذه كثیرة حدود بمتغير واحد، وأكبر أنس للمتغير فيها 5، لذا درجتها 5 ، والمعامل الرئيس 8.

$$12x^2 - 3xy + 8x \quad (\text{b})$$

هذه ليست كثیرة حدود بمتغير واحد؛ فهناك متغيران هما x ، y .

$$3x^4 + 6x^3 - 4x^8 + 2x \quad (\text{c})$$

هذه كثیرة حدود بمتغير واحد، وأكبر أنس للمتغير فيها 8، لذا درجتها 8، والمعامل الرئيس -4 .

تحقق من فهمك

$$5x^3 - 4x^2 - 8x + \frac{4}{x} \quad (\text{1A})$$



$$8x^4 - 2x^3 - x^6 + 3 \quad (\text{1C})$$

$$5x^6 - 3x^4 + 12x^3 - 14 \quad (\text{1B})$$

دالة كثيرة الحدود هي دالة متصلة يمكن وصفها بمعادلة كثيرة حدود بمتغير واحد، فمثلاً $f(x) = 3x^3 - 4x + 6$ دالة كثيرة حدود تكعيبية. وتكتب أبسط دوال كثيرات الحدود على الصورة $f(x) = ax^b$ ، حيث a عدد حقيقي، b عدد صحيح غير سالب، وتُسمى عندئذ دوال القوة.

إذا علمت عنصراً في مجال دالة كثيرة حدود، تستطيع معرفة القيمة المقابلة له في المدى.



مثال 2 من واقع الحياة إيجاد قيمة دالة كثيرة حدود

التنفس: ارجع إلى الفقرة في بداية الدرس، وأوجد حجم الهواء في الرئتين خلال دورة تنفس مدتها ثانيتان. بتعويض العدد 2 في الدالة نجد (2)، وهو حجم الهواء في الرئتين خلال دورة تنفس مدتها ثانيتين.

$$\begin{array}{ll} \text{الدالة الأصلية} & v(t) = -0.037t^3 + 0.152t^2 + 0.173t \\ \text{عوض 2 بدلاً من } t & v(2) = -0.037(2)^3 + 0.152(2)^2 + 0.173(2) \\ \text{بسط} & = -0.296 + 0.608 + 0.346 \\ \text{اجمع} & = 0.658 \text{ L} \end{array}$$

تحقق من فهتمك

(2) **تنفس:** أوجد حجم الهواء في الرئتين خلال دورة تنفس مدتها 4 ثوانٍ.

الربط مع الحياة

تصل سعة الرئة لدى الشخص البالغ السليم إلى 6 لترات تقريباً.

يمكنك إيجاد قيم الدوال عند متغيرات وعبارات جبرية.

مثال 3 قيمة دالة كثيرة الحدود عند متغير

إذا كانت 3 ، $f(3c - 4) - 5f(c)$ ، فأوجد: $f(x) = x^2 + 2x - 3$

لإيجاد قيمة $f(3c - 4)$ ، عوض $3c - 4$ بدلاً من x في الدالة $f(x)$

$$\begin{array}{ll} \text{الدالة الأصلية} & f(x) = x^2 + 2x - 3 \\ \text{عوض } 3c - 4 \text{ بدلاً من } x & f(3c - 4) = (3c - 4)^2 + 2(3c - 4) - 3 \\ \text{اضرب} & = 9c^2 - 24c + 16 + 6c - 8 - 3 \\ \text{بسط} & = 9c^2 - 18c + 5 \end{array}$$

لإيجاد قيمة $5f(c)$ ، عوض c بدلاً من x في الدالة $f(x)$ ، واضرب الناتج في العدد 5 .

$$\begin{array}{ll} \text{الدالة الأصلية} & f(x) = x^2 + 2x - 3 \\ \text{عوض } c \text{ بدلاً من } x & 5f(c) = 5(c^2 + 2c - 3) \\ \text{خاصية التوزيع} & = 5c^2 + 10c - 15 \end{array}$$

والآن أوجد قيمة $f(3c - 4) - 5f(c)$

$$\begin{array}{ll} f(3c - 4) - 5f(c) & = (9c^2 - 18c + 5) - (5c^2 + 10c - 15) \\ \text{خاصية التوزيع} & = 9c^2 - 18c + 5 - 5c^2 - 10c + 15 \\ \text{بسط} & = 4c^2 - 28c + 20 \end{array}$$

تحقق من فهتمك

(3A) إذا كانت $g(x) = x^2 - 5x + 8$ ، فأوجد $g(5a - 2) + 3g(2a)$

(3B) إذا كانت $h(x) = 2x^2 + 5x + 3$ ، فأجد $h(-4d + 3) - 0.5h(d)$



الرمز ∞ , $+\infty$

تعبر عن التزايد

غير المحدود لقيم

المتغير x , باستعمالالرمز ∞ و $-\infty$

ما لا نهاية ويكتب


 $x \rightarrow +\infty$

كما تعبر عن التناقص

غير المحدود لقيم

المتغير x , باستعمالالرمز $-\infty$ و $+\infty$

ما لا نهاية ويكتب



 $x \rightarrow -\infty$ 

مجال دالة كثيرة الحدود هو مجموعة الأعداد الحقيقية ويُحدد سلوك طرفي التمثيل البياني للدالة $f(x)$ عندما تقترب x من المAlanهاية ($+x \rightarrow +\infty$)، أو سالب المAlanهاية ($-x \rightarrow -\infty$) بكل من: درجة دالة كثيرة الحدود والمعامل الرئيس لها.



أضف إلى مطويتك

مفهوم أساسى

سلوك طرفي التمثيل البياني لدالة كثيرة الحدود

	الدرجة : فردية المعامل الرئيس : موجب المجال : مجموعة الأعداد الحقيقية المدى : مجموعة الأعداد الحقيقية سلوك طرفي التمثيل البياني : (في اتجاهين مختلفين) $f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow +\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$
	الدرجة : فردية المعامل الرئيس : سالب المجال : مجموعة الأعداد الحقيقية المدى : مجموعة الأعداد الحقيقية سلوك طرفي التمثيل البياني : (في اتجاهين مختلفين) $f(x) \rightarrow +\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$

الدرجة : زوجية

	المعامل الرئيس : موجب المجال : مجموعة الأعداد الحقيقية المدى : مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أو التي تساوي القيمة الصغرى . سلوك طرفي التمثيل البياني : (في الاتجاه نفسه) $f(x) \rightarrow +\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow +\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$
	الدرجة : زوجية المعامل الرئيس : سالب المجال : مجموعة الأعداد الحقيقية المدى : مجموعة الأعداد الحقيقة الأقل من أو التي تساوي القيمة العظمى . سلوك طرفي التمثيل البياني : (في الاتجاه نفسه) $f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$

إرشادات للدراسة

سلوك طرفي التمثيل البياني
 المعامل الرئيس ودرجة
 كثيرة الحدود هما
 العاملان الوحيدان في
 تحديد سلوك طرفي
 التمثيل البياني.

صفر الدالة هو الإحداثي x لنقطة تقاطع التمثيل البياني للدالة مع المحور x ، لذا فإنه يمكن تحديد عدد الأصفار المنتمية لمجموعة الأعداد الحقيقة لمعادلة كثيرة الحدود من التمثيل البياني لدالة كثيرة الحدود المرتبطة بها. تذكر أن مقاطع x تحدد هذه الأصفار؛ ولذا فإن عدد مرات تقاطع التمثيل البياني مع محور x يساوي عدد هذه الأصفار.

أضف إلى

مطويتك


أصناف الدوال الفردية الدرجة الزوجية الدرجة

مفهوم أساسى

إرشادات للدراسة

الصفر المكرر

عندما يمس التمثيل البياني المحور x ، يكون للدالة صفران متsequيان (صفر مكرر).




وصف دالة كثيرة الحدود من تمثيلها البياني

مثال 4

أجب عن الأسئلة الآتية لكل من التمثيلين البيانيين أدناه :


- صف سلوك طرفي التمثيل البياني .
- حدد ما إذا كانت درجة دالة كثيرة الحدود فردية أم زوجية.
- اذكر عدد الأصفار الحقيقة للدالة.



بما أن سلوك طرفي التمثيل البياني في اتجاهين مختلفين، فالدالة فردية الدرجة، وبما أن التمثيل البياني للدالة يقطع المحور x في 5 نقاط؛ لذا فللدالة 5 أصناف حقيقة.

بما أن سلوك طرفي التمثيل البياني في الاتجاه نفسه، فالدالة زوجية الدرجة، وبما أن التمثيل البياني للدالة يقطع المحور x في نقطتين؛ لذا فللدالة صفران حقيقيان.

تحقق من فهمك



مثال 1 حدد الدرجة والمعامل الرئيس لكل كثيرة حدود بمتغير واحد فيما يأتي، وإذا لم تكن كثيرة حدود بمتغير واحد فاذكر السبب:

(2) $-10x^7 - 5x^3 + 4x - 22$

(1) $11x^6 - 5x^5 + 4x^2$

(4) $8x^5 - 3x^2 + 4xy - 5$

(3) $14x^4 - 9x^3 + 3x - 4y$

مثال 2 أوجد $w(5)$, $w(-4)$ من الدالتين الآتتين:

(6) $w(x) = 2x^4 - 5x^3 + 3x^2 - 2x + 8$

(5) $w(x) = -2x^3 + 3x - 12$

مثال 3 إذا كانت $c(x) = 4x^3 - 5x^2 + 2$, $d(x) = 3x^2 + 6x - 10$ فأوجد كلاً مما يأتي:

(8) $-4[d(3z)]$

(7) $c(y^3)$

(10) $-3c(2b) + 6d(4b - 3)$



(9) $6c(4a) + 2d(3a - 5)$

مثال 4 أجب عن الفروع $c - a$ لكل من التمثيلين البيانيين أدناه :

(a) صف سلوك طرفي التمثيل البياني.

(b) حدد ما إذا كانت درجة دالة كثيرة الحدود فردية أم زوجية.

(c) اذكر عدد الأصفار الحقيقية للدالة.



تمارين ومسائل

مثال 1 حدد الدرجة والمعامل الرئيس لكل كثيرة حدود بمتغير واحد فيما يأتي، وإذا لم تكن كثيرة حدود بمتغير واحد فاذكر السبب:

(14) $3a^7 - 4a^4 + \frac{3}{a}$

(13) $-6x^6 - 4x^5 + 13xy$

(16) $-12 - 8x^2 + 5x - 21x^7$

(15) $8x^5 - 12x^6 + 14x^3 - 9$

(18) $(5 - 2y)(4 + 3y)$

(17) $13b^3 - 9b + 3b^5 - 18$

(20) $7x^4 + 3x^7 - 2x^8 + 7$

(19) $6x^5 - 5x^4 + 2x^9 - 3x^2$

مثال 2 أوجد $p(-6)$, $p(3)$ لكل دالة مما يأتي:

(22) $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 5x + 24$

(21) $p(x) = x^4 - 2x^2 + 3$

(24) $p(x) = 2x^4 + x^3 - 4x^2$

(23) $p(x) = -x^3 + 3x^2 - 5$

مثال 3 إذا كانت $c(x) = 2x^2 - 4x + 3$, $d(x) = -x^3 + x + 1$, $e(x) = 5x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 1$ فأوجد كلاً مما يأتي:

(27) $c(b^2)$

(26) $5d(2a)$

(25) $c(3a)$

(30) $c(y^2 - 1)$

(29) $d(4y - 3)$

(28) $d(4a^2)$




مثال 4

أجب عن الفروع من a-c لكل التمثيلات البيانية الآتية:


(a) صف سلوك طرفي التمثيل البياني.

(b) حدد ما إذا كانت درجة دالة كثيرة الحدود فردية أم زوجية.


(c) اذكر عدد الأصفار الحقيقية للدالة.



(33)



(32)



(31)

(34) فيزياء: تعطى الطاقة الحركية KE بالجول لجسم متحرك كتلته m kg بالدالة $KE(v) = 0.5mv^2$, حيث تمثل v سرعة الجسم بالأمتار لكل ثانية. أوجد الطاقة الحركية لعربة كتلتها 171 kg تسير بسرعة 11m/s.

أوجد (8), $f(-2)$ لـ كل دالة مما يأتي:





$$f(x) = \frac{1}{8}x^4 - \frac{3}{2}x^3 + 12x - 18 \quad (36)$$

$$f(x) = \frac{5}{8}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{4}x + 10 \quad (38)$$

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^3 - 4x^2 \quad (35)$$

$$f(x) = \frac{3}{4}x^4 - \frac{1}{8}x^2 + 6x \quad (37)$$

حدد التمثيل البياني المناسب لكل دالة في الأسئلة (39-42) مستعملاً درجة كثيرة الحدود وسلوك طرفي التمثيل البياني لها.



$$f(x) = -2x^2 + 8x + 5 \quad (40)$$

$$f(x) = -4x^3 - 4x^2 + 8 \quad (42)$$

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 4x \quad (39)$$

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + 6x \quad (41)$$

إذا كانت 8 ، $c(x) = x^3 - 2x$ ، $d(x) = 4x^2 - 6x + 1$ ، فأوجد كلاً مما يأتي:

$$-2d(2a + 3) - 4c(a^2 + 1) \quad (44)$$

$$3c(a - 4) + 3d(a + 5) \quad (43)$$

$$-7d(a^3) + 6c(a^4 + 1) \quad (46)$$

$$5c(a^2) - 8d(6 - 3a) \quad (45)$$

(47) ملابس: تُمثل أرباح مصنع للملابس بدالة كثيرة الحدود $w(x) = -x^4 + 40x^2 - 144$, حيث x عدد قطع الملابس المباعة بالألاف، و $w(x)$ ربح المصنع بالألاف الريالات.

- (a) أنشئ جدولًا لتمثيل الدالة بيانيًا، ثم مثلها (استعمل قيم x التالية: $7, 6, 7, -7, -6, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 4, 6$).
- (b) أوجد أصفار الدالة.

(c) بين أي قيمتين يجب أن يبيع المصنع من قطع الملابس ليحقق ربحًا.

(d)وضح لماذا أخذ صفران فقط بعين الاعتبار في الفرع c.


الربط مع الحياة

فن صناعة تصميم الملابس يعتمد على العلم والجمال، ويقوم على عدة عناصر تتكامل من حيث الخط والشكل واللون والنسيج، وتناسق من حيث التصميم والابتكار ليحصل الفرد في النهاية على ذي يشعره بالتناسق، ويراعى مراحل ترتيب قياسية في مراحل إنتاج الملابس الجاهزة. وتنتج الملابس من الألياف الصناعية بجانب الألياف الطبيعية والمخلوطة ذات الطبيعة الخاصة.



تمثيلات متعددة: افترض أن $(x - 2)(x + 1)(x - 3)(x + 4) = g(x)$ (48)

- a) **تحليلياً:** حدد المقطع x والمقطع y والجذور، ودرجة الدالة $(x)g$ ، وصف سلوك طرفي تمثيلها البياني.
- b) **جبرياً:** اكتب الدالة بالصيغة القياسية.
- c) **جدولياً:** أنشئ جدولًا لتمثيل الدالة بيانيًا، ثم مثلها.
- d) **بيانياً:** مثل الدالة بيانيًا بتعيين نقاط، والتوصيل بينها بمنحنى.


صف سلوك طرفي التمثيل البياني لكل دالة فيما يأتي:

$$h(x) = -4x^7 + 8x^6 - 4x \quad (51)$$

$$g(x) = 2x^5 + 6x^4 \quad (50)$$

$$f(x) = -5x^4 + 3x^2 \quad (49)$$

مسائل مهارات التفكير العليا



اكتشف الخطأ: حدد كل من ماجد وبدر عدد أصفار التمثيل البياني المجاور. فما إجابته صحيحة؟ فسر إجابتك.

بدر
يوجد 7 أصفار؛ لأن التمثيل البياني يقطع المحور x سبع مرات.

ماجد
يوجد 8 أصفار؛ لأن التمثيل البياني يقطع المحور x 7 مرات، وأحد الجذور مكرر مرتين.

تحدد: إذا كانت $(x)g$ من عوامل $f(x)$ ، وكانت درجة $f(x)$ تساوي 5، ومعاملها الرئيس موجباً، وكانت درجة $(x)g$ تساوي 3 ومعاملها الرئيس موجباً، فصف سلوك طرفي التمثيل البياني للدالة $\frac{f(x)}{g(x)}$ ، وفسر إجابتك.

مسألة مفتوحة: مثل بيانيًّا كثيرة حدود زوجية الدرجة عدد جذورها 8، وأحدتها مكرر مرتين.

اكتتب: صفات المقصود بسلوك طرفي التمثيل البياني لدالة كثيرة حدود، وكيف يتم تحديده؟

تدريب على اختبار

57 إذا كان $\sqrt{-1} = i$ ، فإن $(7i)^5$ يساوي :

- 35 **C**
-70 **D**

- 70 **A**
35 **B**

56 ما باقي قسمة: $x^3 - 7x + 5$ على $3x^2 - 5x + 1$ ؟

- 1 **C**
11 **D**

- 11 **A**
1 **B**

مراجعة تراكمية

بسط كل عبارة مما يأتي : (الدرس 3-4)

$$\frac{18c^5d^2 - 3c^2d^2 + 12a^5c^3d^4}{3c^2d^2} \quad (60)$$

$$\frac{18ab^4c^5 - 30a^4b^3c^2 + 12a^5bc^3}{6abc^2} \quad (59)$$

$$\frac{16x^4y^3 + 32x^6y^5z^2}{8x^2y} \quad (58)$$

حدد ما إذا كانت كل عبارة مما يأتي كثيرة حدود أم لا، وإن كانت كذلك فاذكر درجتها : (الدرس 3-3)

$$3x^4 + 2x^2 - x^{-1} \quad (63)$$

$$9x^4 + 12x^6 - 16 \quad (62)$$

$$8x^2 + 5x^4 - 6x + 4 \quad (61)$$

حل كلاً من المعادلات الآتية مستعملاً القانون العام لحل المعادلة التربيعية: (الدرس 3-2)

$$x^2 - 13x + 12 = 0 \quad (66)$$


$$x + x^2 + 1 = 0 \quad (65)$$

$$x^2 - x - 3 = 0 \quad (64)$$



3-6

حل معادلات كثیرات الحدود Solving Polynomial Equations



لماذا؟
قطع مكعب صغير من آخر كبير كما في الشكل المجاور، وأعطي حجم الجزء المتبقى والعلاقة بين بعدي المكعبين، والمطلوب إيجاد أبعاد المكعبين الصغير والكبير. لاحظ أنه يمكن إيجادها بتحليل كثيرة الحدود التكعيبية $x^3 - y^3$.

تحليل كثیرات الحدود: تعلمت سابقاً أنه يمكنك تحليل كثیرات الحدود التربيعية تماماً كما تحلل الأعداد الكلية، ولكن عواملها ستكون كثیرات حدود أخرى، وكما هو الحال في كثیرات الحدود التربيعية يمكنك تحليل بعض كثیرات الحدود التكعيبية بقوانين خاصة.

مطلب	أضف إلى	مفهوم أساسی	مجموع مكعبين والفرق بينهما
		طريقة التحليل	الحالة العامة
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$		مجموع مكعبين	
$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$		الفرق بين مكعبين	

تُسمى كثيرة الحدود التي لا يمكن تحليلها إلى كثيرتي حدود درجة كل منها أقل من درجة كثيرة الحدود المُعطاة **كثيرة حدود أولية**.

مثال 1

مجموع مكعبين والفرق بينهما

حلل كلاً من كثيرتي الحدود الآتتين تحليلاً تاماً، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فاكتب كثيرة حدود أولية :

$$16x^4 + 54xy^3 \quad (a)$$

أخرج العامل المشترك الأكبر

$$16x^4 + 54xy^3 = 2x(8x^3 + 27y^3)$$

كل من $8x^3$ و $27y^3$ مكعب كامل، لذا تستطيع استعمال طريقة مجموع مكعبين.

$$8x^3 = (2x)^3; 27y^3 = (3y)^3$$

مجموع مكعبين

بسط

اكتب العامل المشترك الأكبر

$$8x^3 + 27y^3 = (2x)^3 + (3y)^3$$

$$= (2x + 3y)[(2x)^2 - (2x)(3y) + (3y)^2]$$

$$= (2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$$

$$16x^4 + 54xy^3 = 2x(2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$$

$$8y^3 + 5x^2 \quad (b)$$

الحد الأول مكعب كامل، لكن الحد الثاني ليس كذلك، لذا لا يمكن تحليل كثيرة الحدود باستعمال طريقة مجموع مكعبين، ولا يمكن تحليلها كذلك بطرق تحليل كثیرات الحدود التربيعية، أو بإخراج العامل المشترك الأكبر؛ لذا فهي كثيرة حدود أولية.

إرشادات للدراسة

التحليل التام لكثیرات الحدود
يعد تحليل كثيرة الحدود تحليلاً تاماً إذا كتبت في صورة ناتج ضرب كثیرات حدود جميعها أولية، أي إذا حللت إلى أقصى درجة ممكنة.

تحقق من فهمك

$$5y^4 - 320yz^3 \quad (1A)$$

$$-54w^4 - 250wz^3 \quad (1B)$$



يلخص الجدول الآتي معظم الطرائق المستعملة لتحليل كثیرات الحدود، وعندما ترید تحلیل کثیرة حدود ابحث أولاً عن العامل المشترك الأکبر، ثم حدد ما إذا كانت کثیرة الحدود الناتجة بعد إخراج العامل المشترك الأکبر قابلة للتحليل أم لا مستعملًا واحدة أو أكثر من الطرائق المذکورة في الجدول أدناه:

ملخص المفهوم		
نموذج	طريقـة التحلـيل	عدد الحدود
$4a^3b^2 - 8ab = 4ab(a^2b - 2)$	إخراج العامل المشترك الأکبر	أي عدد
$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$	الفرق بين مربعين مجموع مكعبين الفرق بين مكعبين	حدان
$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$	ثلاثية حدود المربع الكامل	ثلاثة حدود
$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$	ثلاثية الحدود بالصورة العامة	
$ax + bx + ay + by = x(a + b) + y(a + b)$ $= (a + b)(x + y)$	تجمیع الحدود	أربعة حدود أو أكثر

مثال 2 التحليل بتجمیع الحدود

حلل كلاً من کثیرتی الحدود الآتیتين تحلیلًا تامًا، وإذا لم يكن ذلك ممکنًا، فاكتب کثیرة حدود أولیة:

$$8ax + 4bx + 4cx + 6ay + 3by + 3cy \quad (\text{a})$$

العبارة الأصلية
جمع لإخراج العامل المشترك الأکبر
إخراج العامل المشترك الأکبر لكل تجمیع
خاصية التوزیع

$$\begin{aligned} & 8ax + 4bx + 4cx + 6ay + 3by + 3cy \\ &= (8ax + 4bx + 4cx) + (6ay + 3by + 3cy) \\ &= 4x(2a + b + c) + 3y(2a + b + c) \\ &= (4x + 3y)(2a + b + c) \end{aligned}$$

$$20fy - 16fz + 15gy + 8hz - 10hy - 12gz \quad (\text{b})$$

العبارة الأصلية
جمع لإخراج العامل المشترك الأکبر
إخراج العامل المشترك الأکبر لكل تجمیع
خاصية التوزیع

$$\begin{aligned} & 20fy - 16fz + 15gy + 8hz - 10hy - 12gz \\ &= (20fy + 15gy - 10hy) + (-16fz - 12gz + 8hz) \\ &= 5y(4f + 3g - 2h) - 4z(4f + 3g - 2h) \\ &= (5y - 4z)(4f + 3g - 2h) \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

$$30ax - 24bx + 6cx - 5ay^2 + 4by^2 - cy^2 \quad (\text{2A})$$

$$13ax + 18bz - 15by - 14az \quad (\text{2B})$$

ارشادات للدراسة

التحقق من الإجابة:
للتحقق من صحة إجابتك، اضرب العوامل لتحقق من صحة تحليل کثیرة الحدود.

تُعد طریقة التحلیل بتجمیع الحدود هي الطریقة الأساسية لتحليل کثیرات الحدود المكونة من أربعة حدود أو أكثر، أما کثیرات الحدود المتضمنة حدين أو ثلاثة حدود فيمكنك تحلیلها اعتمادًا على إحدى الطرائق الموجودة في الجدول أعلاه.



إرشادات للدراسة

التحليل باستعمال الفرق بين مربعين، ومجموع مكعبين، والفرق بين مكعبين

حل كلًا من كثيري الحدود الآتيتين، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فاكتب كثيرة حدود أولية:

$$x^6 - y^6 \quad (a)$$

يمكن اعتبار كثيرة الحدود هذه فرقًا بين مربعين أو فرقًا بين مكعبين، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يتم التحليل أولًا على اعتبار أنها فرق بين مربعين قبل التحليل على اعتبار أنها فرق بين مكعبين؛ تسهيلاً للتحليل.

$$\begin{aligned} x^6 - y^6 &= (x^3 + y^3)(x^3 - y^3) \\ &= (x + y)(x^2 - xy + y^2)(x - y)(x^2 + xy + y^2) \end{aligned}$$

مجموع مكعبين والفرق بين مكعبين

الآن، دعنا نحل كثيرة الحدود $a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3 - b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3$ على اعتبار أنها فرق بين مربعين.

$$\begin{aligned} a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3 - b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3 &= (a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3) + (-b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3) \\ &= a^3(x^2 - 6x + 9) - b^3(x^2 - 6x + 9) \\ &= (a^3 - b^3)(x^2 - 6x + 9) \\ &= (a - b)(a^2 + ab + b^2)(x^2 - 6x + 9) \\ &= (a - b)(a^2 + ab + b^2)(x - 3)^2 \end{aligned}$$

تحصل على التحليل التالي:

$$(x^2 - y^2)(x^4 + x^2y^2 + y^4)$$

وهو تحليل غير تام ويصعب إتمامه.

إرشادات للدراسة

تجمیع 6 حدود أو أكثر

جمع الحدود التي بينها أكبر عدد من العوامل المشتركة.

مثال 3 التحليل باستعمال الفرق بين مربعين، ومجموع مكعبين، والفرق بين مكعبين

حل كلًا من كثيري الحدود الآتيتين، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فاكتب كثيرة حدود أولية:

$$x^6 - y^6 \quad (a)$$

يمكن اعتبار كثيرة الحدود هذه فرقًا بين مربعين أو فرقًا بين مكعبين، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يتم التحليل أولًا على اعتبار أنها فرق بين مربعين قبل التحليل على اعتبار أنها فرق بين مكعبين؛ تسهيلاً للتحليل.

$$\begin{aligned} x^6 - y^6 &= (x^3 + y^3)(x^3 - y^3) \\ &= (x + y)(x^2 - xy + y^2)(x - y)(x^2 + xy + y^2) \end{aligned}$$

مجموع مكعبين والفرق بين مكعبين

$$a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3 - b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3 \quad (b)$$

بما أن كثيرة الحدود هذه من 6 حدود، إذن حلل أولًا بتجمیع الحدود.

$$\begin{aligned} a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3 - b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3 &= (a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3) + (-b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3) \\ &= a^3(x^2 - 6x + 9) - b^3(x^2 - 6x + 9) \\ &= (a^3 - b^3)(x^2 - 6x + 9) \\ &= (a - b)(a^2 + ab + b^2)(x^2 - 6x + 9) \\ &= (a - b)(a^2 + ab + b^2)(x - 3)^2 \end{aligned}$$

تحقق من فهمك


$$a^6 + b^6 \quad (3A)$$

$$x^5 + 4x^4 + 4x^3 + x^2y^3 + 4xy^3 + 4y^3 \quad (3B)$$

حل معادلات كثيرات الحدود: يمكنك تطبيق طرائق حل المعادلات التربيعية في حل معادلات كثيرات الحدود ذات الدرجات الأعلى من الدرجة الثانية.

حل معادلات كثيرات الحدود بالتحليل

مثال 4 من واقع الحياة



هندسة: ارجع إلى فقرة لماذا في بداية هذا الدرس. إذا كان طول حرف المكعب الصغير يساوي نصف طول ضلع المكعب الكبير، وحجم الجزء المتبقى 7000cm^3 ، فما بُعدا المكعبين؟

بما أن طول حرف المكعب الصغير يساوي نصف طول ضلع المكعب الكبير فيمكن أن يعبر عن طول ضلع المكعب الصغير بـ x ، وطول ضلع المكعب الكبير بـ $2x$. لاحظ أن حجم الجزء المتبقى يساوي حجم المكعب الكبير مطروحًا منه حجم المكعب الصغير.

$$\text{حجم الجزء المتبقى}$$

$$(2x)^3 - x^3 = 7000$$

$$8x^3 - x^3 = 7000$$

$$7x^3 = 7000$$

$$x^3 = 1000$$

$$x^3 - 1000 = 0$$

$$(x - 10)(x^2 + 10x + 100) = 0$$

$$x^2 + 10x + 100 = 0 \quad \text{أو} \quad x - 10 = 0$$

$$x = -5 \pm 5\sqrt{3} \quad x = 10$$

وبما أن العدد 10 هو الحل الحقيقي الوحيد. فإن طولي ضلع المكعبين هما 10cm, 20cm.

تحقق من فهمك



(4) هندسة: إذا كان طول حرف المكعب الصغير ثلث طول ضلع المكعب الكبير، وحجم الجزء المتبقى 3250cm^3 ، فأوجد بُعد المكعبين.

تستطيع أحياناً أن تكتب كثيرة حدود فيها المتغير x على الصورة $x^2 = u$ ، فمثلاً بفرض أن $x^2 = au^2 + bu + c$ يمكنك كتابة كثيرة الحدود $32x^4 + 12x^2 + 32$ على الصورة $32(x^2)^2 + 12(x^2) + 32$ أو $u^2 + 12u + 32$. وكثيرة الحدود الجديدة هذه تكافئ كثيرة الحدود الأصلية، ولكنها مكتوبة على الصورة التربيعية.

أضف إلى
مطويتك
مفهوم أساسى

الصورة التربيعية

التعبير اللغطي: الصورة التربيعية لـ كثيرة الحدود هي: $au^2 + bu + c$ ، $a \neq 0$ ، a, b, c أعداد حقيقية، ويمكن أن تكتب بعض كثيرات الحدود في المتغير x على هذه الصورة، وذلك بعد تعريف u بدلالة x .

مثال: $12x^6 + 8x^3 + 1 = 3(2x^3)^2 + 4(2x^3) + 1$

كتابة عبارات في الصورة التربيعية

اكتب كلاً من العبارتين الآتيتين في الصورة التربيعية إن أمكن ذلك:

(a) $150n^8 + 40n^4 - 15$

ابحث عن عاملين للعدد 150؛ أحدهما مربع كامل، وعن عاملين للعدد 40؛ أحدهما الجذر التربيعي لأحد عوامل العدد 150.

$150 = 6 \times 25$, $40 = 8 \times 5$

$25n^8 = (5n^4)^2$

(b) $y^8 + 12y^3 + 8$

لا يمكن كتابتها على الصورة التربيعية؛ لأن $(y^3)^2 \neq y^8$.

تحقق من فهتمك

(5B) $8x^4 + 12x^2 + 18$

(5A) $x^4 + 5x + 6$

ارشادات للدراسة

الصورة التربيعية

لكتابة كثيرة حدود على الصورة التربيعية، اختر العبارة المكافئة u بالنظر إلى الحدود التي تحوي متغيرات، واهتم خصوصاً بأسس المتغير الأصلي في تلك الحدود. فهناك كثيرات حدود لا يمكن كتابتها على الصورة التربيعية.

يمكنك في بعض الأحيان استعمال الصورة التربيعية لحل معادلات كثيرات الحدود ذات درجات أكبر من الدرجة الثانية.

حل معادلات كثيرات الحدود باستعمال الصورة التربيعية

حل المعادلة: $18x^4 - 21x^2 + 3 = 0$

المعادلة الأصلية

$18x^4 = 2(3x^2)^2$

افرض أن $u = 3x^2$

حل إلى العوامل

خاصية الضرب الصفرية

عُوض $3x^2$ بـ u من

اقسم على 3

أوجد الجذر التربيعي

حلول المعادلة هي: $-\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, 1, -1$

تحقق من فهتمك

(6B) $8x^4 + 10x^2 - 12 = 0$

(6A) $4x^4 - 8x^2 + 3 = 0$

الأمثلة 1-3 حل كلّ كثيرة حدود مما يأتي تحليلًا تامًّا. وإذا لم يكن ذلك ممكًناً، فاكتب كثيرة حدود أولية :


(2) $16g^3 + 2h^3$

(1) $3ax + 2ay - az + 3bx$

(4) $a^6x^2 - b^6x^2$

(3) $12qw^3 - 12q^4$

(6) $8c^3 - 125d^3$ (5) $x^3y^2 - 8x^3y + 16x^3 + y^5 - 8y^4 + 16y^3$



مثال 4 (7) إنشاءات: صنع أنس ممًراً خشبيًّا عرضه ft x حول بركة مستطيلة الشكل. فإذا كان طول البركة $40ft$ وعرضها $30ft$ ، ومساحتها مع الممر $2000ft^2$ ، فما عرض الممر الخشبي؟

اكتب كلاً من العبارتين الآتيتين على الصورة التربيعية إن كان ذلك ممكًناً:

(9) $25y^6 - 5y^2 + 20$

(8) $4x^6 - 2x^3 + 8$

مثال 6 حل كلاً من المعادلتين الآتيتين:

(11) $y^4 - 18y^2 + 72 = 0$

(10) $x^4 - 6x^2 + 8 = 0$

تدريب وحل المسائل

الأمثلة 1-3 حل كلّ كثيرة حدود مما يأتي تحليلًا تامًّا. وإذا لم يكن ذلك ممكًناً، فاكتب كثيرة حدود أولية :

(14) $a^8 - a^2b^6$

(13) $64x^4 + xy^3$

(12) $8c^3 - 27d^3$


(16) $gx^2 - 3hx^2 - 6fy^2 - gy^2 + 6fx^2 + 3hy^2$

(15) $x^6y^3 + y^9$

(17) $18x^6 + 5y^6$

(18) $8x^5 - 25y^3 + 80x^4 - x^2y^3 + 200x^3 - 10xy^3$

(19) $12ax^2 - 20cy^2 - 18bx^2 - 10ay^2 + 15by^2 + 24cx^2$



مثال 4 (20) هندسة: إذا كان حجم المجسم المجاور يساوي $55x \text{ cm}^3$ حيث $x > 0$ ، فأوجد كلاً من قيمة x ، وطول قاعده وعرضها، وارتفاعه.

مثال 5

اكتب كل عبارة مما يأتي على الصورة التربيعية إن كان ذلك ممكناً:

$$8x^6 + 6x^3 + 7 \quad (23)$$

$$-15x^4 + 18x^2 - 4 \quad (22)$$

$$x^4 + 12x^2 - 8 \quad (21)$$

$$16x^{10} + 2x^5 \quad (26)$$

$$9x^8 - 21x^4 + 12 \quad (25)$$

$$5x^6 - 2x^2 + 8 \quad (24)$$

مثال 6

حل كل معادلة مما يأتي:

$$4x^4 - 14x^2 + 12 = 0 \quad (29)$$

$$x^4 - 3x^2 - 10 = 0 \quad (28)$$

$$x^4 + 6x^2 + 5 = 0 \quad (27)$$

$$24x^4 + 14x^2 - 3 = 0 \quad (32)$$

$$4x^4 - 5x^2 - 6 = 0 \quad (31)$$

$$9x^4 - 27x^2 + 20 = 0 \quad (30)$$

حل كل كثيرة حدود مما يأتي تحليلياً تماماً، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فاكتبه كثيرة حدود أولية:

$$8x^5y^2 - 27x^2y^5 \quad (36)$$

$$x^5 - 16x \quad (35)$$

$$x^6 - 64 \quad (34)$$

$$x^4 - 625 \quad (33)$$

$$15ax - 10bx + 5cx + 12ay - 8by + 4cy + 15az - 10bz + 5cz \quad (37)$$

$$6a^2x^2 - 24b^2x^2 + 18c^2x^2 - 5a^2y^3 + 20b^2y^3 - 15c^2y^3 + 2a^2z^2 - 8b^2z^2 + 6c^2z^2 \quad (38)$$

$$6x^5 - 11x^4 - 10x^3 - 54x^3 + 99x^2 + 90x \quad (39)$$

$$20x^6 - 7x^5 - 6x^4 - 500x^4 + 175x^3 + 150x^2 \quad (40)$$

حل كل معادلة مما يأتي:

$$x^4 - 7x^2 - 44 = 0 \quad (43)$$

$$x^4 - 16x^2 - 720 = 0 \quad (42)$$

$$x^4 + x^2 - 90 = 0 \quad (41)$$

$$64x^3 + 1 = 0 \quad (46)$$

$$x^3 + 216 = 0 \quad (45)$$

$$x^4 + 6x^2 - 91 = 0 \quad (44)$$

حل كل معادلة مما يأتي:

$$6x^4 - 5x^2 - 4 = 0 \quad (48)$$

$$8x^4 + 10x^2 - 3 = 0 \quad (47)$$

$$18x^4 + 43x^2 - 5 = 0 \quad (50)$$

$$20x^4 - 53x^2 + 18 = 0 \quad (49)$$

$$3x^4 - 22x^2 - 45 = 0 \quad (52)$$

$$8x^4 - 18x^2 + 4 = 0 \quad (51)$$

$$4x^4 - 4x^2 - x^2 + 1 = 0 \quad (54)$$

$$x^6 - 26x^3 - 27 = 0 \quad (53)$$

$$x^4 + 8x^2 + 15 = 0 \quad (56)$$

$$x^6 - 9x^4 - x^2 + 9 = 0 \quad (55)$$

(57) هندسة: منشور متوازي مستطيلات أبعاده $x - 2$, $x - 4$, $x - 6$ ، وحجمه $40x$ وحدة مكعبة.


a) اكتب معادلة كثيرة حدود تمثل حجم المنشور.

b) حل المعادلة باستعمال التحليل إلى العوامل.

c) هل هناك قيم غير مقبولة للمتغير x عند حل المعادلة؟ وضح إجابتك.

d) ما أبعاد المنشور؟





(58) تصميم: يريد سليمان أن يبني بركة سباحة وفق التصميم المجاور، حيث يحيط بها ممر خشبي بعرض ثابت.

(a) إذا كانت مساحة سطح البركة فقط 336 ft^2 ، فما قيمة x ؟

(b) إذا أصبحت قيمة x مثلها وذلك بتقليل مساحة سطح البركة، فما المساحة الجديدة لسطح البركة؟

(c) إذا نصفت قيمة x بزيادة مساحة سطح البركة،
فما مساحة سطح البركة فقط عندئذ؟

(59) أحياء: قدر حسام عدد الفيروسات في إحدى التجارب بالدالة:


حسام أن يحدد الزمن الذي يصبح فيه عدد الفيروسات $P(t) = -0.012t^3 - 0.24t^2 + 6.3t + 8000$

حسام أن يحدد الزمن الذي يصبح فيه عدد الفيروسات 8000 فيروس.

(a) فأوجد قيمة t باستعمال التحليل إلى العوامل.

(b) كيف أجريت عملية التحليل إلى العوامل؟

(c) ماقيم t المقبولة؟ وما القيم غير المقبولة؟ وضح إجابتك.



(60) تصميم المباني: يمثل الشكل المجاور مخطط شقة سكنية.

(a) اكتب دالة بدلالة المتغير x تمثل مساحة الشقة.

(b) إذا كانت مساحة الشقة 1366 ft^2 ، فما قيمة x ؟

حلّ كلَّ كثيرة حدود فيما يأتي تحليلًا تامًّا. وإن لم يكن ذلك ممكًّا فاكتبه كثيرة حدود أولية:

$$y^9 - y^6 - 2y^6 + 2y^3 + y^3 - 1 \quad (62) \quad x^6 - 4x^4 - 8x^4 + 32x^2 + 16x^2 - 64 \quad (61)$$

$$x^6 - 3x^4y^2 + 3x^2y^4 - y^6 \quad (63)$$

(64) حدائق: حديقة مستطيلة الشكل بُعداها 32 ft و 40 ft ، تم توسيعها لتصبح مساحتها الأصلية بزيادة كل من طولها وعرضها بالمقدار نفسه.

(a) ارسم شكلًا يمثل الموقف.

(b) اكتب معادلة كثيرة حدود تمثل المساحة الجديدة، وحلها بالتحليل إلى العوامل.

(c) مثل الدالة بيانياً. (d) ما الحل غير المقبول؟ وضح إجابتك.



مسائل مهارات التفكير العليا

(65) **تحدّي:** حلّ المقدار $1 + 12x^n + 36x^{2n}$ إلى عوامله.

(66) **تبرير:** أعط مثالاً مضاداً للعبارة: $a^2 + b^2 = (a + b)^2$

(67) **مسألة مفتوحة:** إذا كانت الصورة التكعيبية لمعادلة هي: $0 = ax^3 + bx^2 + cx + d$, فاكتّب معادلة من الدرجة السادسة يمكن كتابتها على الصورة التكعيبية.

(68) **اكتّب:** وضّح كيف يمكن أن يساعدك تمثيل دالة كثيرة حدود بيانياً على تحليلها؟

تدريب على اختبار

(70) إذا كان الفرق الموجب بين العدددين $\frac{1}{12}, k$, مساوياً لفرق الموجب بين العدددين $\frac{1}{3}, \frac{1}{5}$, فما قيمة k ؟

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| $\frac{1}{15}$ C | $\frac{1}{60}$ A |
| $\frac{13}{60}$ D | $\frac{1}{20}$ B |

(69) **إجابة قصيرة** حل المعادلة: $x^3 + 27 = 0$.

مراجعة تراكمية

حدّد الدرجة والمعامل الرئيس لكل كثيرة حدود بمتغير واحد فيما يأتي، وإذا لم تكن كثيرة حدود بمتغير واحد فاذكر السبب: (الدرس 3-5)

$$-x^4 - 3x^3 + 2x^6 - x^7 \quad (73)$$

$$-2x^5 + 5x^4 + 3x^2 + 9 \quad (72)$$

$$4x^3 - 6x^2 + 5x^4 - 8x \quad (71)$$

(74) **كهرباء:** دائرة كهربائية تتكون من جزأين موصولين على التوالي؛ معاوقة الأول $z + 3$ أوم، ومعاوقة الثاني $z - 2$ أوم. اجمع هذين العددين المركبين لتجد المعاوقة الكلية لهذه الدائرة. (الدرس 3-1)

اقسم كلاً مما يأتي: (الدرس 3-4)

$$(8x^3 + 4x^2 + 6) \div (x + 2) \quad (77)$$

$$(2x^2 + 8x - 10) \div (2x + 1) \quad (76)$$

$$(x^2 + 6x - 2) \div (x + 4) \quad (75)$$

تحدّي: أوجد حلول كل من المعادلتين:

$$(x^2 - 4)^2 - (x^2 - 4) - 2 = 0 \quad (78)$$

$$(x^2 + 3)^2 - 7(x^2 + 3) + 12 = 0 \quad (79)$$



حل متباينات كثيرات الحدود

3-6



الهدف أستعمل الحاسبة البيانية TI-nspire
لإيجاد حلول تقريبية لمتباينة كثيرة الحدود.

يمكنك استعمل الحاسبة البيانية TI-nspire لحل متباينات كثيرات الحدود.



نشاط

$$\text{حُلَّ المتباينة } 7 \leq x^4 + 2x^3$$

الطريقة 1 : تمثيل المعادلات المرتبطة بكل طرف بيانيًّا بشكل منفصل .

الخطوات:

- افتح الآلة الحاسبة بالضغط على ثم اختر مستند جديد
- اختر إضافة تطبيق الرسوم البيانية ، واتكتب في الطرف الأيسر $x^4 + 2x^3$ بجانب $= f1(x)$ ، ثم اضغط مفتاح ليظهر التمثيل البياني.
- اضغط المفتاح ؛ لكتابة الطرف الأيمن 7 بجانب $= f2(x)$ ، ثم اضغط مفتاح ليظهر التمثيل البياني.
- ملاحظة: تدريج الآلة المعتمد على المحور π بين (6.67, -6.67)، وحتى يظهر التمثيل للمعادلة $7 = f2(x) = f1(x)$ ، قم بالضغط على مفتاح واختر تكبير/صغر النافذة و منها اختر إعدادات النافذة...؛ لتحديد التدريج المناسب لكل من x و y .
- حدد نقاط التقاطع من خلال الضغط على مفتاح ومنها اختر تحليل الرسم البياني ثم اختر منها نقاط التقاطع، وقم بالضغط في أي نقطة على الشاشة، وحرك المؤشر مرورًا ب نقطة التقاطع لتظهر نقطة التقاطع، كرر ذلك مع نقطة التقاطع الثانية فيكون الحل هو $-2.47 \leq x \leq 1.29$.



تمارين:

حُلَّ كلًّ متباينة مما يأتي، وقرب الإجابة إلى أقرب جزء من مئة :

$$x^3 + 1 \geq 4x^2 \quad (3)$$

$$x^3 - 9x^2 + 27x \leq 20 \quad (2)$$

$$\frac{2}{3}x^3 + x^2 - 5x \geq -9 \quad (1)$$

$$x^8 < -x^7 + 3 \quad (6)$$

$$\frac{1}{2}x^5 \geq \frac{1}{5}x^2 - 2 \quad (5)$$

$$x^6 - 15 \leq 5x^4 - x^2 \quad (4)$$

$$x^4 - 15x^2 + x + 65 > 0 \quad (9)$$

$$x^3 - 6x^2 + 4x < -6 \quad (8)$$

$$x^4 - 15x^2 > -24 \quad (7)$$

نظريتا الباقي والعوامل

The Remainder and Factor Theorems



رابط الدروس الرقمي
www.ien.edu.sa

لماذا؟

قدر صاحب بقالة أرباحه السنوية بالدالة: $S(x) = 0.02x^4 - 0.52x^3 + 4.03x^2 + 0.09x + 77.54$ ، حيث x عدد السنوات منذ العام 1420هـ، وتمثل $S(x)$ قيمة الأرباح بمئات الريالات.

يمكنك استعمال هذه الدالة لتقدير الأرباح في العام 1440هـ، بإيجاد قيمة الدالة $S(x)$ عندما $x = 20$ ، ويمكنك استعمال التعويض التركيبي باعتباره طريقة أخرى للوصول إلى ذلك.

التعويض التركيبي: يمكنك إيجاد باقي قسمة دالة كثيرة حدود مثل: $f(x) = -3x^2 + 5x + 4$ على الدالة $3 - x$ بطريقتين:

الطريقة 1: القسمة الطويلة

$$\begin{array}{r} 3 \\[-0.2ex] \overline{-3 \quad 5 \quad 4} \\[-0.2ex] -9 \quad -12 \\[-0.2ex] \hline -3 \quad -4 \quad | \quad -8 \end{array}$$

الطريقة 2: القسمة التركيبية

$$\begin{array}{r} -3x - 4 \\ x - 3 \sqrt{-3x^2 + 5x + 4} \\ (-) \quad -3x^2 + 9x \\ \hline \quad \quad \quad -4x + 4 \\ \quad \quad \quad (-) \quad -4x + 12 \\ \hline \quad \quad \quad \quad \quad -8 \end{array}$$

قارن بين باقي القسمة وهو العدد -8 ، وقيمة $f(3)$.

عوض العدد 3 بدلاً من x $f(3) = -3(3)^2 + 5(3) + 4$

اضرب $= -27 + 15 + 4$

بسط $= -8$

لاحظ أن قيمة $f(3)$ تساوي باقي قسمة كثيرة الحدود على $3 - x$. وهذا يوضح نظرية الباقي.

فيما سبق:

درست استعمال خاصية التوزيع والتحليل للتبسيط عبارات جبرية.
(الدرس 3-3)

والآن:

- أجد قيم الدوال باستعمال التعويض التركيبي.
- استعمل التعويض التركيبي لأحدد ما إذا كانت ثنائية حد عاملًا من عوامل كثيرة حدود أم لا.

المفردات:

- نظرية الباقي
Remainder Theorem
التعويض التركيبي
synthetic substitution
نظرية العوامل
Factor Theorem

أضف إلى
مطويتك

نظرية الباقي

مفهوم أساسى

التعبير اللغطي: إذا قسمت كثيرة حدود $P(x)$ على $r - x$ ، فإن الباقي ثابت ويساوي $P(r)$ ، وكذلك:

المقسوم	ناتج القسمة	الباقي
$P(x)$	$= Q(x) \cdot (x - r) + P(r)$	

المقسوم	ناتج القسمة	الباقي
$P(x)$	$= Q(x) \cdot (x - r) + P(r)$	

حيث $(x - r)$ دالة كثيرة حدود تقل درجتها بواحد عن درجة $(P(x))$.

مثال $x^2 + 6x + 2 = (x - 4) \cdot (x + 10) + 42$

إن عملية إيجاد قيمة دالة عند عدد بتطبيق نظرية الباقي واستعمال القسمة التركيبية تسمى **التعويض التركيبي**، وهي طريقة سهلة لإيجاد قيم دوال كثيرات الحدود،خصوصاً عندما تكون درجة كثيرة الحدود أكبر من الدرجة الثانية.

مثال 1 التعويض التركيبي

إذا كان $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x + 2$ ، فأوجد $f(4)$ باستعمال التعويض التركيبي.

بناءً على نظرية الباقي، فإن $f(4)$ يساوي باقي قسمة كثيرة الحدود على $x - 4$.

بما أنه لا يوجد حد يحتوي على x^2 ، لذا ضع 0
للحافظة على مكان عامل الحد x^2 .

$$\begin{array}{r} 4 \\ \hline 3 & -2 & 0 & 5 & 2 \\ & 12 & 40 & 160 & 660 \\ \hline 3 & 10 & 40 & 165 & 662 \end{array}$$

بما أن باقي القسمة يساوي 662 ، فإنه باستعمال التعويض التركيبي يكون $f(4) = 662$

وللتتحقق نستعمل التعويض المباشر.

عوض عن x بالعدد 4 في دالة كثيرة الحدود.

الدالة الأصلية	$f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x + 2$
عوض العدد 4 بدلاً من x	$f(4) = 3(4)^4 - 2(4)^3 + 5(4) + 2$
بسط	$= 768 - 128 + 20 + 2 = 662$

وعليه فإن $f(4) = 662$. وبذلك تكون قد توصلنا إلى الإجابة نفسها من خلال التعويض المباشر .

تحقق من فهمك

1A) إذا كان $f(x) = 3x^3 - 6x^2 + x - 11$ ، فأوجد $f(3)$.

1B) إذا كان $g(x) = 4x^5 + 2x^3 + x^2 - 1$ ، فأوجد $g(-1)$.

يمكنك استعمال التعويض التركيبي في الحالات التي تكون فيها حسابات التعويض المباشر معقدة.

مثال 2 من واقع الحياة

إيجاد قيمة الدالة

مبيعات: ارجع إلى فقرة "لماذا؟" في بداية هذا الدرس. ما قيمة الأرباح في العام 1440 هـ؟

أوجد ناتج قسمة $0.02x^4 - 0.52x^3 + 4.03x^2 + 0.09x + 77.54$ على $20 - x$ مستعملاً القسمة التركيبية.

$$\begin{array}{r} 20 \\ \hline 0.02 & -0.52 & 4.03 & 0.09 & 77.54 \\ & 0.4 & -2.4 & 32.6 & 653.8 \\ \hline 0.02 & -0.12 & 1.63 & 32.69 & 731.34 \end{array}$$

تقدير الأرباح بـ 73134 ريالاً تقريرياً.

تحقق من فهمك

2) مدارس: يمكن استعمال الدالة $C(x) = 2.4x^3 - 22.3x^2 + 53.8x + 548.2$ لتقدير عدد الطلاب في إحدى المناطق منذ عام 1427 هـ، حيث تمثل x عدد السنوات، ($C(x)$) عدد الطلاب بالعشارات، قدر عدد طلاب المنطقة عام 1442 هـ.



عوامل كثيرات الحدود: تبين القسمة التركيبية أدناه أن ناتج قسمة $30 + 3x^2 - 17x - 2x^3$ على $x + 3$ هو $2x^2 - 9x + 10$.

$$\begin{array}{r} -3 \\ \hline 2 & -3 & -17 & 30 \\ & -6 & 27 & -30 \\ \hline 2 & -9 & 10 & 0 \end{array}$$

عند قسمة كثيرة حدود على ثنائية حد من عواملها، يكون ناتج القسمة كثيرة حدود تقل درجتها بواحد عن درجة كثيرة الحدود الأصلية.

بناءً على عملية القسمة وباستعمال نظرية الباقي فإن:

المقسوم	ناتج القسمة	المقسوم عليه	الباقي
$2x^3 - 3x^2 - 17x + 30$	$= (2x^2 - 9x + 10) \cdot$	$(x + 3)$	$+ 0$

وبما أن باقي القسمة يساوي صفرًا، فإن $0 = (-3)f$. وهذا يعني أن $x + 3$ عامل لكثيرة الحدود $2x^3 - 3x^2 - 17x + 30$. وهذا يوضح **نظرية العوامل**، التي تعد حالة خاصة من نظرية الباقي.

اضف إلى
مطويتك

مفهوم أساسى

نظرية العوامل

تكون ثنائية الحد $x - 5$ عاملًا من عوامل كثيرة الحدود $P(x)$ إذا وفقط إذا كان $P(5) = 0$.

يمكنك استعمال نظرية العوامل للتحقق من أن ثنائية حد معينة عامل من عوامل كثيرة حدود معطاة.

استعمال نظرية العوامل

مثال 3

حدد ما إذا كان $x - 5$ عاملًا من عوامل كثيرة الحدود $x^3 - 7x^2 + 7x + 15$ أم لا، ثم أوجد عواملها الأخرى.

الخطوة 1: استعمال نظرية العوامل

بناءً على نظرية العوامل تكون ثنائية الحد $x - 5$ عاملًا من عوامل $P(x)$ إذا كان $P(5) = 0$ ، ولإيجاد $P(5)$ يمكنك استعمال التعويض التركيبية.

$$\begin{array}{r} 5 \\ \hline 1 & -7 & 7 & 15 \\ & 5 & -10 & -15 \\ \hline 1 & -2 & -3 & 0 \end{array}$$

وبما أن باقي القسمة يساوي صفرًا، أي $P(5) = 0$ ، فإن $x - 5$ عامل لكثيرة الحدود.

الخطوة 2: تحليل كثيرة الحدود

بما أن $x - 5$ عامل لكثيرة الحدود؛ لذا يمكن تحليل كثيرة الحدود $x^3 - 7x^2 + 7x + 15$ على النحو الآتي: $(x - 5)(x^2 - 2x - 3)$. وتكون $x^2 - 2x - 3$ هي كثيرة الحدود الناتجة عن قسمة كثيرة الحدود $x^3 - 7x^2 + 7x + 15$ على $(x - 5)$.

تحقق مما إذا كانت كثيرة الحدود هذه قابلة للتحليل أم لا.

حل ثلاثية الحدود

$$x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$$

$$x^3 - 7x^2 + 7x + 15 = (x - 5)(x + 1)(x - 3)$$

تحقق: يمكنك التتحقق من إجابتك بضرب العوامل ومقارنة كثيرة الحدود الناتجة بكثيرة الحدود الأصلية.

تحقق من فهمك

إرشادات للدراسة

التحليل إلى العوامل

ليس شرطًا أن تكون عوامل كثيرة الحدود ثانويات حد. فمثلاً، عاملًا كثيرة الحدود $x^3 + x^2 - x + 15$ هما $x^2 - 2x + 5$ و $x + 3$.



مثال 1 أوجد $f(4)$ لـ $f(x) = x^4 + 8x^3 + x^2 - 4x - 10$

$$f(x) = x^4 + 8x^3 + x^2 - 4x - 10 \quad (2)$$

$$f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 14 \quad (1)$$

مثال 2 **جوارح:** يمكن تمثيل عدد أزواج النسور في محمية باستعمال الدالة $P(x) = -0.16x^3 + 15.83x^2 - 154.15x + 1147.97$ حيث x عدد السنوات منذ عام 1390 هـ، فما العدد التقريري المتوقع لأزواج هذه النسور في عام 1443 هـ؟

مثال 3 في كل مما يأتي كثيرة حدود دالة من الدرجة الأولى، حدد ما إذا كانت هذه الدالة عاملًا من عوامل كثيرة الحدود أم لا، ثم أوجد عواملها الأخرى:

$$x^3 + x^2 - 16x - 16; x + 1 \quad (5)$$

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6; x - 1 \quad (4)$$

$$2x^3 - 5x^2 - 28x + 15; x + 3 \quad (7)$$

$$3x^3 + 10x^2 - x - 12; x - 1 \quad (6)$$

تمارين ومسائل

مثال 1 أوجد $f(-5)$ لـ $f(x) = x^2 - 8x + 6$

$$f(x) = x^2 - 8x + 6 \quad (9)$$

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 1 \quad (8)$$

$$f(x) = 2x^3 - 8x^2 - 2x + 5 \quad (11)$$

$$f(x) = 3x^4 + x^3 - 2x^2 + x + 12 \quad (10)$$

$$f(x) = x^5 + 8x^3 + 2x - 15 \quad (13)$$

$$f(x) = x^3 - 5x + 2 \quad (12)$$

$$f(x) = x^4 - 6x - 8 \quad (15)$$

$$f(x) = x^6 - 4x^4 + 3x^2 - 10 \quad (14)$$

مثال 2 **وقود:** يقدر استهلاك سيارة للوقود (بالميل لكل جالون) وفقاً للدالة

أي $f(x) = 0.00000056x^4 - 0.000018x^3 - 0.016x^2 + 1.38x - 0.38$ حيث x سرعة السيارة بالأميال

لكل ساعة. حدد استهلاك السيارة للوقود إذا سارت بالسرعات الآتية .40mi/h, 50mi/h, 60mi/h, 60mi/h

مثال 3 في كل مما يأتي كثيرة حدود دالة من الدرجة الأولى. حدد ما إذا كانت هذه الدالة عاملًا من عوامل كثيرة الحدود أم لا، ثم أوجد عواملها الأخرى:

$$x^4 + 2x^3 - 8x - 16; x + 2 \quad (18)$$

$$x^3 - 3x + 2; x + 2 \quad (17)$$

$$x^3 - x^2 - 5x - 3; x - 3 \quad (20)$$

$$x^3 - x^2 - 10x - 8; x + 2 \quad (19)$$

$$2x^3 + 7x^2 - 53x - 28; x - 4 \quad (22)$$

$$2x^3 + 17x^2 + 23x - 42; x - 1 \quad (21)$$

$$x^3 + 2x^2 - x - 2; x + 2 \quad (24)$$

$$x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 2x - 3; x - 1 \quad (23)$$


$$16x^5 - 32x^4 - 81x^3 + 162; 2x - 3 \quad (26)$$

$$6x^3 - 25x^2 + 2x + 8; 2x + 1 \quad (25)$$


مثال 27 **زورق:** تحرك زورق بخاري من السكون في اتجاه معاكس للأمواج، فإذا كانت سرعته بالأقدام لكل ثانية تعطى بالدالة $t - 0.04t^4 + 0.8t^3 + 0.5t^2 - t = f(t)$ ، حيث t الزمن بالثواني.

(a) أوجد سرعة الزورق بعد مرور زمن: 1s, 2s, 3s


(b) إذا استغرق الزورق 6s ليقطع المسافة بين عوامتين، فأوجد $f(6)$ مستعملاً التعويض التركيبي، ووضح ماذا يعني ذلك.



استعمل التمثيل البياني لإيجاد جميع عوامل كل دالة كثيرة حدود فيما يأتي:



(29)



(28)

. **تمثيلات متعددة:** لتكن الدالة: $f(x) = x^4 - 4x^2$

- a) **جبرياً:** إذا كان $x - 2$ عاملًا من عوامل هذه الدالة، فأوجد كثيرة الحدود الناتجة عن قسمة هذه الدالة على $(x - 2)$.
- b) **جدولياً:** كون جدول قيم لكثيرة الحدود التي وجدتها في الفرع "a" حيث $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.
- c) **تحليلياً:** اعتماداً على جدول القيم الذي كونته، ما الاستنتاجات التي يمكن أن نتوصل إليها حول بقية عوامل الدالة: $f(x) = x^4 - 4x^2$ ؟ وضح إجابتك.
- d) **بيانياً:** مثل الدالة الأصلية بيانياً لتأكد الاستنتاجات التي توصلت إليها.

أوجد قيم k التي تجعل باقي القسمة في كلٍ مما يأتي يساوي 3:

$$(x^2 + kx - 17) \div (x - 2) \quad (32)$$

$$(x^2 - x + k) \div (x - 1) \quad (31)$$

$$(x^3 + 4x^2 + x + k) \div (x + 2) \quad (34)$$

$$(x^2 + 5x + 7) \div (x - k) \quad (33)$$

تنبيه!

التعويض التربيعى

تذكر أنه في التعويض التربيعى يتم قسمة كثيرة حدود على ثنائية حد على الصورة $(x - a)$. وفي هذه الحالة استعمل a ، وإذا كانت ثنائية الحد على الصورة $(x + a)$ ، فاستعمل $-a$.

مسائل مهارات التفكير العليا

- (35) **تبrier:** إذا قسمت دالة كثيرة الحدود $f(x)$ على $x - c$ ، فماذا يمكن أن تستنتج إذا كان:

a) الباقي يساوي صفرًا؟

b) الباقي يساوي 1؟

c) ناتج القسمة يساوي 1 والباقي يساوي صفرًا؟

- (36) **مسألة مفتوحة:** اكتب دالة تكعيبية يكون باقي قسمتها على $2 - x$ يساوي 8، وباقى قسمتها على $3 - x$ يساوي 5.

- (37) **اكتب:** وضح لماذا تعدد نظرية العوامل حالة خاصة من نظرية الباقي؟



تدريب على اختبار

؟ $(4+i)(4-i)$ ما حاصل ضرب العددين المركبين $(i - i)$ (39)

17 C

15 A

$17 - 8i$ D

$16 - i$ B

أي مما يأتي هو تحليل للعبارة $27x^3 + y^3$ (38)

$$(3x+y)(3x+y)(3x+y) \quad A$$

$$(3x+y)(9x^2 - 3xy + y^2) \quad B$$

$$(3x-y)(9x^2 + 3xy + y^2) \quad C$$

$$(3x-y)(9x^2 + 9xy + y^2) \quad D$$

مراجعة تراكمية

حُلَّ كُلَّ معادلة مما يأتي: (الدرس 3-2)

$$x^4 - 4x^2 - 21 = 0 \quad (40)$$

$$x^4 - 6x^2 = 27 \quad (41)$$

$$4x^4 - 8x^2 - 96 = 0 \quad (42)$$

حُلَّ كُلَّ من النظامين الآتىين بيانياً: (مهارة سابقة)

$$y=3x-1 \quad (43)$$

$$y=-2x+4$$

$$3x+2y=8 \quad (44)$$

$$-4x+6y=11$$

إذا كان $c(x) = x^2 - 2x$, $d(x) = 3x^2 - 6x + 4$ فأوجد قيمة كل مما يأتي: (الدرس 3-3)

$$c(a+2) - d(a-4) \quad (45)$$

$$c(a-3) + d(a+1) \quad (46)$$

$$c(-3a) + d(a+4) \quad (47)$$

$$3d(3a) - 2c(-a) \quad (48)$$

$$c(a) + 5d(2a) \quad (49)$$

$$-2d(2a+3) - 4c(a^2+1) \quad (50)$$



الجذور والأصفار

Roots and Zeros

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

**لماذا؟**

يستعمل مدير الإنتاج في مصنع الدالة: $g(x) = 1.384x^4 - 0.003x^3 + 0.28x^2 - 0.078x + 1.365$ لتقدير معدل تكلفة إنتاج القطعة الواحدة على مدى عدة سنوات، حيث x عدد السنوات منذ 1410هـ.

ولكي تجد العام الذي يبلغ فيه معدل تكلفة إنتاج قطعة واحدة قيمة معينة، يمكنك استعمال جذور معادلة كثيرة الحدود المرتبطة بالدالة.

أنواع الجذور تعلمت سابقاً أن صفر دالة مثل $f(x)$ يمكن أن يكون أية قيمة مثل c ، حيث $0 = f(c)$. وعند تمثيل الدالة بيانياً تكون أصفارها الحقيقة هي مقاطع المحور x .

فيما سبق:

درست استعمال الأعداد المركبة لوصف حلول المعادلات التربيعية.
(الدرس 3-2)

والآن:

- أحدد عدد جذور معادلة كثيرة الحدود وأنواعها.
- أجد عدد الأصفار الحقيقية الموجبة والسلبية والأصفار التخيلية للدالة.
- أكتب دالة كثيرة حدة بأقل درجة ممكنة بمعرفة أصفارها.

المفردات:

النظرية الأساسية في الجبر
Fundamental Theorem of Algebra

أضف إلى
مطويتك

الأصفار، والعوامل، والجذور، والمقطوع**ملخص المفهوم**

التعبير اللغطي: إذا كانت $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = P(x)$ دالة كثيرة حدود،


فإن العبارات الآتية متكافئة:

• c صفر للدالة $P(x)$.

• c جذر أو حل للمعادلة $0 = P(x)$.

• c عامل من عوامل كثيرة الحدود $P(x)$.

• إذا كان c عدداً حقيقياً، فإن $(0, c)$ هي نقطة تقاطع تمثيل الدالة $P(x)$ مع المحور x .



مثال:

فبان أصفار هذه الدالة هي: $-3, -2, 1, 2$.

وتجذور المعادلة $x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12 = 0$ هي:

$-3, -2, 1, 2$.

وعوامل كثيرة الحدود $x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12$ هي:

$(x + 3), (x + 2), (x - 1), (x - 2)$.

ونقاط تقاطع التمثيل البياني للدالة $P(x)$ مع المحور x هي:

$(-3, 0), (-2, 0), (1, 0), (2, 0)$.

عند حل معادلة كثيرة حدة درجتها أكبر من صفر من الممكن أن يكون لها جذر حقيقي واحد أو أكثر، وقد لا يوجد جذور حقيقة (أي أن الجذور أعداد تخيلية). وبما أن الأعداد الحقيقة والتخيلية جمیعاً تتبع إلى مجموعة الأعداد المركبة، يمكن القول إن أية معادلة كثيرة حدة درجتها أكبر من الصفر لها جذر واحد مركب على الأقل، وهذه هي **النظرية الأساسية في الجبر**.


أضف إلى
مطويتك

النظرية الأساسية في الجبر**مفهوم أساسى**

كل معادلة كثيرة حدة درجتها أكبر من صفر لها جذر واحد على الأقل ينتمي إلى مجموعة الأعداد المركبة.

مثال 1 تحديد عدد الجذور وأنواعها


حُلَّ كُلَّ معادلة مما يأتي، واذكر عدد جذورها، ونوعها :



$$\begin{array}{ll} \text{المعادلة الأصلية} & x^2 + 6x + 9 = 0 \quad (\text{a}) \\ \text{حل إلى العوامل} & x^2 + 6x + 9 = 0 \\ \text{خذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين} & (x + 3)^2 = 0 \\ \text{أوجد قيمة } x & x + 3 = 0 \\ & x = -3 \end{array}$$

وبما أن العامل $(x + 3)$ مكرر مرتين في تحليل كثيرة الحدود، فإن -3 جذر مكرر مرتين. أي للمعادلة جذر حقيقي واحد مكرر مرتين هو -3 .

تحقق: بما أن التمثيل البياني للدالة يمس المحور x عندما $-3 = x$. فإن -3 جذر مكرر مرتين. ✓



$$\begin{array}{ll} \text{المعادلة الأصلية} & x^3 + 25x = 0 \quad (\text{b}) \\ \text{حل إلى العوامل} & x(x^2 + 25) = 0 \\ \text{خاصية الضرب المضيق} & x^2 + 25 = 0 \quad \text{أو} \quad x = 0 \\ \text{اطرح 25 من كلا الطرفين} & x^2 = -25 \\ \text{خاصية الجذر التربيعي، ثم} & x = \pm\sqrt{-25} = \pm 5i \\ \text{تبسيط} & \end{array}$$

للمعادلة ثلاثة جذور: جذر حقيقي واحد هو 0 ، وجذران تخيليان هما $5i$ و $-5i$.

تحقق: بما أن التمثيل البياني للدالة يقطع المحور x عندما $0 = x$ ، فإن للمعادلة جذراً حقيقياً واحداً هو 0 . ✓

تحقق من فهمك

$$3x^3 - x^2 + 9x - 3 = 0 \quad (\text{1C})$$

$$x^4 - 16 = 0 \quad (\text{1B})$$

$$x^3 + 2x = 0 \quad (\text{1A})$$

اخبر حل كل معادلة في المثال 1، ولا حظ أن عدد حلول كل معادلة يساوي درجة كثيرة الحدود. والنتيجة الآتية للنظرية الأساسية في الجبر تصف العلاقة بين درجة معادلة كثيرة الحدود وعدد جذورها.

أضف إلى
مطويتك

نتيجة للنظرية الأساسية في الجبر

مفهوم أساسى

التعبير اللغطي: يكون لمعادلة كثيرة الحدود من الدرجة n العدد n فقط من الجذور المركبة بما في ذلك الجذور المكررة.

$-2x^5 - 3x^2 + 8 = 0$	$4x^4 - 3x^3 + 5x - 6 = 0$	$x^3 + 2x^2 + 6 = 0$
5 جذور	4 جذور	3 جذور

وبالمثل دالة كثيرة الحدود من الدرجة n لها فقط العدد n من الأصفار المركبة.

وقد اكتشف العالم الفرنسي ديكارت علاقة بين إشارات معاملات دالة كثيرة الحدود وعدد الأصفار الحقيقة.

إرشادات للدراسة

الجذور المكررة

يمكن أن يكون لمعادلات كثيرات الحدود جذر مكرر مرتين أو ثلث أو أربع مرات وهكذا.

قانون ديكارت للإشارات

مفهوم أساسى

- إذا كانت $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ دالة كثيرة حدود معاملات حدودها أعداد حقيقية، فإن :
- عدد الأصفار الحقيقة الموجبة للدالة $P(x)$ يساوي عدد مرات تغير إشارة معاملات حدود الدالة $(x)^P$ ، أو أقل منه بعده زوجي.
 - عدد الأصفار الحقيقة السالبة للدالة $(x)^P$ يساوي عدد مرات تغير إشارة معاملات حدود الدالة $(-x)^P$ ، أو أقل منه بعده زوجي.



تاریخ الیادی

رينيه ديكارت

(1596 - 1650 م)، فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي فرنسي، يلقب بـ "أبو الفلسفة الحديثة". له تأثير واضح في علم الرياضيات؛ فقد اخترع نظاماً رياضياً شكل أساس الهندسة التحليلية سمّي باسمه وهو نظام الإحداثيات الديكارتية.

مثال 2

إيجاد عدد الأصفار الحقيقة الموجبة والساخنة والأصفار التخيلية للدالة

اذكر العدد الممكن للأصفار الحقيقة الموجبة، والحقيقة السالبة، والتخيالية للدالة $f(x) = x^6 + 3x^5 - 4x^4 - 6x^3 + x^2 - 8x + 5$.

بما أن درجة الدالة $f(x)$ تساوي 6، فإن لها 6 أصفار: حقيقة أو تخيلية أو كليهما. استعمل قانون ديكارت للإشارات لتحديد العدد الممكن للأصفار الحقيقة ونوعها.

احسب عدد مرات تغير إشارة معاملات الدالة $f(x)$.

$$f(x) = \underbrace{x^6}_{++} + \underbrace{3x^5}_{+} - \underbrace{4x^4}_{-} - \underbrace{6x^3}_{+} + \underbrace{x^2}_{-} - \underbrace{8x}_{+} + 5$$

نجد أن هناك 4 تغيرات في إشارة المعاملات، لذا فإن عدد الأصفار الحقيقة الموجبة سيكون: 4 أو 2 أو 0.

احسب عدد مرات تغير إشارة معاملات الدالة $f(-x)$.

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^6 + 3(-x)^5 - 4(-x)^4 - 6(-x)^3 + (-x)^2 - 8(-x) + 5 \\ &= \underbrace{x^6}_{++} - \underbrace{3x^5}_{-} - \underbrace{4x^4}_{+} + \underbrace{6x^3}_{+} + \underbrace{x^2}_{-} + \underbrace{8x}_{+} + 5 \end{aligned}$$

نجد أن هناك 2 تغيرين في إشارة المعاملات، لذا فإن عدد الأصفار الحقيقة السالبة سيكون: 2 أو 0.

أنشئ جدولًاً يبين عدد الجذور الحقيقة والتخيالية الممكنة.

عدد الأصفار التخيلية يساوي العدد 6 مطروحًا منه مجموع عدد الأصفار الحقيقة	عدد الأصفار الحقيقة السالبة	عدد الأصفار الحقيقة الموجبة
0	2	4
2	0	
2	2	
4	0	2
4	2	
6	0	0

تنبيه!

أصفار الدوال

لن تناقش الحالة التي يكون فيها الحد الثابت مساوياً للصفر في هذا الدرس.

تحقق من فهمك

- (2) اذكر العدد الممكن للأصفار الحقيقة الموجبة، والحقيقة السالبة، والتخيالية للدالة.
- $$h(x) = 2x^5 + x^4 + 3x^3 - 4x^2 - x + 9$$



وينطبق هذا الأمر على أصفار دوال كثيرات الحدود أيضاً. فإذا كان العدد المركب صفرًا الدالة كثيرة حدود معاملات حدودها أعداد حقيقة، فإن مراقبه أيضاً صفر لدالة كثيرة الحدود.

اضف إلى
مطويتك

نظريّة الأصفار المركبة المترافقّة

مفهوم أساسى

التعبير اللفظي: إذا كان a, b عددين حقيقيين، وكان $a + bi$ صفرًا لدالة كثيرة حدود معاملات حدودها أعداد حقيقة. فإن $a - bi$ صفر لدالة أيضًا.

مثال: إذا كان $i + 3$ صفرًا لدالة $f(x) = x^3 - 4x^2 + 13x + 50$, فإن $i - 3$ صفر لدالة أيضًا.

عندما تعطى جميع أصفار دالة كثيرة حدود ويطلب إليك تحديد الدالة، حول الأصفار إلى عوامل، ثم اضرب جميع العوامل بعضها في بعض؛ لتحصل على دالة كثيرة الحدود المطلوبة.

استعمال الأصفار لكتابية دالة كثيرة حدود

مثال 3

اكتب دالة كثيرة حدود درجتها أقل ما يمكن، ومعاملات حدودها أعداد صحيحة، إذا كان العددان $i - 1, 5$ من أصفارها.

افهم: المعطيات: العددان $i - 1, 5$ من أصفار كثيرة حدود.

المطلوب: كتابة دالة كثيرة حدود درجتها أقل ما يمكن، ومعاملات حدودها أعداد صحيحة، والعددان $i - 1, 5$ من أصفارها.

خطٌ: بما أن $i - 5$ صفر لدالة، فإن $i + 5$ أيضاً صفر لدالة بحسب نظرية الأصفار المركبة المترافقّة.

لذا فإن $(i + 5), x - (5 - i), x - 1$ عوامل لكثيرة الحدود.

حل: اكتب المعادلة كثيرة الحدود على صورة حاصل ضرب عواملها.

$$P(x) = (x + 1)[x - (5 - i)][x - (5 + i)]$$

اضرب العوامل لتحصل على دالة كثيرة الحدود.

$$\text{اكتُب الدالَّة} \quad P(x) = (x + 1)[x - (5 - i)][x - (5 + i)]$$

$$\text{أعد تجميع الحدود} \quad = (x + 1)[(x - 5) + i][(x - 5) - i]$$

$$\text{الفرق بين مربعين} \quad = (x + 1)[(x - 5)^2 - i^2]$$

$$\text{أوجد مربع الحدين} \quad = (x + 1)[(x^2 - 10x + 25) - (-1)]$$

$$\text{بسْط} \quad = (x + 1)(x^2 - 10x + 26)$$

$$\text{اضرب} \quad = x^3 - 10x^2 + 26x + x^2 - 10x + 26$$

$$\text{اجمع الحدود المتشابهة} \quad = x^3 - 9x^2 + 16x + 26$$

تحقق: بما أن هناك 3 أصفار، فإن دالة كثيرة الحدود ستكون من الدرجة الثالثة، ولذا فإن $P(x) = x^3 - 9x^2 + 16x + 26$ دالة كثيرة حدود درجتها أقل ما يمكن، ومعاملات حدودها أعداد صحيحة، وأصفارها هي: $i + 5, 5 - i, -1$.

تحقق من فهمك



إرشادات للدراسة

استعمال الأصفار لكتابية الدالَّة

إن أي دالة على الصورة

$$f(x) = a(x^3 - 9x^2 + 16x + 26)$$

(حيث a عدد صحيح لا

يساوي الصفر)، تحقق

المعطيات الواردة في

المثال 3، ولكن اعتبر أن

$a = 1$ للتسهيل فقط.

مثال 1 حل كل معاودة مما يأتي، واذكر عدد جذورها، ونوعها:

$$x^3 + 12x^2 + 32x = 0 \quad (2)$$

$$x^2 - 3x - 10 = 0 \quad (1)$$

$$0 = x^3 - 8 \quad (4)$$

$$16x^4 - 81 = 0 \quad (3)$$

مثال 2 اذك العدد الممكن للأصفار الحقيقة الموجبة، والحقيقة السالبة، والتخييلية لكل دالة مما يأتي :

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 6 \quad (5)$$

$$f(x) = 6x^4 + 4x^3 - x^2 - 5x - 7 \quad (6)$$

$$f(x) = 3x^5 - 8x^3 + 2x - 4 \quad (7)$$

$$f(x) = -2x^4 - 3x^3 - 2x - 5 \quad (8)$$

مثال 3 اكتب دالة كثيرة حدود درجتها أقل ما يمكن، ومعاملات حدودها أعداد صحيحة، إذا كانت الأعداد المعطاة في كل مما يأتي من أصفارها :

$$3, -1, 1, 2 \quad (10)$$

$$4, -1, 6 \quad (9)$$

$$-4, 4 + i \quad (12)$$

$$-2, 5, -3i \quad (11)$$

تدريب وحل المسائل

مثال 1 حل كل معاودة مما يأتي، واذكر عدد جذورها، ونوعها:

$$2x^2 - 5x + 14 = 0 \quad (14)$$

$$4x^2 + 1 = 0 \quad (13)$$

$$8x^3 - 27 = 0 \quad (16)$$

$$-3x^2 - 5x + 8 = 0 \quad (15)$$

$$x^3 - 6x^2 + 7x = 0 \quad (18)$$

$$16x^4 - 625 = 0 \quad (17)$$

$$x^5 + 2x^3 + x = 0 \quad (20)$$

$$x^5 - 8x^3 + 16x = 0 \quad (19)$$

مثال 2 اذك العدد الممكن للأصفار الحقيقة الموجبة، والحقيقة السالبة، والتخييلية لكل دالة مما يأتي :

$$f(x) = x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 5x + 7 \quad (21)$$

$$f(x) = 2x^3 - 7x^2 - 2x + 12 \quad (22)$$

$$f(x) = -3x^5 + 5x^4 + 4x^2 - 8 \quad (23)$$

$$f(x) = x^4 - 2x^2 - 5x + 19 \quad (24)$$

$$f(x) = 4x^6 - 5x^4 - x^2 + 24 \quad (25)$$

$$f(x) = -x^5 + 14x^3 + 18x - 36 \quad (26)$$



مثال 3

اكتب دالة كثيرة حدود درجتها أقل ما يمكن، ومعاملات حدودها أعداد صحيحة، إذا كانت الأعداد المعطاة في كل مما يأتي من أصفارها :

$$5, -2, -1 \quad (27)$$

$$-4, -3, 5 \quad (28)$$

$$-1, -1, 2i \quad (29)$$

$$-3, 1, -3i \quad (30)$$

$$0, -5, 3 + i \quad (31)$$


$$-2, -3, 4 - 3i \quad (32)$$

اكتب بجانب التمثيل البياني للدالة الرمز الذي يمثل أصفارها في كل مما يأتي :


$$-3, 4, i, -i \quad (\mathbf{a})$$

$$-4, 3 \quad (\mathbf{b})$$


$$-4, 3, i, -i \quad (\mathbf{c})$$



(35)




(34)




(33)

حدد عدد الأصفار الحقيقة الموجبة، والحقيقة السالبة، والتخيلية لكل من الدالتين الممثلتين بيانيًا فيما يأتي، ووضح إجابتك:



(37)

الدرجة : 5



(36)

الدرجة : 3



مسائل مهارات التفكير العليا

(38) **مسألة مفتوحة:** في كل مما يأتي، مثل بيانياً دالة كثيرة حدود بحيث يكون لها :

- (a) 3 أصفار حقيقية وصفران تخيليان (b) 4 أصفار حقيقة (c) صفران تخيليان

(39) **تحدد:** اكتب معادلة على صورة حاصل ضرب عوامل دالة كثيرة حدود من الدرجة الخامسة، لها صفران تخيليان، وصفر غير صحيح، وصفران غير نسبيين، ووضح إجابتك .

(40) حدد أي المعادلات الآتية تختلف عن الآخريات، ووضح إجابتك:

$$r^4 + 1 = 0$$

$$r^3 + 1 = 0$$

$$r^2 - 1 = 0$$


$$r^3 - 8 = 0$$

(41) **تبسيط:** اكتب مثلاً مضاداً لكل عبارة فيما يأتي:

(a) جميع دوال كثيرات الحدود التي تزيد درجتها على 2 لها على الأقل صفر حقيقي سالب.

(b) جميع دوال كثيرات الحدود التي تزيد درجتها على 2 لها على الأقل صفر حقيقي موجب.

(42) **اكتبه:** وضح لزميلك كيف تستعمل قانون ديكارت للإشارات لتحديد عدد الأصفار الحقيقة الموجبة والسلبية الممكنة لدالة كثيرة الحدود: $f(x) = x^4 - 2x^3 + 6x^2 + 5x - 12$



تدريب على اختبار

(43) استعمل التمثيل البياني للدالة: $f(x) = x^5 + x^4 - 3x^3 - 3x^2 - 4x - 4$
وحدّد أيّاً مما يأتي لا يعد عاملًا لكثيرة الحدود 4

$x + 2$ C

$x - 2$ A

$x + 1$ D

$x - 1$ B

مراجعة تراكمية

أوجد (4), $f(-8)$ لكل دالة مما يأتي مستعملاً التعويض التربيعى: (الدرس 3-7)

$$f(x) = 4x^3 + 6x^2 - 3x + 2 \quad (44)$$

$$f(x) = 5x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 6x \quad (45)$$

$$f(x) = 2x^5 - 3x^3 + x^2 - 4 \quad (46)$$

حلّ كلّ كثيرة حدود مما يأتي تحليلًا تامًا، وإن لم يكن ذلك ممكناً فاكتبه كثيرة حدود أولية: (الدرس 3-6)

$$x^6 - y^6 \quad (47)$$

$$4x^2y + 8xy + 16y - 3x^2z - 6xz - 12z \quad (48)$$

$$5a^3 - 30a^2 + 40a + 2a^2b - 12ab + 16b \quad (49)$$



ملخص الفصل

المفاهيم الأساسية

الأعداد المركبة (الدرس 3-1)

$i = \sqrt{-1}$, $i^2 = -1$

- i هي الوحدة التخيلية، $-1 = i^2$.
- العدد المركب هو أي عدد يمكن كتابته على الصورة $a + bi$ ؛ حيث a و b عددين حقيقيان، ويسمى a الجزء الحقيقي، و b الجزء التخييلي.

القانون العام والمميز (الدرس 3-2)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

العمليات على كثيرات الحدود (الدرس 3-3, 3-4)

- عند الجمع أو الطرح: أجمع الحدود المتشابهة.
- عند الضرب: أستعمل خاصية التوزيع.
- عند القسمة: أستعمل القسمة الطويلة أو التركيبية.

دواوين كثيرات الحدود (الدرس 3-5)

- تعرف دالة كثيرة الحدود بأنها دالة متصلة يمكن وصفها بمعادلة كثيرة حدود بمتغير واحد.

حل معادلات كثيرات الحدود (الدرس 3-6)

- يمكن تحليل كثيرة الحدود باستعمال العامل المشترك الأكبر أو تجميع الحدود، أو بإحدى طرائق تحليل الدالة التربيعية.

نظريتا الباقي والعوامل (الدرس 3-7)

- نظرية الباقي: إذا قسمت كثيرة حدود $P(x)$ على $r - x$ ، فإن الباقي ثابت ويساوي $P(r)$.


- نظرية العوامل: تكون ثنائية الحد $a - x$ عاملًا من عوامل كثيرة الحدود $f(x)$ إذاً وفقط إذا كان $f(a) = 0$.

الجذور والأصفار (الدرس 3-8)

- نظرية الأصفار المركبة المترافقية: إذا كان $a + bi$ صفرًا للدالة، فإن $a - bi$ صفر للدالة أيضًا.

منظم أفكار

المنظومات



تأكد أن المفاهيم الأساسية
مدونة في مطويتك.

المفردات الأساسية	
دالة كثيرة الحدود (139)	الوحدة التخيلية (108)
دالة القوة (139)	العد التخييلي البحث (108)
سلوك طرفي التمثيل البياني (140)	العدد المركب (109)
صفر الدالة (140)	المركبان المترافقان (111)
كثيرة الحدود الأولية (145)	القانون العام (115)
الصورة التربيعية (148)	المميز (118)
نظرية الباقي (154)	التبسيط (125)
التعويض التركيبية (154)	درجة كثيرة الحدود (127)
نظرية العوامل (156)	القسمة التركيبية (132)
النظرية الأساسية في الجبر (160)	كثيرة حدود بمتغير واحد (138)
	المعامل الرئيس (136)

اختبار مفرداتك

بين ما إذا كانت كل عبارة فيما يأتي صحيحة أم خاطئة. وإذا كانت خاطئة فاستبدل ما تحته خط لتصبح العبارة صحيحة:

(1) العدد i تخييلي بحث

(2) يسمى القانون: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ بالميز

(3) يُسمى معامل الحد الأول في كثيرة الحدود المكتوبة بالصيغة القياسية المعامل الرئيس.

(4) تُسمى كثيرة الحدود التي لا يمكن تحليلها كثيرة حدود بمتغير واحد.

(5) دالة كثيرة الحدود هي دالة متصلة يمكن وصفها بمعادلة كثيرة حدود بمتغير واحد.

(6) تبسيط عبارات تتضمن قوى، يعني إعادة كتابتها دون أقواس أو أسس سالبة.

(7) القسمة التركيبية هي طريقة مختصرة لقسمة كثيرة حدود على ثنائية حد.

(8) $(x^3)^2 + 3x^3 - 8 = 0$ هي دالة قوية.

دليل الدراسة و المراجعة

3

مراجعة الدروس

3-1 الأعداد المركبة (الصفحتان: 110-116)

مثال 1

حل المعادلة: $3x^2 + 12 = 0$

المعادلة الأصلية

اطرح 12 من كلا الطرفين

اقسم كلا الطرفين على 3

خاصية الجذر التربيعي

$$\sqrt{-4} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{-1}$$

$$3x^2 + 12 = 0$$

$$3x^2 = -12$$

$$x^2 = -4$$

$$x = \pm\sqrt{-4}$$

$$x = \pm 2i$$

بسط كلاً مما يأتي:

$$\sqrt{-8} \quad (9)$$

$$(2 - i) + (13 + 4i) \quad (10)$$

$$(6 + 5i)(3 - 2i) \quad (11) \quad (6 + 2i) - (4 - 3i)$$

كهرباء: تبلغ المعاوقة في أحد أجزاء دائرة كهربائية $3 + 2i$ أوم، وفي الجزء الآخر منها $3i - 4$ أوم. اجمع هذين العددين لتجد المعاوقة الكلية في الدائرة الكهربائية.

حل كلاً من المعادلات الآتية:

$$4x^2 + 1 = 0 \quad (15)$$

$$2x^2 + 50 = 0 \quad (14)$$

3-2 القانون العام والمميز (الصفحتان: 117-124)

مثال 2

حل المعادلة: $x^2 - 4x - 45 = 0$

$$a = 1, b = -4, c = -45$$

القانون العام

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(-45)}}{2(1)}$$

$$= \frac{4 \pm 14}{2}$$

بسط

اكتب على صورة معادلتين

بسط

$$x = \frac{4 + 14}{2}, \quad x = \frac{4 - 14}{2}$$

$$= 9 \quad = -5$$

إذن الحالان هما: 9, -5.

أجب عن الفروع $a-c$ لكلاً معادلة تربيعية فيما يأتي:

(a) أوجد قيمة المميز.

(b) أوجد عدد الجذور المختلفة، وحدد أنواعها.

(c) حل المعادلة باستعمال القانون العام.

$$x^2 + 4x - 32 = 0 \quad (17) \quad x^2 - 10x + 25 = 0 \quad (16)$$

$$4x^2 - 4x + 1 = 0 \quad (19) \quad 2x^2 + 3x - 18 = 0 \quad (18)$$

فيزياء: قذف محمد كرة رأسياً إلى أعلى بسرعة ابتدائية 40 ft/s . إذا علمت أن ارتفاع الكرة عن الأرض $h = -16t^2 + 40t + 5$ بالأقدام يعطى بالمعادلة حيث t الزمن بالثواني، فأوجد الزمن اللازم لتصل الكرة إلى الأرض.

3-3 العمليات على كثيرات الحدود (الصفحتان: 127-132)

مثال 3

بسط كلاً مما يأتي:

$$(-4a^3b^5)(5ab^3) \quad (a)$$

اضرب القوى

$$(-4a^3b^5)(5ab^3) = (-4)(5)a^{3+1}b^{5+3}$$

$$= -20a^4b^8$$

بسط

$$(2x^2 + 3x - 8) + (3x^2 - 5x - 7) \quad (b)$$

$$(2x^2 + 3x - 8) + (3x^2 - 5x - 7)$$

$$= (2x^2 + 3x^2) + (3x - 5x) + [-8 + (-7)]$$

$$= 5x^2 - 2x - 15$$

بسط كلاً مما يأتي مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفراً:

$$\frac{14x^4y}{2x^3y^5} \quad (21)$$

$$3t(tn - 5) \quad (22)$$

$$(4r^2 + 3r - 1) - (3r^2 - 5r + 4) \quad (23)$$

$$(x^4)^3 \quad (24)$$

$$(m + p)(m^2 - 2mp + p^2) \quad (25)$$

$$3b(2b - 1) + 2b(b + 3) \quad (26)$$

3-4 قسمة كثيرات الحدود (الصفحات: 133-138)

مثال 4

. بسط العبارة: $(6x^3 - 31x^2 - 34x + 22) \div (2x - 1)$

$$\begin{array}{r} 3x^2 - 14x - 24 \\ 2x - 1 \sqrt{6x^3 - 31x^2 - 34x + 22} \\ (-) 6x^3 - 3x^2 \\ \hline (-) -28x^2 - 34x + 22 \\ (-) -28x^2 + 14x \\ \hline (-) -48x + 22 \\ (-) -48x + 24 \\ \hline -2 \end{array}$$

وعليه يكون الناتج هو $3x^2 - 14x - 24 - \frac{2}{2x - 1}$

بسط كل عبارة مما يأتي:


$$\frac{12x^4y^5 + 8x^3y^7 - 16x^2y^6}{4xy^5} \quad (27)$$

$$(6y^3 + 13y^2 - 10y - 24) \div (y + 2) \quad (28)$$

$$(a^4 + 5a^3 + 2a^2 - 6a + 4)(a + 2)^{-1} \quad (29)$$

$$(4a^6 - 5a^4 + 3a^2 - a) \div (2a + 1) \quad (30)$$

31 هندسة: حجم المنشور المتوازي المستطيلات في الشكل المجاور يساوي 3 $x^3 + 11x^2 - 114x - 80$ وحدة مكعبة، فما مساحة القاعدة؟



3-5 دوال كثيرات الحدود (الصفحات: 140-146)

مثال 5

حدّد درجة كثيرة الحدود $1 + 4x^3 + 3x^2 - 7x^7 + 4x -$ وما معاملها الرئيس؟

أكبر أس يساوي 7؛ لذا درجة كثيرة الحدود تساوي 7، والمعامل الرئيس هو -7.

مثال 6

إذا كان $p(a - 2) = 3x + 2x^2 - x^3$ ، فأوجد $p(x)$

$$\begin{aligned} p(a - 2) &= 3(a - 2) + 2(a - 2)^2 - (a - 2)^3 \\ &= 3a - 6 + 2a^2 - 8a + 8 - (a^3 - 6a^2 + 12a - 8) \\ &= -a^3 + 8a^2 - 17a + 10 \end{aligned}$$

حدد الدرجة والمعامل الرئيس لكل كثيرة حدود بمتغير واحد فيما يأتي، وإذا لم تكن كثيرة حدود بمتغير واحد، فاذكر السبب:

$$5x^6 - 3x^4 + x^3 - 9x^2 + 1 \quad (32)$$

$$6xy^2 - xy + y^2 \quad (33)$$

$$12x^3 - 5x^4 + 6x^8 - 3x - 3 \quad (34)$$

أوجد $p(-2)$ ، $p(x + h)$ لـ $p(x)$ فيما يأتي :

$$p(x) = x^2 + 2x - 3 \quad (35)$$

$$p(x) = 3x^2 - x \quad (36)$$

$$p(x) = 3 - 5x^2 + x^3 \quad (37)$$

3-6 حل معادلات كثيرات الحدود (الصفحات: 147-154)

مثال 7

حل المعادلة: $4x^4 - 25x^2 + 36 = 0$

حل إلى العوامل

$$(x^2 - 4)(4x^2 - 9) = 0$$

$$4x^2 - 9 = 0 \quad \text{أو} \quad x^2 - 4 = 0 \quad \text{خاصية الضرب الصفرى}$$

اضف 9 لكلا الطرفين، ثم اقسم على 4

أوجد الجذر التربيعي

$$x^2 = \frac{9}{4} \quad x^2 = 4$$

$$x = \pm \frac{3}{2} \quad x = \pm 2$$


$$\text{الحلول هي: } -2, 2, -\frac{3}{2}, \frac{3}{2}$$

حل كل من المعادلتين الآتتين:

$$x^3 + 2x^2 - 35x = 0 \quad (38)$$

$$8x^4 - 10x^2 + 3 = 0 \quad (39)$$

40 هندسة: إذا كان حجم المنشور في الشكل الآتي يساوي 315 in³. فأوجد كل من قيمة x وطول المنشور وعرضه وارتفاعه.



3-7

نظريتا الباقي والعوامل (الصفحتان: 156-161)

مثال 8

حدد ما إذا كان $6 - x$ عاملًا من عوامل كثيرة الحدود:

$$x^3 - 2x^2 - 21x - 18$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \underline{-} \quad | \quad 1 & -2 & -21 & -18 \\ & 6 & 24 & 18 \\ \hline 1 & 4 & 3 & | & 0 \end{array}$$

$6 - x$ عامل من عوامل كثيرة الحدود؛ لأن باقي قسمة كثيرة الحدود عليه يساوي صفرًا.

أوجد $f(-2)$ لكل دالة فيما يأتي مستعملًا التعويض التربيعى:

$$f(x) = x^2 - 3 \quad (41)$$

$$f(x) = x^2 - 5x + 4 \quad (42)$$

$$f(x) = x^3 + 4x^2 - 3x + 2 \quad (43)$$

$$f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 1 \quad (44)$$

في كلٍ مما يأتي كثيرة حدود وأحد عواملها. أوجد عواملها الأخرى:

$$3x^3 + 20x^2 + 23x - 10, x + 5 \quad (45)$$

$$2x^3 + 11x^2 + 17x + 5, 2x + 5 \quad (46)$$

$$x^3 + 2x^2 - 23x - 60, x - 5 \quad (47)$$

3-8

الجذور والأصفار (الصفحتان: 162-168)

مثال 9

اذكر العدد الممكن للأصفار الحقيقية الموجبة، والحقيقة السالبة، والتخيلية لدالة: $f(x) = 3x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 26x - 48$.

تغير إشارة الدالة $f(x)$ مرة واحدة؛ لذا يوجد صفر حقيقي موجب واحد.

تغير إشارة الدالة $f(-x)$ ثلاثة مرات؛ لذا يوجد لدالة صفر واحد، أو ثلاثة أصفار حقيقة سالبة.

الدالة ليس لها أصفار تخيلية، أو لها صفران تخيليان.

اذكر العدد الممكن للأصفار الحقيقة الموجبة، والحقيقة السالبة، والتخيلية لكل دالة مما يأتي:

$$f(x) = -2x^3 + 11x^2 - 3x + 2 \quad (48)$$

$$f(x) = -4x^4 - 2x^3 - 12x^2 - x - 23 \quad (49)$$

$$f(x) = x^6 - 5x^3 + x^2 + x - 6 \quad (50)$$

$$f(x) = -2x^5 + 4x^4 + x^2 - 3 \quad (51)$$

$$f(x) = -2x^6 + 4x^4 + x^2 - 3x - 3 \quad (52)$$



اختبار الفصل

3

(18) اختيار من متعدد: إذا كان $3 - 3x^3 + 5x - 3 = f(x)$ ، فما قيمة $f(-2)$:

-33 C

37 A

-21 D

27 B

بسط كلّاً مما يأتي:

$$\frac{2-i}{1+3i} \quad (1)$$

$$(2+3i)-(2-3i) \quad (2)$$

$$(3-i) \cdot (4+2i) \quad (3)$$

(19) فيما يأتي كثيرة حدود وأحد عواملها . أوجد عواملها الأخرى:

$$2x^3 + 15x^2 + 22x - 15 ; x + 5$$

اذكر العدد الممكن للأصفار الحقيقة الموجبة، والحقيقة السالبة، والتخييلية لكلٌ من الدالتين الآتتين:

$$p(x) = x^3 - x^2 - x - 3 \quad (20)$$


$$p(x) = 2x^6 + 5x^4 - x^3 - 5x - 1 \quad (21)$$

أوجد جميع أصفار كلٌ من الدالتين الآتتين:


$$p(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6 \quad (22)$$

$$p(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 8 \quad (23)$$

(24) هندسة: إذا كان حجم المنشور المتوازي المستطيلات الموضح بالشكل أدناه 612 cm^3 ، فأوجد أبعاده.



(25) صُف سلوك طرفي التمثيل البياني الآتي، وحدد ما إذا كانت درجة دالة كثيرة الحدود فردية أم زوجية. واذكر عدد الأصفار الحقيقة للدالة.



بسط كلّاً مما يأتي:

$$(3a)^2(7b)^4 \quad (4)$$

$$(7x - 2)(2x + 5) \quad (5)$$

$$(2x^2 + 3x - 4) - (4x^2 - 7x + 1) \quad (6)$$

$$(4x^3 - x^2 + 5x - 4) + (5x - 10) \quad (7)$$

$$(x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 8x + 3) \div (x + 3) \quad (8)$$

$$(3x^3 - 5x^2 - 23x + 24) \div (x - 3) \quad (9)$$

(10) إذا كانت $4c(3b) = 3x^3 + 5x^2$ ، فما قيمة $c(x)$:

$$8y^4 + x^3y \quad (11)$$

$$2x^2 + 2x + 1 \quad (12)$$

$$a^2x + 3ax + 2x - a^2y - 3ay - 2y \quad (13)$$


حل كلًاً من المعادلات الآتية:

$$8x^3 + 1 = 0 \quad (14)$$


$$x^4 - 11x^2 + 28 = 0 \quad (15)$$

(16) حل المعادلة الآتية باستعمال القانون العام: $x^2 - 4x + 3 = 0$

(17) إطارات: إذا كانت مساحة الصورة وإطارها في الشكل الآتي 168 in^2 ، فما عرض الإطار؟



الإعداد للاختبارات المعيارية



رسم شكل

يعد رسم الشكل طريقة مفيدة في حل المسألة، فهو يعطي تصوّراً للكيفية الحل، لذا ارسم شكلاً يمثل المسألة في ورقة مسودة أو في ورقة الإجابة (إذا سمح بذلك).

استراتيجيات لرسم شكل

خطوة 1

- اقرأ المسألة بعناية.
- واسأل نفسك الأسئلة الآتية:
- ما المطلوب حله؟
- ما معطيات المسألة؟
- ما المجاهيل التي يُراد نمذجتها وإيجادها؟

خطوة 2

- ارسم شكلاً وضع عليه المسميات والبيانات على أن يكون:
- واضحاً ودقيقاً ما أمكن.
 - تشتمل المسميات التي توضع على الشكل على جميع معطيات المسألة.

خطوة 3

حل المسألة.

- استعمل الشكل لمساعدتك على نمذجة المسألة بمعادلة، ثم حلّها.
- تحقق من معقولية إجابتك.

مثال

اقرأ المسألة وحدد المطلوب، واستعمل المعلومات المعطاة لحلّها.

لدى فيصل بركة سباحة سطحها على شكل مستطيل أبعاده 25 ft, 14 ft، وأراد أن يرصف حولها ممّراً متساوي العرض، إذا كانت مساحة سطح البركة مع الممّر 672 ft^2 ، فما عرض الممّر؟

3.25 ft C


2.75 ft A

3.5 ft D

3 ft B



ارسم شكلاً ليساعدك على تصور المسألة، وافترض أن x يمثل عرض الممر غير المعلوم.



طول البركة مع الممر يساوي $25 + 2x$ ، وعرضها مع الممر يساوي $14 + 2x$.

اضرب العبارتين السابقتين لإيجاد مساحة سطح البركة والممر معًا، وساو الناتج بالقيمة المعطاة وهي 672 ft^2 ثم حلّها لإيجاد x .

$$(25 + 2x)(14 + 2x) = 672$$

$$350 + 78x + 4x^2 = 672$$

$$4x^2 + 78x - 322 = 0$$

$$x = -23 \text{ أو } x = 3.5$$

وبما أن عرض الممر لا يمكن أن يكون سالبًا، فإن القيمة الأنسب هي 3.5 ft

إذن الإجابة الصحيحة هي D

تمارين وسائل

- (2) يتم تصنيع الحلقات المعدنية بعمل ثقب في رقاقة معدنية دائرية. إذا صنعت حلقة بعمل ثقب عند مركز رقاقة معدنية قطرها 1.8 in وكانت مساحة سطح الحلقة $0.65\pi \text{ in}^2$ ، فما نصف قطر الثقب؟

0.35 in A

0.38 in B

0.40 in C

0.42 in D

اقرأ كل مسألة من المسألتين الآتتين، وحدد المطلوب واستعمل المعطيات المعطاة لحلها:

- (1) لدى مزارع سياج طوله 240 ft ، ويريد أن يحيط به حديقة مستطيلة الشكل على أن يكون جدار منزله أحد جوانبها. فما أكبر مساحة ممكنة للحديقة؟

7200 ft^2 A

4960 ft^2 B

3600 ft^2 C

3280 ft^2 D



أسئلة الاختيار من متعدد

اختر رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

(5) استعمل عبد الرحمن الدالة:

$$P(x) = -0.000047x^2 + 0.027x + 3$$

لتقدير عدد سكان المدينة التي يسكنها ما بين عامي 1440، 1400 هـ؛ حيث x عدد السنوات منذ عام 1400 هـ، P عدد السكان بالملايين. فما قيمة $P(20)$ التي تمثل عدد سكان هذه المدينة عام 1420 هـ؟

2 مليون تقريباً A

2.5 مليون تقريباً B

3 ملايين تقريباً C

3.5 ملايين تقريباً D

(6) أبسط صورة للمقدار $\frac{2}{1-5i}$ هي:

$$\frac{1}{13} - \frac{5}{13}i \quad A$$

$$\frac{1}{2} - \frac{5}{2}i \quad B$$

$$\frac{1}{13} + \frac{5}{13}i \quad C$$

$$2 - \frac{2}{5}i \quad D$$

(7) ما قيمة مميز المعادلة: $x^2 - x - 20 = 0$?

5 C

9 A

-4 D

81 B

(8) إذا كان $\underline{X} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، $\underline{A} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ وكانت \underline{B} مصفوفة

رتبتها 2×2 بحيث $\underline{X} = 2\underline{A} - \underline{B}$ فإن:

$$\underline{X} = 3 \quad B \quad A$$

$$\underline{X} = 2 \quad A \quad B$$

$$\underline{X} = -2 \quad B \quad C$$

$$\underline{X} = 3 \quad A \quad D$$

(1) أبسط صورة للمقدار $(5n^2 + 11n - 6) - (2n^2 - 5)$ هي:

$$3n^2 + 11n - 11 \quad A$$

$$3n^2 + 11n - 1 \quad B$$

$$7n^2 + 11n - 11 \quad C$$


$$7n^2 + 11n - 1 \quad D$$

(2) أي مما يأتي ليس حلّاً للمعادلة: $x^3 - 37x - 84 = 0$?

$$6 \quad C \quad -4 \quad A$$

$$7 \quad D \quad -3 \quad B$$

(3) كم صفرًا حقيقيًّا لدالة كثيرة الحدود الممثلة بيانياً أدناه؟



$$4 \quad C \quad 2 \quad A$$

$$5 \quad D \quad 3 \quad B$$

(4) إذا كانت المصفوفة $\begin{bmatrix} x+1 & x \\ -2 & 8 \end{bmatrix}$ ليس لها نظير ضربي،

فإن قيمة x تساوي:

$$\frac{4}{3} \quad A$$

$$\frac{4}{5} \quad B$$


$$-\frac{4}{3} \quad C$$

$$-\frac{4}{5} \quad D$$




أسئلة ذات إجابات قصيرة

- (13) ي يريد صالح أن يملأ الإناء المكعب بالماء مستعملاً العلبة الأسطوانية في الشكل أدناه. فكم مرة يستعمل العلبة؟




- (9) يبيّن الشكل الآتي حديقة محاطة بممر عرضه x متراً. فإذا علمت أن مساحة الحديقة مع الممر 558 m^2 ، فأوجّد عرض الممر بالأمتار.



- (10) حلّ المقدار: $64a^4 + ab^3$ تحليلًا تامًّا، وبيّن خطوات الحل.

أسئلة ذات إجابات مطولة

- (14) اكتب الدالة المتعددة التعريف التي لها التمثيل البياني أدناه:



- (11) بسط المقدار:

$$\frac{3x^3 - 4x^2 - 28x - 16}{x + 2}$$

واكتّب إجابتوك على صورة حاصل ضرب عوامل مبيّنًا خطوات الحل.

- (12) ما قيمة a في المعادلة المصفوفية الآتية؟

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 \\ 9 \end{bmatrix}$$

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	إذا لم تستطع حل سؤال ...
1-3	3-8	2-5	3-4	3-5	3-6	2-2	3-2	3-1	3-5	2-5	3-8	3-6	3-3	فعد إلى الدرس ...

الفصل 4

العلاقات والدوال العكسية والجذرية Inverses and Radical Functions and Relations



فيما سبق

درست تبسيط كثيرات الحدود.

والآن

- أجد معكوس دالة، وتركيب دالتين.
- أمثل بيانياً دوال ومتباينات الجذر التربيعي وأحللها.
- أبسط معادلات تتضمن جذوراً وأسسًا نسبية وأحللها.

لماذا؟

إدارة الموارد المالية :

يعد ربط إدارة الموارد المالية بالرياضيات مهارة، وإذا أتقنتها فإنك ستسفيد منها في مجالات حياتك المختلفة. إن تعلم إدارة مواردك المالية يساعدك على وضع ميزانية والعيش ضمن حدودها، وسوف تتعرض في هذا الفصل لمواضف مالية مثل: التوفير، التضخم، صرف العملة.

المطويات

منظم أفكار


العلاقات والدوال العكسية والجذرية: اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم ملاحظاتك حول العلاقات والدوال العكسية والجذرية، مبتدئاً بأربع أوراق من دفتر الملاحظات.

3 عندما تأكد من تساوي المسافات بين الحواف، اثنِ الأوراق جيداً، ثم ثبّتها على طول خط الطي، ثم اقلب المطوية واتّبِع عنوان الفصل وعنوانين الدروس كما في الشكل.

2 اطْوِ أَسْفَلَ الْوَرَقَاتِ الْأَرْبَعَ إِلَى أَعْلَى، وحَاجِزُ الْحَوَافَ بِحِيثُ تَكُونُ الْمَسَافَاتُ بَيْنَ نَهَايَاتِ جَمِيعِ الْأَوْرَاقِ مُتَسَاوِيَة.

1 ثبّت الأوراق الأربع بعضها فوق بعض، بحيث تعلو كل ورقة الورقة التي أمامها بمقدار 2.5 سم.

العلاقات والدوال العكسية والجذرية	
١	الميليات على الدوال
٢	الميليات والدوال المكعبة
٣	دوال ومتباينات الجذر التربيعي
٤	أقدار الميل
٥	الميليات على الصيارات الجذرية
٦	الأسس النسبية
٧	حل المعادلات والمتباينات الجذرية





التهيئة للفصل الرابع

تشخيص الاستعداد:

أجب عن الاختبار الآتي ، وارجع إلى "المراجعة السريعة" : لمساعدتك على ذلك.

مراجعة سريعة

مثال 1

$$\cdot \sqrt{\frac{45}{20}}$$

بسط العبرة

خاصية قسمة الجذور

اضرب في $\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{20}}$

خاصية ضرب الجذور

أوجد قيمة $\sqrt{900}$

بسط

$$\sqrt{\frac{45}{20}} = \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{20}}$$

$$= \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{20}} \times \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{20}}$$

$$= \frac{\sqrt{900}}{20}$$

$$= \frac{30}{20}$$

$$= \frac{3}{2} = 1.5$$

اختبار سريع

بسط كل عباره فيما يأتي : (يستعمل مع الدرس 4-2)

$$\sqrt{28} \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{25}{4}} \quad (2)$$

- (3) طاقة حركية: يمكن تحديد سرعة كرة بالمعادلة $v = \sqrt{\frac{2KE}{m}}$ ، حيث (KE) تشير إلى الطاقة الحركية للكرة، إلى كتلة الكرة. بسط هذه المعادلة معتبراً كتلة الكرة . 50 kg

مثال 2

بسط العبرة $(3x^4 + 4x^3 + x^2 + 9x - 6) \div (x + 2)$ ، مستعملاً القسمة التربيعية.

. $r = -2$ ، لذلك $x - r = x + 2$

$$\begin{array}{r} -2 \\ \hline 3 & 4 & 1 & 9 & -6 \\ \downarrow & -6 & 4 & -10 & 2 \\ \hline 3 & -2 & 5 & -1 & | -4 \end{array}$$

النتيجة هي: $3x^3 - 2x^2 + 5x - 1 - \frac{4}{x+2}$

بسط كلًا من العبارات الآتية مستعملاً القسمة التربيعية: (يستعمل مع الدروس 4-4 إلى 4-6)

$$(5x^2 - 22x - 15) \div (x - 5) \quad (4)$$

$$(3x^2 + 14x - 12) \div (x + 4) \quad (5)$$

$$(2x^3 - 7x^2 - 36x + 36) \div (x - 6) \quad (6)$$

$$(3x^4 - 13x^3 + 17x^2 - 18x + 15) \div (x - 3) \quad (7)$$

- (8) مبيعات: يمكن تقدير عدد السلع المبيعة من متجر بالمعادلة $n = \frac{4000x^2}{x^2 + 50}$ ، حيث x تمثل المبلغ الذي أنفق بمئات الريالات على الدعاية، n عدد السلع المبيعة.

(a) أجر عملية القسمة المشار إليها بالعبارة $\frac{4000x^2}{x^2 + 50}$


(b) ما العدد التقريري للسلع التي ستباع، إذا أنفق المتجر 1000 ريال على الدعاية؟

العمليات على الدوال

Operations on Functions



رابط الدرس الرقمي



لماذا؟

تبين التمثيلات البيانية المجاورة الدخل السنوي لعائلة منذ عام 1430هـ؛ حيث $f(x)$ تعبّر عن الدخل السنوي للزوج، و $m(x)$ تعبّر عن الدخل السنوي للزوجة.

يمكن التعبير عن إجمالي الدخل السنوي لتلك العائلة بالدالة $f(x) + m(x)$.

فيما سبق

درست إجراء العمليات على كثيرات الحدود.

والآن

- أجد مجموع دالتين والفرق بينهما وحاصل ضربهما وقسمتهما.
- أجد تركيب دالتين.

المفردات

تركيب دالتين

composition of functions

العمليات الحسابية: لقد أجريت العمليات الحسابية على كثيرات الحدود في الفصل السابق. ويمكنك إجراء عمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة على الدوال أيضًا.

يمكنك الاعتماد على القواعد الآتية لإجراء العمليات الحسابية على الدوال:

مفهوم أساسى

العمليات على الدوال

أضف إلى
مطويتك

مثال	التعريف	العملية
لتكن $f(x) = 2x$, $g(x) = -x + 5$	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	الجمع
$2x + (-x + 5) = x + 5$	$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$	الطرح
$2x - (-x + 5) = 3x - 5$	$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$	الضرب
$2x(-x + 5) = -2x^2 + 10x$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0$	القسمة
$\frac{2x}{-x + 5}, x \neq 5$		

مثال 1 جمع الدوال وطرحها

إذا كان $f(x) = x^2 - 4$, $g(x) = 2x + 1$ ، فأوجد كل دالة فيما يأتي:

$$(f + g)(x) \quad (\text{أ})$$

$$\begin{aligned} \text{جمع دالتين} \quad (f + g)(x) &= f(x) + g(x) \\ \text{وعرض} \quad &= (x^2 - 4) + (2x + 1) \\ \text{بسط} \quad &= x^2 + 2x - 3 \end{aligned}$$

$$(f - g)(x) \quad (\text{ب})$$

$$\begin{aligned} \text{طرح دالتين} \quad (f - g)(x) &= f(x) - g(x) \\ \text{وعرض} \quad &= (x^2 - 4) - (2x + 1) \\ \text{بسط} \quad &= x^2 - 2x - 5 \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

$$f(x) = x^2 + 5x - 2, g(x) = 3x - 2$$

$$(f - g)(x) \quad (\text{1B})$$

$$(f + g)(x) \quad (\text{1A})$$



التقاطع

تقاطع مجموعتين هو
مجموعتين العناصر
المشتركة بين هاتين
المجموعتين، ويرمز له
بالرمز \cap .

مثال 2

إذا كان $4 - f(x) = x^2 + 7x + 12$, $g(x) = 3x$ فأوجد كل دالة مما يأتي:

$$(f \circ g)(x) \quad (a)$$

$$\text{ضرب دالتي} \quad (f \circ g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$\text{عُوض} \quad = (x^2 + 7x + 12)(3x - 4)$$

$$\text{خاصية التوزيع} \quad = 3x^3 + 21x^2 + 36x - 4x^2 - 28x - 48$$

$$\text{بسط} \quad = 3x^3 + 17x^2 + 8x - 48$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) \quad (b)$$

$$\text{قسمة دالتي} \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\text{عُوض} \quad = \frac{x^2 + 7x + 12}{3x - 4}, x \neq \frac{4}{3}$$

بما أن $x = \frac{4}{3}$ يجعل المقام $3x - 4$ يساوي صفرًا، فإن $\frac{4}{3}$ تستثنى من مجال الدالة $(\frac{f}{g})(x)$.

تحقق من فهنك

$$f(x) = x^2 - 7x + 2, g(x) = x + 4$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) \quad (2B)$$

$$(f \circ g)(x) \quad (2A)$$

تركيب دالتي: هي إحدى الطرق التي تستعمل لدمج دالتي. وعند تركيب دالتي فإن قيم دالة منها تستعمل لحساب قيم الدالة الأخرى.

قراءة الرياضيات

تركيب دالتي

يرمز إلى تركيب
الدالتي f و g بالرمز
 $f[g(x)]$ أو $f \circ g$
وتقرأ f بعد g .

مفهوم أساسى

تركيب دالتي


التعبير اللغطي: إذا كانت f و g دالتي و كان مدى g مجموعه جزئية من مجال f .

فإنه يمكن إيجاد دالة التركيب
 $f \circ g$ بالشكل:

$$[f \circ g](x) = f[g(x)]$$

أضف إلى

مطويتك



النموذج:

النحو:

النحو:

يمكن أن يكون تركيب دالتين غير معرف. فإذا كانت f و g دالتين، فإن $(f \circ g)(x)$ يكون معرفًا فقط عند قيمة x التي تجعل $(x) g$ عنصراً في مجال الدالة f . وكذلك تكون الدالة $(x) g \circ f$ معرفة فقط عند قيمة x التي تجعل $(x) f$ عنصراً في مجال الدالة g .

مثال 3 تركيب دالتين

أوجد $(x) f \circ g$ ، لكل زوج من الدوال الآتية، إذا كان ذلك ممكناً:

$$f = \{(1, 8), (0, 13), (14, 9), (15, 11)\}, g = \{(8, 15), (5, 1), (10, 14), (9, 0)\} \quad (\text{ا})$$

لإيجاد $g \circ f$ ، أوجد قيمة $(x) g$ أولاً، ثم استعملها كقيمة من مجال الدالة f لإيجاد $[f \circ g](x)$

$$g(8) = 15$$

$$f[g(8)] = f(15) = 11$$

$$g(10) = 14 \quad f[g(10)] = f(14) = 9$$

$$g(5) = 1$$

$$f[g(5)] = f(1) = 8$$

$$g(9) = 0 \quad f[g(9)] = f(0) = 13$$

$$f \circ g = \{(8, 11), (5, 8), (10, 9), (9, 13)\}$$

إرشادات للدراسة

التركيب

كن حذراً من الخلط

بين عملية تركيب

$f[g(x)]$

وعملية ضرب دالتين

$(f \cdot g)(x)$

لإيجاد $g \circ f$ ، أوجد قيمة $(x) f$ أولاً ثم استعملها كقيمة من مجال الدالة g ، لإيجاد $[f \circ g](x)$

$$f(1) = 8$$

$$g[f(1)] = g(8) = 15$$

$$f(14) = 9 \quad g[f(14)] = g(9) = 0$$

$$f(0) = 13$$

$$g[f(0)] = g(13)$$

$$f(15) = 11 \quad g[f(15)] = g(11)$$

$g(13)$ غير معرفة

$g(11)$ غير معرفة

وبما أن 13 لا يتميّز لمجال الدالة g فإن الدالة $g \circ f$ غير معرفة عند $x = 13$ و $x = 0$ وبما أن

$$g \circ f = \{(1, 15), (14, 0)\} , g[f(1)] = 15 , g[f(14)] = 0$$

$$f(x) = 2x - 5, g(x) = 4x \quad (\text{b})$$

$$[g \circ f](x) = g[f(x)]$$

تعريف تركيب دالتين

$$[f \circ g](x) = f[g(x)]$$

$$= g(2x - 5)$$

عُوض

$$= f(4x)$$

$$= 4(2x - 5)$$

عُوض

$$= 2(4x) - 5$$

$$= 8x - 20$$

بسط

$$= 8x - 5$$

تحقق من فهمك

$$f(x) = \{(3, -2), (-1, -5), (4, 7), (10, 8)\}, g(x) = \{(4, 3), (2, -1), (9, 4), (3, 10)\} \quad (\text{3A})$$

$$f(x) = x^2 + 2, g(x) = x - 6 \quad (\text{3B})$$

لاحظ أنه في معظم الحالات تكون $f \circ g \neq g \circ f$ ؛ لذا فإن ترتيب الدالتين عند تركيبهما مهم.



مثال 4 من واقع الحياة

استعمال تركيب دالتين

سيارات: استعمل تركيب دالتين لحل المسألة الآتية: قدم معرض لبيع السيارات عرضًا بتحفيض 12% من قيمة كل سيارة جديدة. مضافاً إليه خصم مقداره 1500 ريال يقدمه وكيل شركة السيارات. فإذا أراد أحمد شراء سيارة جديدة سعرها 64500 ريال، فهل سيكون السعر النهائي للسيارة أقل إذا طبق التحفيض قبل الخصم أم بعده؟



فهم: المعطيات: • نسبة التحفيض من قيمة كل سيارة 12%， وقيمة الخصم 1500 ريال.

• سعر السيارة التي يريدها أحمد شراءها 64500 ريال.

المطلوب: هل سيكون السعر النهائي للسيارة أقل إذا طبق التحفيض قبل الخصم أم بعده؟

خطط: افترض أن x تمثل السعر الأصلي للسيارة، و $d(x)$ تمثل السعر بعد التحفيض، و $r(x)$ تمثل السعر بعد الخصم؛ إذن $(x) \circ r$ تمثل السعر إذا طبق التحفيض قبل الخصم، و $(x) \circ d$ تمثل السعر إذا طبق الخصم قبل التحفيض.

حل: اكتب معادلين لدالتي التحفيض $d(x)$ ، والخصم $r(x)$.

يتحفيض المعرض 12% من السعر الأصلي للسيارة. فتكون دالة التحفيض

$$d(x) = x - 0.12x = 0.88x$$

يخصم الوكيل 1500 ريال من سعر كل سيارة جديدة؛ لذا فإن دالة الخصم هي:

$$r(x) = x - 1500$$

إذا طُبِّقَ التحفيض قبل الخصم، فإن السعر النهائي للسيارة يُمثَّلُ بـ $[r \circ d](64500)$.

$$[r \circ d](x) = r[d(x)]$$

$$[r \circ d](64500) = r[d(64500)]$$

$$= r[0.88(64500)]$$

$$= r(56760)$$

$$= 56760 - 1500 = 55260$$

أما إذا طُبِّقَ الخصم قبل التحفيض، فإن السعر النهائي للسيارة يُمثَّلُ بـ $[d \circ r](64500)$.

$$[d \circ r](x) = d[r(x)]$$

$$[d \circ r](64500) = d[r(64500)]$$

$$= d(64500 - 1500)$$

$$= d(63000)$$

$$= 0.88(63000)$$

$$= 55440$$

وبما أن $[r \circ d](64500) = 55260$, $[d \circ r](64500) = 55440$.

فإن السعر النهائي للسيارة سيكون أقل عندما يُطبَّقَ التحفيض قبل الخصم.

تحقق: تبدو الإجابة منطقية؛ لأن تحفيضاً نسبته 12% سيتم تطبيقه على قيمة أكبر؛ لذا ستكون قيمة التحفيض أعلى.

تحقق من فهمك

4) تسوق: يقدم محل أجهزة كهربائية عرضين معاً على جهاز كهربائي هما: خصم 35 ريالاً، وتحفيض نسبته 15%， فإذا كان سعر الجهاز الأصلي 300 ريال، فما يعطي سعراً أقل: تطبيق التحفيض قبل الخصم أم بعده؟

الربط مع الحياة

في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2009م، هبطت مبيعات كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية بصورة كبيرة بلغت 53% في أكبر انخفاض لها منذ 42 عاماً، مما اضطر هذه الشركات إلى خفض حجم إنتاجها بمقدار 40%.

المثالان 2 ، 1 أوجد $f(x)$ في كلٌ مما يأتي:

$f(x) = x^2 - 5$ (2)	$f(x) = x + 2$ (1)
$g(x) = -x + 8$	$g(x) = 3x - 1$

مثال 3 أوجد $f \circ g$, $g \circ f$ لكُل زوج من الدوال الآتية، إذا كان ذلك ممكناً:

$f = \{(-5, 4), (14, 8), (12, 1), (0, -3)\}$ (4)	$f = \{(2, 5), (6, 10), (12, 9), (7, 6)\}$ (3)
$g = \{(-2, -4), (-3, 2), (-1, 4), (5, -6)\}$	$g = \{(9, 11), (6, 15), (10, 13), (5, 8)\}$

أوجد $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$ في كلٌ مما يأتي، إذا كان ذلك ممكناً.

$f(x) = x + 4$ (6)	$f(x) = -3x$ (5)
$g(x) = x^2 + 3x - 10$	$g(x) = 5x - 6$

مثال 4 **7) ادخار:** يقطع موظف 8% من راتبه للادخار. ويستطيع الموظف أن يختار بحيث يكون الاقتطاع قبل تسديده قسطاً آخر قيمته 17.5% من الراتب، أو بعده. فإذا كان راتب الموظف قبل الاقتطاع وتسديد القسط 9500 ريال، فهل يكون ادخاره أكثر إذا كان الاقتطاع قبل تسديد القسط أم بعده؟ وضح إجابتك.

تدريب وحل المسائل

المثالان 2 ، 1 أوجد $f(x)$ في كلٌ مما يأتي:

$f(x) = 3x^2 - 4$ (10)	$f(x) = x^2$ (9)	$f(x) = x - 1$ (8)
$g(x) = x^2 - 8x + 4$	$g(x) = -x + 1$	$g(x) = 5x - 2$

11) رياضة المشي: يمشي راشد على ممر متحرك. فإذا كانت سرعته يعبر عنها بالدالة: $I(x) = 3x - 4$ ، وسرعة الممر المتحرك يعبر عنها بالدالة: $W(x) = 4x + 7$ ، حيث x الزمن بالثوانى.

a) ما الدالة التي تعبر عن سرعته الكلية إذا كان يمشي في اتجاه سير الممر المتحرك؟

b) ما الدالة التي تعبر عن سرعته الكلية إذا مشى في عكس اتجاه سير الممر المتحرك؟

مثال 3 أوجد $f \circ g$, $g \circ f$ لكُل زوج من الدوال الآتية، إذا كان ذلك ممكناً:

$f = \{(5, 13), (-4, -2), (-8, -11), (3, 1)\}$ (13)	$f = \{(-8, -4), (0, 4), (2, 6), (-6, -2)\}$ (12)
$g = \{(-8, 2), (-4, 1), (3, -3), (5, 7)\}$	$g = \{(4, -4), (-2, -1), (-4, 0), (6, -5)\}$
$f = \{(-1, 11), (2, -2), (5, -7), (4, -4)\}$ (15)	$f = \{(-4, -14), (0, -6), (-6, -18), (2, -2)\}$ (14)
$g = \{(5, -4), (4, -3), (-1, 2), (2, 3)\}$	$g = \{(-6, 1), (-18, 13), (-14, 9), (-2, -3)\}$

أوجد $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$ في كلٌ مما يأتي، إذا كان ذلك ممكناً:



مثال 4

(19) **صناعة:** ينتج مصنع نوعاً من الفناجين. فإذا كان ثمن بيع x فنجان يُعبر عنه بالدالة: $r(x) = 6.5x$, وتكلفة إنتاج x فنجان يُعبر عنها بالدالة: $c(x) = 0.75x + 1850$.

- (a) اكتب الدالة $p(x)$ التي تعبّر عن ربع المصنع إذا باع x فنجان.
- (b) أوجد ربع المصنع عند بيع 500 فنجان و 1000 فنجان و 5000 فنجان.

(20) **تسوق:** يرغب سامر في شراء تلفاز ذي شاشة مسطحة معروض للبيع بخصم نسبته 35% من السعر الأصلي. فإذا كان سعره الأصلي 2299 ريالاً، ويضاف إليه 6.25% بدل ضمان بعد الخصم.

- (a) اكتب دالتين: الأولى تمثل سعر التلفاز بعد الخصم $p(x)$, والثانية سعر التلفاز بعد إضافة بدل الضمان $t(x)$.

- (b) أيِّ الدالتين الآتتين يمثل سعر التلفاز النهائي: $(x) = [p \circ t](x)$, أم $(x) = [t \circ p](x)$? وضح إجابتك.
- (c) كم سيدفع سامر ثمناً للتلفاز؟

إذا كان $3 - x = f(x) = x^2 + x - 12$, $g(x) = x$. فأوجد كل دالة فيما يأتي، وحدد مجالها:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) \quad (23)$$

$$2(g \cdot f)(x) \quad (22)$$

$$(f - g)(x) \quad (21)$$

إذا كان $8 + 6x = f(x) = 5x$, $g(x) = -2x + 1$, $h(x) = x^2 + 6x$ فأوجد قيمة كل مما يأتي:

$$h[f(9)] \quad (26)$$

$$h[f(-5)] \quad (25)$$

$$g[h(3)] \quad (24)$$

$$g[f(a^2 - a)] \quad (29)$$

$$f[h(a + 4)] \quad (28)$$

$$f[g(3a)] \quad (27)$$



الربط مع الحياة

الخاصية المميزة للشاشات المسطحة HDTV هي أن نسبة عرضها إلى ارتفاعها هي 16:9، فتوفر المشاهد صورة أوضح.

(30) **تمثيلات متعددة:** لتكن: $f(x) = x^2$, $g(x) = x$

(a) **جدولياً:** أنشئ جدولًا يبين بعض قيم الدوال: $(x) = f(x), g(x), (f + g)(x), (f - g)(x)$.

(b) **بيانياً:** مثل بيانياً الدوال $(x) = f(x), g(x), (f + g)(x), (f - g)(x)$ على مستوى إحداثي واحد.

(c) **بيانياً:** مثل بيانياً الدوال $(x) = f(x), g(x), (f + g)(x), (f - g)(x)$ على مستوى إحداثي واحد.

(d) **لفظياً:** صف العلاقة بين التمثيلات البيانية للدوال $(x) = f(x), g(x), (f + g)(x), (f - g)(x)$.

(31) **توظيف:** يمكن التعبير عن عدد الرجال والنساء الذين تم توظيفهم منذ عام 1434 هـ في مؤسسة ما بالمعادلتين الآتتين:

$$\text{عدد الرجال: } y = 7x + 6$$

$$\text{عدد النساء: } y = 5x + 5$$

حيث x تمثل عدد الأعوام منذ عام 1434 هـ، و y تمثل عدد الموظفين.

(a) اكتب دالة تمثل العدد الكلي للرجال والنساء الذين تم توظيفهم منذ عام 1434 هـ.

(b) إذا كانت الدالة f تمثل عدد الرجال الذين تم توظيفهم، والدالة g تمثل عدد النساء اللاتي تم توظيفهن، فماذا تمثل الدالة $(f - g)(x)$ ؟

إذا كان $1 + x = f(x) = x + 2$, $g(x) = -4x + 3$, $h(x) = x^2 - 2x$ فأوجد قيمة كل مما يأتي:

$$\left(\frac{h}{f \cdot g}\right)(-6) \quad (34)$$

$$[(f + g) \cdot h](1) \quad (33)$$

$$(f \cdot g \cdot h)(3) \quad (32)$$

$$[h \circ (f \circ g)](5) \quad (37)$$

$$[g \circ (h \circ f)](-4) \quad (36)$$

$$[f \circ (g \circ h)](2) \quad (35)$$

مسائل مهارات التفكير العليا

(38) **مسألة مفتوحة:** أوجد دالتين $f(x)$, $g(x)$ بحيث يكون $0 = [f \circ g](4)$.

(39) **اكتشف الخطأ:** تقوم ريم والعنود بإيجاد الدالة $[f \circ g](x)$ ، حيث $f(x) = x^2 + 2x - 8$, $g(x) = x^2 + 8$. من منهما إجابتها صحيحة؟ وضح إجابتك.

العنود

$$\begin{aligned}[f \circ g](x) &= f[g(x)] \\&= (x^2 + 8)^2 + 2x - 8 \\&= x^4 + 16x^2 + 64 + 2x - 8 \\&= x^4 + 16x^2 + 2x + 56\end{aligned}$$

ريم

$$\begin{aligned}[f \circ g](x) &= f[g(x)] \\&= (x^2 + 8)^2 + 2(x^2 + 8) - 8 \\&= x^4 + 16x^2 + 64 + 2x^2 + 16 - 8 \\&= x^4 + 18x^2 + 72\end{aligned}$$

(40) **تحدد:** إذا كان $f(x) = \sqrt{x^3}$, $g(x) = \sqrt{x^6}$ فحدد مجال كل من الدالتين الآتيتين:

$[f \circ f](x)$ (ب)

$[g \circ g](x)$ (أ)

(41) **تبسيط:** حدد ما إذا كانت كل من الجملتين الآتيتين صحيحة أحياناً أو صحيحة دائماً أو غير صحيحة أبداً. وفسّر إجابتك.

(أ) يكون مجال الدالة $[f \circ g](x)$ هو نفس مجال الدالة f أو جزءاً منه.

(ب) يكون مجال الدالة $[f \circ g](x)$ هو نفس مجال الدالة g أو جزءاً منه.

(42) **اكتسب:** وضح لماذا نقوم بتركيب دالتين. وأعطي مثلاً من واقع الحياة يمكنك حلّه باستعمال تركيب دالتين.

تدريب على اختبار

$f(x) = 2x + 4$, $g(x) = x^2 + 5$ (44) إذا كان

فإن قيمة $[f \circ g](6)$ تساوي:

38 A

43 B

86 C

261 D

(43) إذا كان $g(x) = x^2 + 9x + 21$, $h(x) = 2(x + 5)^2$

فما الدالة المكافئة للدالة $h(x) - g(x)$ ؟

$k(x) = -x^2 - 11x - 29$ A

$k(x) = x^2 + 11x + 29$ B

$k(x) = x + 4$ C

$k(x) = x^2 + 7x + 11$ D

مراجعة تراكمية

اذكر العدد الممكن للأصفار الحقيقة الموجبة، والحقيقة السالبة، والتخيلية، لكل من الدوال الآتية: (مهارة سابقة)

$f(x) = 2x^4 - 3x^3 - 2x^2 + 3$ (46)

$f(x) = 2x^4 - x^3 + 5x^2 + 3x - 9$ (45)

(47) صندوق أبعاده 12in, 16in, 18in . ما المقدار الثابت من الطول الذي يجب إضافته إلى كل بعد من أبعاده، ليصبح حجمه

? 5985in^3 (مهارة سابقة)

حل كل معادلة فيما يأتي، بالنسبة للمتغير المبين إزاء كل منها: (مهارة سابقة)

$(x + 2)^2 - (y + 5)^2 = 4$, y (50)

$3x^2 - 6xy + 1 = 4$, y (49)

$5x - 7y = 12$, x (48)



4-2

العلاقات والدوال العكسية Inverse Functions and Relations



رابط المدرس الرقمي



للماذرة
يبين الجدول المجاور قيمة الريال السعودي مقارنة بالدولار الأمريكي، والدالة $r = 0.267$ تمثل عدد الدولارات التي تحصل عليها مقابل كل ريال سعودي، ولمعرفة عدد الريالات التي تحصل عليها مقابل كل دولار أمريكي، حل المعادلة السابقة بالنسبة للمتغير r فتكون النتيجة $d \approx 3.75$ وتمثل دالة عكسية للدالة السابقة.

أمريكا	السعودية
0.267	
	3.75

إيجاد العلاقة العكسية: تذكر أن العلاقة هي مجموعة من الأزواج المرتبة. **والعلاقة العكسية** هي مجموعة من الأزواج المرتبة، يمكنك الحصول عليها عن طريق تبديل إحداثيات كل زوج مرتب في العلاقة، فيصبح مجال العلاقة هو مدى العلاقة العكسية لها، ومداها هو مجال العلاقة العكسية لها.

أضف إلى
مطوبتك

العلاقة العكسية

مفهوم أساسى

التعبير اللغوي: تكون كل من العلاقاتتين عكسية للأخرى إذا وفقط إذا تحقق الشرط التالي:
كلما احتوت إحداهما على زوج مرتب (a, b) ، احتوت الأخرى على الزوج المرتب (b, a) .

مثال: كل من العلاقاتين A, B علاقة عكسية للأخرى:

$$A = \{(1, 5), (2, 6), (3, 7)\} \quad B = \{(5, 1), (6, 2), (7, 3)\}$$

فيما سبق

درست كتابة معادلات بالنسبة لمتغير محدد وحلها.

والآن

- أجد كلاً من العلاقة العكسية والدالة العكسية.
- أحدد ما إذا كانت علاقة (أو دالة) تمثل علاقة عكسية (أو دالة عكسية) لأخرى أم لا.


المفردات

العلاقة العكسية
inverse relation
الدالة العكسية
inverse function

مثال 1 إيجاد العلاقة العكسية

هندسة: يمكن تمثيل رؤوس $\triangle ABC$ بالعلاقة $\{(1, -2), (2, 5), (4, -1)\}$.

أوجد العلاقة العكسية لها، ثم مثل بيانياً العلاقة والعلاقة العكسية لها على مستوى إحداثي واحد، واذكر التحويل الهندسي الذي يحوّل العلاقة المعطاة إلى العلاقة العكسية لها.



مثل العلاقة بيانياً. ولإيجاد العلاقة العكسية قم بتبديل إحداثيات الأزواج المرتبة. فتكون العلاقة العكسية هي: $\{(-1, 4), (-2, 1), (2, 5)\}$. وبتمثيل

هذه الأزواج المرتبة للعلاقة العكسية بيانياً يتضح أنها تمثل رؤوس $\triangle A'B'C'$ بعد انعكاس رؤوس $\triangle ABC$ حول المستقيم $x = y$.

تحقق من فهمك

1) هندسة: إذا كانت الأزواج المرتبة للعلاقة $\{(-3, -8), (-6, -3), (-8, -6), (-3, -8)\}$ ، تمثل إحداثيات رؤوس مثلث قائم الزاوية. فأوجد العلاقة العكسية لها، وصف تمثيلها البياني.

إن ما ينطبق على الأزواج المرتبة في العلاقة والعلاقة العكسية، ينطبق أيضاً على الأزواج المرتبة في الدالة ومعكوسها، وإذا كان معكوس الدالة يمثل دالة أيضاً، فإنه يسمى **دالة عكسية**. ويرمز إلى الدالة العكسية للدالة $f(x)$ بالرمز $f^{-1}(x)$.

مفهوم أساسى

خواص الدالة العكسية

أضف إلى
مطويتك

التعبير اللغطي: إذا كان كل من f, f^{-1} دالة عكسية للأخرى، فإن $b = f(a)$ إذا وفقط إذا كان $a = f^{-1}(b)$.

مثال: لين $4 - x = f(x)$ دالتها العكسية هي $x + 4 = f^{-1}(x)$.

أوجد $f(2) = f(6)$.

$$f^{-1}(x) = x + 4 \quad f(x) = x - 4$$

$$f^{-1}(2) = 2 + 4 = 6 \quad f(6) = 6 - 4 = 2$$

وبما أن كلاً من $f(x), f^{-1}(x)$ دالة عكسية للأخرى، فإن $6 = f^{-1}(2)$.

قراءة الرياضيات



الدالة العكسية

f^{-1} يقرأ الدالة

العكسية للدالة f . تذكر

أن (-1) ليس أثناً.

اختبار الخط الأفقي: إذا كان معكوس دالة يمثل دالة أيضاً، فإن الدالة الأصلية تكون دالة متباينة. تذكر أنه يمكنك استعمال اختبار الخط الرأسي لمعرفة ما إذا كانت العلاقة تمثل دالة أم لا. وبالمثل يمكنك استعمال اختبار الخط الأفقي لتحديد ما إذا كان معكوس دالة يمثل دالة أم لا.



يمكن رسم مستقيم أفقي يقطع منحني الدالة، في أكثر من نقطة (الدالة ليست متباينة)، لذا لا يكون معكوس الدالة $y = g(x)$ دالة.

لا يمكن رسم أي مستقيم أفقي يقطع منحني الدالة في أكثر من نقطة (الدالة متباينة)، لذا يمثل معكوس الدالة $y = f(x)$ دالة أيضاً.

يمكنك إيجاد معكوس دالة بالتبديل بين x و y في قاعدة الدالة.

ايجاد معكوس الدالة وتمثيله بيانيًا

مثال 2

أوجد معكوس كلٌ من الدالتين الآتتين، ثم مثل الدالة ومعكوسها بيانيًا على مستوى إحداثي واحد.

$$f(x) = 2x - 5 \quad (a)$$

الخطوة 1: أعد كتابة الدالة كمعادلة بدلالة المتغيرين x, y

$$f(x) = 2x - 5 \rightarrow y = 2x - 5$$

الخطوة 2: بدل بين كلٌ من المتغير x والمتغير y في المعادلة $5 - 2y = x$

الخطوة 3: حل المعادلة بالنسبة للمتغير y .

$$x = 2y - 5$$

اضف 5 للطرفين

$$x + 5 = 2y$$

قسم الطرفين على 2

$$\frac{x + 5}{2} = y$$


الخطوة 4: ضع $(x - 5)/2$ بدلاً من المتغير y ، إذا كان المعكوس دالة.

بما أن الدالة $f(x)$ خطية، وباستعمال اختبار الخط الأفقي، تجد أن معكوسها هو دالة أيضاً، لذا يمكنك استعمال الرمز $f^{-1}(x)$.

$$y = \frac{x + 5}{2} \rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{2}$$

فتكون الدالة العكسية للدالة $f(x) = 2x - 5$ هي $f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{2}$

والتمثيل البياني للدالة $f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{2}$ هي انعكاس للتمثيل البياني للدالة $f(x) = 2x - 5$ حول المستقيم $x = y$.



إرشادات للدراسة


رمز الدالة العكسية

بما أن معكوس الدالة $f(x)$ في الفرع a من المثال 2 هو دالة أيضاً، لذا تم التعبير عنها بـ $f^{-1}(x)$.

ارشادات للدراسة

الدوال

معكوس الدالة f في الفرع b لا يمثل دالة؛ لأنّه لا يحقق اختبار الخط الرأسي، أو لأنّ الدالة f لا تحقق اختبار الخط الأفقي.



اطرح 1 من كلا الطرفين

$$x = y^2 + 1$$

$$f(x) = x^2 + 1 \quad (\mathbf{b})$$

الخطوة 1:

$$x - 1 = y^2$$

الخطوة 2:

$$\pm\sqrt{x - 1} = y$$

الخطوة 3:

$$y = \pm\sqrt{x - 1} \quad (\text{خطوة 4:})$$

مثّل بيانياً $\pm\sqrt{x - 1} = y$ بإجراء انعكاس لمنحنى الدالة $f(x) = x^2 + 1$ حول المستقيم $y = x$.

تحقق من فهمك

$$f(x) = 3x^2 \quad (\mathbf{2B})$$

$$f(x) = \frac{x - 3}{5} \quad (\mathbf{2A})$$

التأكيد من الدالة العكسية: يمكنك تحديد ما إذا كانت دالتان، كلّ منها تمثل دالة عكسية للأخرى أم لا، وذلك بإيجاد كلّ من تركيبيهما.

أضف إلى
مطويتك

الدالة العكسية

مفهوم أساسى

التعبير اللفظي: تكون كلّ من الدالتين f, g دالة عكسية للأخرى، إذا وفقط إذا كان تركيب كلّ منها يساوي الدالة المحايدة $I(x) = x$.

الرموز: الدالتان (x) , $f(x), g(x)$ كلّ منها تمثل دالة عكسية للأخرى، إذا وفقط إذا كان $[g \circ f](x) = [f \circ g](x) = x$

التأكيد أن كل دالة تمثل دالة عكسية للأخرى

مثال 3

في كل زوج ممّا يأتي حدد هل كل دالة تمثل دالة عكسية للأخرى أم لا؟ ووضح إجابتك.

$$f(x) = 3x + 9, g(x) = \frac{1}{3}x - 3 \quad (\mathbf{a})$$

تأكد بأن تركيب الدالتين $f(x), g(x)$ يساوي الدالة المحايدة.

$$\begin{aligned} [g \circ f](x) &= g[f(x)] \\ &= g(3x + 9) \\ &= \frac{1}{3}(3x + 9) - 3 \\ &= x + 3 - 3 = x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [f \circ g](x) &= f[g(x)] \\ &= f\left(\frac{1}{3}x - 3\right) \\ &= 3\left(\frac{1}{3}x - 3\right) + 9 \\ &= x - 9 + 9 = x \end{aligned}$$

إذن تمثل كلّ من الدالتين دالة عكسية للأخرى؛ لأن $x = [f \circ g](x) = [g \circ f](x)$.

$$f(x) = 4x^2, g(x) = 2\sqrt{x} \quad (\mathbf{b})$$

$$\begin{aligned} [f \circ g](x) &= f[g(x)] = f(2\sqrt{x}) \\ &= 4(2\sqrt{x})^2 \\ &= 4(4x) = 16x \end{aligned}$$

بما أن $x \neq [f \circ g](x)$ ، فإن الدالتين $f(x)$ و $g(x)$ لا تمثل كلّ منها دالة عكسية للأخرى.

تنبيه!

الدالة العكسية

تأكد أن التركيبين $[f \circ g](x)$ و $[g \circ f](x)$ يساوي كلّ منها الدالة المحايدة $I(x) = x$ ؛ وذلك لتكون كلّ من الدالتين دالة عكسية للأخرى.

تحقق من فهمك

$$f(x) = 2x^3 - 1, g(x) = \sqrt[3]{\frac{x+1}{2}} \quad (\mathbf{3B})$$

$$f(x) = 3x - 3, g(x) = \frac{1}{3}x + 4 \quad (\mathbf{3A})$$

أوجد العلاقة العكسية لكلٌ من العلاقات الآتية:

$\{(-2, 9), (4, -1), (-7, 9), (7, 0)\}$ (2)

$\{(-9, 10), (1, -3), (8, -5)\}$ (1)

أوجد معكوس كلٌ من الدوال الآتية، ثم مثل الدالة ومعكوسها بيانياً على مستوى إحداثي واحد:

$h(x) = x^2 - 3$ (5)

$g(x) = 4x - 6$ (4)

$f(x) = -3x$ (3)

في كل زوج ممَّا يأتي، حدد هل كل دالة تمثل دالة عكسية للأخرى أم لا؟ ووضح إجابتك.

$f(x) = 2x^3$ (8)

$f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}$ (7)

$f(x) = x - 7$ (6)

$g(x) = \frac{1}{3}\sqrt{x}$

$g(x) = 2x - \frac{4}{3}$

$g(x) = x + 7$

مثال 1

مثال 2

مثال 3

تدريب وحل المسائل

أوجد العلاقة العكسية لكلٌ من العلاقات الآتية:

$\{(3, 0), (5, 4), (7, -8), (9, 12), (11, 16)\}$ (10)

$\{(1, -5), (2, 6), (3, -7), (4, 8), (5, -9)\}$ (9)

أوجد معكوس كل من الدوال الآتية، ثم مثل الدالة ومعكوسها بيانياً على مستوى إحداثي واحد:

$l(x) = -2x + 1$ (13)

$g(x) = 5x$ (12)

$f(x) = x + 2$ (11)

$h(x) = x^2 + 4$ (16)

$k(x) = -\frac{5}{3}x - 8$ (15)

$h(x) = \frac{x - 4}{3}$ (14)

$f(x) = (x + 1)^2 + 3$ (19)

$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 1$ (18)

$f(x) = 5x^2$ (17)

في كل زوج ممَّا يأتي، حدد هل كل دالة تمثل دالة عكسية للأخرى أم لا؟ ووضح إجابتك.

$f(x) = \frac{x + 10}{8}$ (22)

$f(x) = -\frac{1}{3}x + 3$ (21)

$f(x) = 2x + 3$ (20)

$g(x) = 8x - 10$

$g(x) = -3x + 9$

$g(x) = 2x - 3$

$f(x) = 2\sqrt{x - 5}$ (25)

$f(x) = (x + 6)^2$ (24)

$f(x) = \frac{2}{3}x^3$ (23)

$g(x) = \frac{1}{4}x^2 - 5$

$g(x) = \sqrt{x} - 6$


$g(x) = \sqrt{\frac{2}{3}x}$

مثال 1

مثال 2

مثال 3

(26) **وقود:** إذا كان عدد الكيلومترات التي تقطعها سيارة فهد لكل لتر من البنزين يُعبر عنه بالدالة $l(l) = 12l$ ، وكان سعر اللتر كما هو موضح في الشكل المجاور.



(a) أوجد الدالة $l(l)$ التي تمثل سعر لترات البنزين

(b) أوجد دالة تمثل سعر الوقود المستهلك في الكيلو متر الواحد، مستعملاً فكرة الدالة العكسية.

(27) **هندسة:** يُعبر عن مساحة الدائرة بالدالة $A = \pi r^2$.

(a) أوجد معكوس الدالة.

(b) استعمل المعكوس لإيجاد نصف قطر دائرة مساحتها 36cm^2 .



استعمل اختبار الخط الأفقي لتحديد ما إذا كان معكوس كل دالة من الدوال الآتية دالة أيضاً أم لا:

$$g(x) = 3x + 7 \quad (30)$$

$$h(x) = 2x^2 \quad (29)$$

$$f(x) = x^3 - 8 \quad (28)$$

(31) **درجات الحرارة:** تستعمل الصيغة $F(x) = \frac{9}{5}x + 32$ للتحويل من درجة الحرارة السيليزية إلى درجة الحرارة الفهرنهايتية.

(a) أوجد $F^{-1}(x)$. ثم بيّن أن $F^{-1}(x)$ و $F(x)$ تمثل كلّ منها دالة عكسية للأخرى.

(b) فيم تستعمل $F^{-1}(x)$ ؟

. (32) **تمثيلات متعددة:** تأمل الدالة $y = x^n$, حيث $n = 0, 1, 2, \dots$

(a) **بيانياً:** مثل الدوال $x^n = y$ بيانياً للقيم $n = 0, 1, 2, 3, 4$.

(b) **جدولياً:** ما قيمة n التي تجعل معكوس هذه الدوال دوال أيضاً؟ سجل نتائجك في جدول.

(c) **تحليلياً:** استنتج قيمة n التي يكون عندها معكوس الدوال $x^n = f(x)$ دوال أيضاً، على فرض أن n عدد كلي.

مسائل مهارات التفكير العليا

(33) **تبسيط:** حدد ما إذا كانت الجملة الآتية صحيحة دائماً، أو صحيحة أحياناً، أو غير صحيحة أبداً. ووضح إجابتك.

"إذا كانت العلاقة لا تمثل دالة، فإن معكوسها لا يمثل دالة أيضاً."

(34) **مسألة مفتوحة:** أعطِ مثالاً على دالة، ودالتها العكسية . وتحقق من أن كلاً منها دالة عكسية للأخرى.

(35) **تحدّ:** أعطِ مثالاً على دالة معكوسها الدالة نفسها.

(36) **اكتب:** إذا كان لديك تركيب لـ $f(x)$ ، كل منهما دالة عكسية للأخرى. فلماذا تكون قيمة تركيب الدالتين عند العدد 5 تساوي العدد 5 دائماً؟

تدريب على اختبار

? $f(x) = \frac{3x - 5}{2}$ (38) أيُّ الدوال الآتية هي دالة عكسية للدالة:

$g(x) = 2x + 5 \quad \mathbf{C}$

$g(x) = \frac{2x + 5}{3} \quad \mathbf{A}$

$g(x) = \frac{2x - 5}{3} \quad \mathbf{D}$

$g(x) = \frac{3x + 5}{2} \quad \mathbf{B}$

(37) إذا كان $1 + x$, $f(x) = x^2 + 3$, $g(x) = -x$, فأيُّ مما يأتي يمثل

? $f[g(x)]$

$-x^3 + x^2 - 3x + 3 \quad \mathbf{C}$

$x^2 - x + 2 \quad \mathbf{A}$

$x^2 - 2x + 4 \quad \mathbf{D}$

$-x^2 - 2 \quad \mathbf{B}$

مراجعة تراكمية

إذا كان $1 - x$, $f(x) = 3x + 5$, $g(x) = x - 2$, $h(x) = x^2$ ، فأوجد قيمة كلّ مما يأتي: (الدرس: 4-1)

$h[g(1)] \quad (41)$

$f[h(-2)] \quad (40)$

$g[f(3)] \quad (39)$

(42) **مساحة:** قطعة أرض على شكل شبه منحرف، طول قاعدتها الأطول يزيد بمقدار 8 ft على 3 أمثال طول قاعدتها الأقصر، ويزيد ارتفاعها قدمًا واحدةً على 3 أمثال طول قاعدتها الأقصر. ما أبعاد قطعة الأرض إذا كانت مساحتها 4104ft^2 ? (مهارة سابقة)

بسط كلاً مما يأتي: (مهارة سابقة)

$\frac{4 - 3i}{1 + 2i} \quad (46)$

$\frac{1+i}{1-i} \quad (45)$

$(\sqrt{6} + i)(\sqrt{6} - i) \quad (44)$

$(3 + 4i)(5 - 2i) \quad (43)$

الدالة العكسية


4-2



الهدف

أقارن دالة بمعكوسها
باستعمال الحاسبة
.TI-nspire
البيانية

يمكنك استعمال الحاسبة البيانية TI-nspire لمقارنة دالة بمعكوسها، باستعمال التمثيلات البيانية.



نشاط 1 تمثيل المعكوس بيانيًا باستعمال الأزواج المربطة

مثل الدالة: $\{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8), (5, 10), (6, 12)\}$ ومعكوسها بيانيًّا.


الخطوات:

- افتح الآلة الحاسبة بالضغط على .
- من الشاشة الظاهرة اختر ، ومنها اختر فيظهر جدول إلكتروني.
- اكتب في أعلى العمود الرمز ثم اضغط ، وابحث في أعلى العمود الرمز ثم اضغط .
- أدخل قيم x في العمود بالترتيب، وقيم y في العمود .
- اضغط مفتاح واختر من الشاشة الظاهرة ، ثم اضغط فيظهر أمامك مستوى إحداثي، ثم اضغط على واختر منها ومنها اختر ، فتظهر شاشة تتضمن مستوى إحداثيًّا أسفله إشارة لقيم x , y .
- اضغط مفتاح واختر الموجودة عند x ثم تحرك بالسهم عند y ، ثم اضغط مفتاح مرّة ثانيةً واختر ، ثم اضغط .
- اضغط ، ثم أعد الخطوة السابقة باختيار عند x ، و عند y ثم اضغط .
- اضغط ثم اختر منها ومنها اختر ومنها ، ثم أدخل الدالة $x = f_1(x)$ ثم اضغط .
- لإظهار الشكل كاملاً اضغط ومنها واختر منها ثم اختر .

نشاط 2 تمثيل المعكوس بيانيًا باستعمال صيغة الدالة

مثل الدالة $x = 3x$ ودالتها العكسية $g(x) = \frac{x}{3}$ بيانيًّا.

يمكن استعمال الآلة في تمثيل الدالة ومعكوسها بالضغط على المفاتيح من اليمين إلى اليسار:



ثم كتابة الدالتين $f_1(x) = 3x$, $f_2(x) = \frac{x}{3}$ كما مرّ سابقاً، ارسم المعادلة $x = y$ بالضغط على ثم اختر ومنها اختر ثم أدخل المعادلة $x = y$ ، فيظهر التمثيل المطلوب.

تمارين: مثل بيانيًّا كلاً من الدالة $f(x)$ ، ومعكوسها (f^{-1}) ، و $(f \circ g)$ في كلٍ مما يأتي:

$$f(x) = 2x + 1 \quad (3)$$

$$f(x) = x - 3 \quad (2)$$

$$f(x) = 5x \quad (1)$$

$$f(x) = x^2 - 3 \quad (6)$$

$$f(x) = x^2 \quad (5)$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x + 3 \quad (4)$$

ما العلاقة بين التمثيل البياني لدالة والتمثيل البياني لمعكوسها؟

8 خمن: ماذا يساوي $(f \circ g)(x)$ لأي دالة $f(x)$ ودالتها العكسية $(f^{-1})(x)$ ؟



دوال ومتباينات الجذر التربيعي

Square Root Functions and Inequalities

4-3



المادة

يُمثل الزمن الدوري للبندول بدالة الجذر التربيعي: $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ حيث T الزمن الدوري بالثاني، L طول البندول بالأقدام، g تسارع السقوط الحر، الذي يساوي 32 قدمًا لكل ثانية مربعة.

فيما سبق

درست تبسيط عبارات تحتوي جذوراً تربيعية.
(مهارة سابقة)

والآن

- أمثل بيانياً دوال الجذور التربيعية وأحللها.
- أمثل بيانياً متباينات الجذور التربيعية.

المفردات

دالة الجذر التربيعي
square root function


الدالة الجذرية
radical function

متباينة الجذر التربيعي
square root inequality

أضف إلى
مطويتك

الدالة الرئيسية (الأم) لدوال الجذر التربيعي

مفهوم أساسى



الدالة الرئيسية (الأم): $f(x) = \sqrt{x}$

المجال: $\{x | x \geq 0\}$

المدى: $\{f(x) | f(x) \geq 0\}$

المقطوعان: $x = 0, f(x) = 0$

غير معروفة عندما: $x < 0$

سلوك الدالة عند طرفيها: $x \rightarrow 0, f(x) \rightarrow 0$

$x \rightarrow +\infty, f(x) \rightarrow +\infty$

مجال دالة الجذر التربيعي محدد بالقيم التي تكون عندها الدالة معروفة.

تعيين المجال والمدى

مثال 1

عين كلاً من المجال والمدى للدالة: $f(x) = \sqrt{x+4}$.

وبما أن $0 \geq \sqrt{x+4}$ دائمًا، وتزيد قيم الدالة بتزايده قيم x ، فإن أقل قيمة للدالة تكون عندما $x+4=0$; أي عندما $x=-4$; لذا فإن $(-4, \infty)$ تمثل الحد الأدنى للمدى.

$$(f(-4) = \sqrt{-4+4} = 0)$$

لذلك، فالمدى هو $\{f(x) | f(x) \geq 0\}$.

مجال دالة الجذر التربيعي يشمل فقط القيم التي يكون ما تحت الجذر عندها غير سالب.

$$\text{اكتب المتباينة: } x+4 \geq 0$$

$$\text{اطرح 4 من الطرفين: } x \geq -4$$

وبالتالي فالمجال هو: $\{x | x \geq -4\}$.

تحقق من فهمك

$$f(x) = \sqrt{x+6} + 2 \quad (1B)$$


$$f(x) = \sqrt{x-3} \quad (1A)$$



يمكنك تمثيل دالة الجذر التربيعي بيانيًّا، بتحديد القيم الصغرى لها، وعمل جدول لبعض قيم x وقيم $f(x)$ المقابلة لها.

مثال 2 تمثيل دوال الجذر التربيعي بيانيًّا


مثل كل دالة مما يأتي بيانيًّا، وحدّد مجالها ومداها:



x	y
2	5
3	6
4	6.4
5	6.7
6	7
7	7.2
8	7.4

$$y = \sqrt{x - 2} + 5 \quad (\text{a})$$

القيمة الصغرى للدالة عند $(2, 5)$. اعمل جدولًا من قيم x ، حيث $2 \leq x$ ، ومثل الدالة بيانيًّا. لاحظ سلوك الدالة عند الأطراف، فكلما زادت x ، زادت y . المجال هو $\{x | x \geq 2\}$ ، والمدى هو $\{y | y \geq 5\}$.



x	y
-3	-1
-2	-3
-1	-3.8
0	-4.5
1	-5
2	-5.5
3	-5.9

$$y = -2\sqrt{x + 3} - 1 \quad (\text{b})$$

القيمة الصغرى لمجال الدالة هي -3 . اعمل جدولًا من قيم x ، حيث $-3 \leq x$ ، ومثل الدالة بيانيًّا. المجال هو $\{x | x \geq -3\}$ ، والمدى هو $\{y | y \leq -1\}$.

تحقق من فهمك

$$f(x) = -3\sqrt{x - 1} + 2 \quad (\text{2B})$$

$$f(x) = 2\sqrt{x + 4} \quad (\text{2A})$$


استعمال التمثيل البياني لتحليل دوال الجذر التربيعي

مثال 3 من واقع الحياة

فيزياء: بالرجوع إلى فقرة لماذا؟ بداية هذا الدرس، يمكنك تحديد الزمن الدوري للبندول T بالثانوي

باستعمال الدالة $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{32}}$ حيث تمثل L طول البندول بالأقدام.

(a) مثل هذه الدالة بيانيًّا في الفترة $10 \leq L \leq 0$.



L	T
0	0
2	1.57
4	2.22
6	2.72
8	3.14
10	3.51

إرشادات حل المسألة

عمل جدول

يعد عمل جدول طريقة
جيدة لترتيب الأزواج
المترتبة؛ دراسة سلوك
التمثيل البياني للدالة.

(b) ما الزمن الدوري إذا كان طول البندول 8 أقدام؟

بناءً على التمثيل البياني والجدول فإن الزمن الدوري يكون 3.14 ثوانٍ تقريبًا.



تحقق من فهمك

(3) صوت: يمكن تحديد تردد اهتزازات وتر مشدود باستعمال الدالة: $f = 200\sqrt{m_t}$, حيث f تمثل عدد الاهتزازات في الثانية، m_t كتلة ثقل قوة الشد مقيسة بالرطل. مثل هذه الدالة بيانيًا في الفترة $0 \leq m_t \leq 10$. ثم أوجد التردد عندما تكون قوة الشد 3 أرطال.

متباينة الجذر التربيعي: متباينة الجذر التربيعي هي متباينة تحتوي الجذر التربيعي. ويمكن تمثيلها بيانيًا تماماً مثل طريقة تمثيل المتباينات الأخرى.

تمثيل متباينة الجذر التربيعي بيانيًا

مثال 4

مثل المتباينة $6 - \sqrt{x - 4} < y$ بيانيًا.

مثل الحد $6 - \sqrt{x - 4} = y$ بيانيًا.


المجال هو $\{x | x \geq 4\}$. وبما أن المتباينة تحوي « y أقل من»، فإن التمثيل البياني للمتباينة هو المنطقة المظللة تحت الحد، وضمن المجال.

تحقق: اختر نقطة في المنطقة المظللة، وتأكد أنها تحقق المتباينة.

$$\text{اختبار } (-5, -5) : 6 - \sqrt{7 - 4} - 6 = -5$$

$$-5 > \sqrt{3} - 6$$

✓ $-5 > -4.27$



تحقق من فهمك

$$f(x) < -\sqrt{x + 2} - 4 \quad (4B)$$

$$f(x) \geq \sqrt{2x + 1} \quad (4A)$$

تأكد

مثال 1 عين المجال والمدى لكل دالة فيما يأتي:

$$f(x) = \sqrt{x + 8} - 2 \quad (3)$$

$$f(x) = \sqrt{x - 5} \quad (2)$$

$$f(x) = \sqrt{4x} \quad (1)$$

مثال 2 مثل كل دالة مما يأتي بيانيًا، وحدد مجالها ومداها:

$$f(x) = 3\sqrt{x - 1} \quad (5)$$

$$f(x) = \sqrt{x} - 2 \quad (4)$$

$$f(x) = -\sqrt{3x - 5} + 5 \quad (7)$$

$$f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x + 4} - 1 \quad (6)$$

مثال 3 **(8) محيطات:** يمكن تمثيل سرعة موجات تسونامي باستعمال الدالة: $v = 356\sqrt{d}$, حيث تمثل v السرعة بالكميلومترات لكل ساعة، و d متوسط عمق الماء بالكميلومترات. إذا كانت سرعة الموجة 145 km/h , فما متوسط عمق الماء؟ قرب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة من الكيلومتر.

مثال 3

مثال 4 مثل كل متباينة مما يأتي بيانيًا:

$$f(x) \leq \sqrt{x - 6} + 2 \quad (10)$$

$$f(x) \geq \sqrt{x} + 4 \quad (9)$$

$$f(x) > \sqrt{2x - 1} - 3 \quad (12)$$

$$f(x) < -2\sqrt{x + 3} \quad (11)$$



تدريب وحل المسائل

عُين المجال والمدى لكل دالة فيما يأتي:

$$f(x) = 4\sqrt{x-2} - 8 \quad (15)$$

$$f(x) = \sqrt{x} - 6 \quad (14)$$

$$f(x) = -\sqrt{2x} + 2 \quad (13)$$

مثال 1

مثل كل دالة مما يأتي بيانياً، وحدد مجالها ومداها:

$$f(x) = \sqrt{x+1} \quad (18)$$

$$f(x) = -\sqrt{5x} \quad (17)$$

$$f(x) = \sqrt{6x} \quad (16)$$

$$f(x) = -3\sqrt{x+7} + 9 \quad (21)$$

$$f(x) = \frac{3}{4}\sqrt{x+12} + 3 \quad (20)$$

$$f(x) = \sqrt{x-4} - 10 \quad (19)$$

مثال 2

(22) **القفز بالمظلات:** إذا كان الزمن التقريري t بالثواني، اللازم لسقوط جسم من ارتفاع d بالأقدام يعطى

بالدالة $t = \sqrt{\frac{d}{16}}$ ، فإذا قفز مظلي قبل 11 ثانية من فتح المظلة، فكم قدماً هبط المظلي خلال هذا الزمن؟

(23) **ألعاب:** إذا كانت سرعة العربة الدوارة V في مدينة الألعاب في أثناء نزولها من أعلى قمة تعطى بالدالة:

$$V = \sqrt{v_0^2 + 64h}$$

مصمم اللعبة أن تكون سرعة العربة 90 ft/s عندما تصل أدنى مستوى لها.

(a) إذا كانت السرعة الابتدائية للعربة عند القمة هي 10 ft/s ، فاكتب معادلة تمثل ذلك الموقف.

(b) حتى يتحقق ما يريد المصمم، كم يجب أن يكون ارتفاع القمة، إذا كانت سرعة العربة الابتدائية عند القمة 10 ft/s ؟

مثل كل متباعدة مما يأتي بيانياً:

$$y > \sqrt{x+6} \quad (25)$$

$$y < \sqrt{x-5} \quad (24)$$


$$y > 2\sqrt{x+7} - 5 \quad (27)$$

$$y \geq -4\sqrt{x+3} \quad (26)$$

$$y \leq 6 - 3\sqrt{x-4} \quad (29)$$

$$y \geq 4\sqrt{x-2} - 12 \quad (28)$$

مثال 4



(30) **قيادة:** تستطيع إدارة المرور بعد كل حادث سير، تحديد سرعة السيارة قبل ضغط السائق على الكوابح (الفرامل) وذلك باستعمال الدالة: $v = \sqrt{30fd}$ ، حيث v تمثل السرعة بالأميال لكل ساعة، f معامل الاحتكاك الذي يصف حالة سطح الطريق، d طول أثر احتكاك العجلات بالأقدام. بما أن معامل الاحتكاك يعتمد على حالة الطريق، افترض أن $f = 0.6$.

(a) أوجد سرعة سيارة طول أثر احتكاك عجلاتها بالأرض 25 ft .

(b) إذا كانت سيارتك تسير بسرعة 35 mil/h ، فكم قدماً تحتاج لتوقف وقوفاً تاماً؟

(c) إذا تضاعفت سرعة سيارة مرة واحدة، فهل يتضاعف طول أثر احتكاك العجلات بالأرض عند الوقف المفاجئ مرة واحدة؟ وضح إجابتك.

توصلت دراسة إلى أن السبب الأول لحوادث السيارات بين أوساط الشباب يعود إلى استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة.





مسائل مهارات التفكير العليا

(32) **تحدد:** اكتب معادلة لدالة جذر تربيعي مجالها $\{x | x \geq -4\}$ ، ومداها $\{y | y \leq 6\}$ ، وتمر بالنقطة $(5, 3)$.


(33) **تبرير:** ما قيمة a الصحيحة الموجبة التي يجعل مجال ومدى الدالة $f(x) = \sqrt{ax} + 15$ مجموعه الأعداد الحقيقية (R) ؟

(34) **اكتب:** وضح لماذا لا تمثل $y = \pm \sqrt{x}$ دالة؟

(35) **اكتشف الخطأ:** مثل كل من عبد الرحمن وعبد العزيز المتباينة $\sqrt{5x + 15} \leq y$. فما إجابته صحيحة؟ بُرر إجابتك.



تدريب على اختبار



III D I, II, III C فقط II, III B

فقط I A

(37) يمثل الشكل المجاور التمثيل البياني لدالة جذر تربيعي. فأي مما يأتي صحيح؟

(I) المجال هو مجموعه الأعداد الحقيقية

(II) الدالة هي $y = \sqrt{x} + 3.5$

(III) المدى هو $\{y | y \geq 3.5\}$ تقريباً

(36) أي مما يأتي يكافئ العبارة $x \neq 0$:

$$8x^2 \quad \mathbf{A}$$

$$8x^3 \quad \mathbf{B}$$

$$-8x^2 \quad \mathbf{C}$$

$$-8x^3 \quad \mathbf{D}$$

مراجعة تراكمية

في كل زوج مما يأتي حدد هل كل دالة تمثل دالة عكسية للأخرى، أم لا؟ (الدرس: 4-2)

$$f(x) = \frac{3x + 2}{5} \quad (40)$$

$$g(x) = \frac{5x - 2}{3}$$

$$f(x) = 3x - 7 \quad (39)$$

$$g(x) = \frac{1}{3}x - \frac{7}{16}$$

$$f(x) = 2x \quad (38)$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x$$

(41) **زمن:** إذا كانت الدالة: $h = \frac{m}{60}$ تستعمل لتحويل الدقائق m إلى ساعات h ، والدالة: $d = \frac{h}{24}$ تستعمل لتحويل الساعات h إلى أيام d ، فاكتب دالة يمكن استعمالها لتحويل الدقائق إلى أيام. (مهارة سابقة)

حدد ما إذا كان كل عدد مما يأتي نسبياً أو غير نسبي: (مهارة سابقة)

1.25 (45)

5.333... (44)

3.787887888... (43)

6.34 (42)



الجذر التنوبي

nth Root

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa



لماذا؟

لوحظ تزايد عدد الحوادث بين الدراجات الهوائية والسيارات على الطريق كلما زاد عدد الدراجات. ويمكن تمثيل العلاقة بينهما بالدالة $c = \sqrt[5]{b^2}$ ، حيث b عدد الدراجات، c عدد الحوادث.

تبسيط الجذور: يُعد إيجاد الجذر التربيعي لعدد عمليّةٌ عكسيّةٌ لتربيعه. فلإيجاد الجذر التربيعي للعدد a ، يجب أن تجد العدد الذي مربعه يساوي a . وبالتالي فإن العملية العكسيّة لرفع عدد لقوة (n) هي إيجاد **الجذر التنوبي** للعدد.

الجذور	التعبير اللفظي	العوامل	القوى
$\sqrt[3]{64} = 4$	4 هو الجذر التكعيبي للعدد 64	$4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$	$x^3 = 64$
$\sqrt[4]{625} = 5$	5 هو الجذر الرابع للعدد 625	$5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625$	$x^4 = 625$
$\sqrt[5]{32} = 2$	2 هو الجذر الخامس للعدد 32	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$	$x^5 = 32$
$\sqrt[n]{b} = a$	a هو الجذر التنوبي للعدد b	$\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n = b$	$a^n = b$

يقترح هذا النموذج التعريف الآتي للجذر التنوبي:

اضف الى
مطويتك


تعريف الجذر التنوبي

المفهوم أساسياً

التعريف اللغطي: لأيْ عددين حقيقيين b ، a ، ولأيْ عدد صحيح n ، $n > 1$ إذا كان $a^n = b$ ، فإن a هو جذر نوني للعدد b .

مثال: بما أن $81 = (-3)^4$ ، فإن -3 هو جذر رابع للعدد 81 .

يشير الرمز $\sqrt[n]{}$ إلى الجذر التنوبي.



بعض الأعداد لها أكثر من جذر نوني حقيقي . فعلى سبيل المثال، العدد 64 له جذران تربيعيان هما: 8 و -8؛ لأن $8^2 = 64$ و $(-8)^2 = 64$. فعندما يكون هناك أكثر من جذر حقيقي، ويكون n عددًا زوجيًّا، فإن الجذر غير السالب يسمى **الجذر الرئيس**.

وفيما يأتي بعض الأمثلة على الجذر التنوبي:

$$\sqrt{25} \text{ يشير إلى الجذر التربيعي الرئيس للعدد } 25.$$

$$\sqrt{25} = 5$$

$$-\sqrt{25} \text{ يشير إلى معكوس (الناظير الجمعي) الجذر التربيعي الرئيس للعدد } 25.$$

$$-\sqrt{25} = -5$$

$$\pm\sqrt{25} \text{ يشير إلى كلا الجذرين التربيعين للعدد } 25.$$

$$\pm\sqrt{25} = \pm 5$$

فيما سبق

درست دوال الجذر التربيعي.

والآن

- أبسط عبارات جذرية.
- أستعمل الحاسبة لتقرير قيم الجذور.

المفردات

الجذر التنوبي

nth root

رمز الجذر

radical sign

الدليل

index

ما تحت الجذر

radicand

الجذر الرئيس

principal root

مفهوم أساسى الجذر التنوى الحقيقى

ليكن n عدداً صحيحاً أكبر من 1، و a عدداً حقيقياً.

n عدد فردي	n عدد زوجي	a
هناك جذر حقيقي موجب وحيد، وليس هناك جذر حقيقي سالب: $\sqrt[n]{a}$.	هناك جذر حقيقي موجب وحيد، وجذر حقيقي سالب وحيد: $\pm\sqrt[n]{a}$ ، الجذر الموجب هو الجذر الرئيس	$a > 0$
ليس هناك جذور حقيقية موجبة. وهناك فقط جذر حقيقي سالب وحيد: $\sqrt[n]{a}$	ليس هناك جذور حقيقية.	$a < 0$
$\sqrt[7]{0} = 0$		$a = 0$

إيجاد الجذور

مثال 1

بسط كلاً مما يأتي:

$$-\sqrt{(x^2 - 6)^8} \quad (\text{b})$$

$$\pm\sqrt{16y^4} \quad (\text{a})$$

$$\begin{aligned} -\sqrt{(x^2 - 6)^8} &= -\sqrt{[(x^2 - 6)^4]^2} \\ &= -(x^2 - 6)^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pm\sqrt{16y^4} &= \pm\sqrt{(4y^2)^2} \\ &= \pm 4y^2 \end{aligned}$$

معكوس الجذر التربيعي الرئيس لـ $-(x^2 - 6)^4$ هو $(x^2 - 6)^8$.

الجذران التربيعيان لـ $16y^4$ هما $\pm 4y^2$.

$$\sqrt[7]{128} \quad (\text{d})$$

$$\sqrt[5]{243a^{20}b^{25}} \quad (\text{c})$$

$$\sqrt[7]{128} = \sqrt[7]{2^7} = 2$$

$$\begin{aligned} \sqrt[5]{243a^{20}b^{25}} &= \sqrt[5]{(3a^4b^5)^5} \\ &= 3a^4b^5 \end{aligned}$$

الجذر السابع لـ 128 هو 2

الجذر الخامس لـ $243a^{20}b^{25}$ هو $3a^4b^5$.

تحقق من فهمك

$$-\sqrt{(y+7)^{16}} \quad (\text{1B})$$

$$\sqrt[3]{8x^6} \quad (\text{1A})$$

إذا كان دليل الجذر عددًا زوجيًّا وأس ما تحت الجذر عددًا زوجيًّا، وكان أس الناتج عدًداً فردًّا، يجب أن تجد القيمة المطلقة للناتج لتأكد من أن الجواب ليس سالبًا.

تبسيط باستعمال القيمة المطلقة

مثال 2

بسط كلاً مما يأتي:

$$\sqrt[6]{64(x^2 - 3)^{18}} \quad (\text{b})$$

$$\sqrt[4]{y^4} \quad (\text{a})$$

$$\sqrt[6]{64(x^2 - 3)^{18}} = 2|(x^2 - 3)^3|$$

$$\sqrt[4]{y^4} = |y|$$

بما أن دليل الجذر (العدد 6) عدد زوجي، وأس العبارة $x^2 - 3$ (العدد 3) عدد فردي فيجب استعمال رمز القيمة المطلقة.

بما أن y من الممكن أن تكون سالبة فالجذر الرئيس لهذه العبارة يساوي القيمة المطلقة لـ y .

تحقق من فهمك

$$\sqrt[4]{16(x-3)^{12}} \quad (\text{2B})$$

$$\sqrt{36y^6} \quad (\text{2A})$$

إرشادات للدراسة

دليل الجذر

إذا كان n عدداً فرديًّا فهناك فقط جذر حقيقي واحد، وببناء على ذلك، فلا يوجد هناك جذر رئيس، ولا يوجد حاجة إلى استعمال رمز القيمة المطلقة. أما إذا كان n عدداً زوجيًّا فإن $\sqrt[n]{x^n} = |x|$



تقريب الجذور باستعمال الحاسبة: تذكر أن الأعداد الحقيقية التي لا يمكن كتابتها في صورة كسور عشرية منتهية أو دورية، تسمى أعداداً غير نسبية. غالباً ما يستعمل تقريب الأعداد غير النسبية في مسائل من واقع الحياة.



مثال 3 من واقع الحياة

تقريب الجذور

حوادث الدراجات: ارجع إلى الفقرة الواردة في بداية الدرس.

(a) إذا كانت $c = \sqrt[5]{b^2}$ تمثل عدد الحوادث، و b تمثل عدد الدراجات الهوائية، فقدر عدد الحوادث الشهرية على طريق ما، إذا علم أن 1000 دراجة تمر خلاله كل شهر.

فهم: المعطيات: $c = \sqrt[5]{b^2}$ توضح العلاقة بين عدد الدراجات الهوائية (b) التي تمر في طريق، وعدد الحوادث (c). بينها وبين السيارات

- عدد الدراجات الهوائية التي تمر خلال الطريق كل شهر هو 1000 دراجة.

المطلوب: تقدير عدد الحوادث بين الدراجات الهوائية والسيارات في هذا الطريق خلال شهر.

خطٌ: عرض عن b (عدد الدراجات الهوائية) بالعدد 1000.

$$\text{المعادلة الأصلية} \quad c = \sqrt[5]{b^2} \quad \text{حل:}$$

$$b = 1000 \quad = \sqrt[5]{1000^2}$$

باستعمال الحاسبة ≈ 15.85

فهناك 16 حادثاً تقريباً كل شهر على ذلك الطريق.

$$c = 15.85 \quad 15.85 = \sqrt[5]{b^2} \quad \text{تحقق}$$

$$\text{ارفع الطرفين للأس 5} \quad 15.85^5 = b^2$$

$$\text{بسط} \quad 1000337 = b^2$$

$$1000 \approx b$$

(b) إذا كان عدد الحوادث المسجلة على طريق ما في أحد الأشهر يساوي 21 حادثاً، فقدر عدد الدراجات الهوائية التي مررت في الطريق خلال ذلك الشهر.

$$\text{المعادلة الأصلية} \quad c = \sqrt[5]{b^2}$$

$$c = 21 \quad 21 = \sqrt[5]{b^2}$$

$$\text{ارفع الطرفين للأس 5} \quad 21^5 = b^2$$

$$4084101 = b^2$$

$$2021 \approx b$$

خذ الجذر التربيعي للطرفين، مع إهمال الجذر السادس
إذن عدد الدراجات الهوائية التي مررت في الطريق خلال ذلك الشهر هو 2021 دراجةً تقريباً.

تحقق من فهمك

(3A) **قياس:** يمكن إيجاد مساحة سطح كرة إذا علم حجمها، باستعمال الدالة $V = \sqrt[3]{36\pi V^2}$ ، حيث V تمثل حجم الكرة. أوجد مساحة سطح كرة حجمها 200 in^3 .

(3B) **قياس:** إذا كانت مساحة سطح كرة تساوي 214.5 in^2 ، فأوجد حجم الكرة.

الربط مع الحياة

تشير الإحصاءات في الولايات المتحدة إلى وقوع أكثر من 500 ألف حادث اصطدام للدراجات الهوائية والسقوط من عليها وأصابة راكبيها سنوياً، منهم أكثر من 11 ألف طفل ومرأة، مما يرفع تكلفة العلاج إلى ما يجاوز 200 مليون دولار سنوياً. وينصح بارتداء الخوذة لأهميتها لحماية رؤوس راكبي الدراجات الهوائية عند تعرضهم لحوادث السقوط.

تأكد

بسط كلاً مما يأتي:

المثالان 2 ، 1

$$\pm \sqrt{100y^8} \quad (1)$$

$$\sqrt{(y-6)^8} \quad (3)$$

$$\sqrt[3]{-125} \quad (5)$$

$$-\sqrt{49u^8v^{12}} \quad (2)$$

$$\sqrt[4]{16g^{16}h^{24}} \quad (4)$$

$$\sqrt[6]{64(2y+1)^{18}} \quad (6)$$

7) **قمر اصطناعي:** إذا كان نصف القطر r لمدار قمر اصطناعي تلفزيوني يعطى بالدالة $r = \sqrt[3]{\frac{GMt^2}{4\pi^2}}$ حيث G تمثل ثابت الجذب الكوني، M كتلة الأرض، t الزمن اللازم لإكمال القمر الاصطناعي دورة واحدة حول الأرض، فأوجد نصف قطر مدار القمر الاصطناعي إذا كانت :

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2, M = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}, t = 2.6 \times 10^6 \text{ s}$$

استعمل الحاسبة لتقرير قيمة كلٌ مما يأتي، إلى أقرب ثلات منازل عشرية:

$\sqrt[4]{71}$ (11)

$\sqrt[5]{-43}$ (10)

$-\sqrt{76}$ (9)

$\sqrt{58}$ (8)

مثال 3

تدريب وحل المسائل

بسط كلاً مما يأتي:

المثالان 2 ، 1

$\sqrt{(a^2 + 4a)^{12}}$ (14)

$-\sqrt{400x^{32}y^{40}}$ (13)

$\pm\sqrt{225a^{16}b^{36}}$ (12)

$\sqrt[3]{-(y - 9)^9}$ (17)

$\sqrt[5]{-243}$ (16)

$\sqrt[3]{27b^{18}c^{12}}$ (15)

$\sqrt[4]{81(x + 4)^4}$ (20)

$\sqrt[3]{a^{12}}$ (19)

$\sqrt[6]{x^{18}}$ (18)

$\sqrt[5]{32a^{15}b^{10}}$ (23)

$\sqrt[8]{x^{16}y^8}$ (22)

$\sqrt[3]{(y^3 + 5)^{18}}$ (21)

24) **شحن:** يريد متجر لبيع الكتب عبر الإنترن特 زيادة حجم الصناديق المستعملة في الشحن. إذا كان حجم الصندوق الجديد N يساوي حجم الصندوق القديم V مضروباً في مكعب عدد ثابت F ؛ أي أن $N = V \cdot F^3$.
فما قيمة العدد F إذا كان الحجم الأصلي للصندوق يساوي 0.8 ft^3 ، والحجم الجديد يساوي 21.6 ft^3

25) **هندسة:** يمكن إيجاد طول ضلع مكعب r باستعمال القانون $r = \sqrt[3]{V}$ ، حيث V تمثل حجم المكعب بالوحدات المكعبة . أوجد طول ضلع مكعب حجمه $.512 \text{ cm}^3$.


استعمل الآلة الحاسبة لتقرير قيمة كلٌ مما يأتي إلى أقرب ثلات منازل عشرية:

$\sqrt[6]{(8912)^2}$ (29)

$\sqrt[5]{-4382}$ (28)

$\sqrt{0.43}$ (27)

$-\sqrt{150}$ (26)



30) **هندسة:** يمكن إيجاد نصف قطر r لكرة حجمها V باستعمال القانون $r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$

(a) أوجد نصف قطر كلٌ من الكرات ذات الأحجام الآتية:
 $1000 \text{ cm}^3, 8000 \text{ cm}^3, 64000 \text{ cm}^3$

(b) ما مقدار التغيير في حجم الكرة عند زيادة نصف قطرها إلى مثليه؟

بسط كلاً مما يأتي:

$\sqrt[3]{64(x + y)^6}$ (33)

$\sqrt[3]{-27a^{15}b^9}$ (32)

$\sqrt[4]{196c^6d^4}$ (31)

34) **فيزياء:** طور جوهانز كيلر (Johannes kepler) القانون $d = \sqrt[3]{6t^2}$ ، حيث d تمثل المسافة بـملايين الأميال بين أي كوكب والشمس ، و t تمثل عدد الأيام الأرضية التي يستغرقها الكوكب ليدور حول الشمس.
إذا كان كوكب المريخ يستغرق 687 يوماً أرضياً ليدور حول الشمس، فكم يبعد المريخ عن الشمس؟



الربط مع الحياة

الأيض metabolism هو جميع العمليات الكيميائية التي ينتج عنها بناء أو تحليل المواد الغذائية داخل جسم الكائن الحي.

كتلته (kg)	الحيوان
4.5	النسور
30	الكلب
72	التمساح
156	الدلافين
2300	الفيل

(36) تمثيلات متعددة: سوف تستعمل في هذا السؤال كلاً من: $f(x) = x^n$, $g(x) = \sqrt[n]{x}$ لاستكشاف المعكوس.

- a) جدولياً: اعمل جدولًا لكلاً من $f(x)$, $g(x)$ مستعملاً $n = 3$, $n = 4$.
- b) بيانياً: مثل كلاً من المعادلتين السابقتين بيانياً.
- c) تحليلياً: أي المعادلتين السابقتين تمثل دالة؟ وأيها تمثل دالة متباينة؟
- d) تحليلياً: ما قيمة n التي يكون عندها كل من الدالتين $f(x)$, $g(x)$ دالة عكسية للأخرى؟
- e) لفظياً: ما الاستنتاجات التي يمكن أن تتوصل إليها حول $\sqrt[n]{x} = g(x)$ و $x^n = f(x)$ لقيم n الزوجية الموجبة، وقيم n الفردية الموجبة؟

مسائل مهارات التفكير العليا

(37) تحدّ: ما قيمة x التي تتبع لمجموعة الأعداد الحقيقة وتحقق المتباينة $x > \sqrt[3]{x}$ ؟

(38) مسألة مفتوحة: أوجد عددًا يكون جذر التربيعي الرئيس وجذر التكعيبى عددين صحيحين.

(39) اكتب: وضح متى يكون استعمال رمز القيمة المطلقة ضروريًا عند إيجاد الجذر التوسيعى؟ ولماذا؟

(40) تحدّ: حل المعادلة: $125 = -\frac{-5}{\sqrt{a}}$

تدريب على اختبار

(41) أي الآتية هو الأقرب إلى قيمة المقدار $\sqrt[3]{7.32}$ ؟	1.8 A
1.9 B	
2 C	
2.1 D	

مراجعة تراكمية

مثل كلاً دالة مما يأتي بيانياً: (الدرس: 4-3)

$$y = 3\sqrt{x} + 4 \quad (45)$$

$$y = \sqrt{x} - 2 \quad (44)$$

$$y = \sqrt{x - 5} \quad (43)$$

(46) صحة: تبلغ كتلة طفل ولد حديثاً $7\frac{1}{2}$ أرطال، وطوله 19.5 in. فإذا كان الكيلوجرام الواحد يساوى 2.2 رطل تقريرياً، والستمتر الواحد يساوى 0.3937in تقريرياً. فأوجد كتلة المولود بالكيلوجرامات وطوله بالستمترات. (الدرس: 4-2)

بسط كلاً مما يأتي: (مهارة سابقة)

$$(2a^2 + 6)^2 \quad (48)$$

$$(11x^2 + 13x - 15) - (7x^2 - 9x + 19) \quad (47)$$

أوجد حاصل الضرب في كلاً مما يأتي: (مهارة سابقة)

$$2(w + z)(w - 4z) \quad (51)$$

$$(x + 2y)(x - y) \quad (50)$$

$$(x + 4)(x + 5) \quad (49)$$



تمثيل دالة الجذر التوسيع بيانيًا

4-4




رابط المدرس الرقمي

الهدف

استعمل الحاسبة
البيانية TI-nspire
لتمثيل دوال الجذر
التوسيع بيانيًا.

يمكنك استعمال الحاسبة البيانية TI-nspire لتمثيل دوال الجذور التوسيع بيانيًا.



[-10, 10] scl: 1 by [-6.67, 6.67] scl: 1

تمثيل دالة الجذر التوسيع بيانيًا


مثال 1

مثل $\sqrt[3]{x} = y$ بيانيًا.

- استعمل المفاتيح التالية بالترتيب من اليمين إلى اليسار.

الشاشة تطبق الرسوم البيانية 1: مستند جديد [on]

- أدخل الدالة الجذرية بالضغط على مفتاح **ctrl** ثم مفتاح **ctrl** ثم مفتاح **up** ، ثم أدخل الدالة.
- ثم اضغط **enter** فيظهر تمثيلها البياني.



[-1, 6] scl: 0.2 by [-1, 3] scl: 0.2


دوال الجذور التوسيع المختلفة الدليل

مثال 2

مثل الدالتين: $\sqrt{x} = y$ و $\sqrt[4]{x} = y$ بيانيًا.

أدخل المعادلة $\sqrt{x} = y$ ومثلها مستعملاً الخطوات السابقة، ثم أدخل المعادلة $\sqrt[4]{x} = y$ فيظهر تمثيل البياني المجاور.

ملاحظة: اختر التدريج المناسب.



[-10, 10] scl: 1 by [-4, 7] scl: 0.5

دوال الجذور التوسيع المختلفة فيما تحت الجذر

مثال 3

مثل الدوال الثلاث: $y = \sqrt[3]{x+4}$ ، $y = \sqrt[3]{x+4} + 0.5$ ، $y = \sqrt[3]{x+4} + 1$ بيانيًا.

باستعمال الخطوات السابقة يظهر تمثيل البياني المجاور.

تمارين:

مثل كل دالةٍ مما يأتي بيانيًا:

$$y = \sqrt[4]{x+2} \quad (3)$$

$$y = \sqrt[4]{x+2} \quad (2)$$

$$y = \sqrt[4]{x} \quad (1)$$

$$y = \sqrt[5]{x-5} \quad (6)$$

$$y = \sqrt[5]{x-5} \quad (5)$$

$$y = \sqrt[5]{x} \quad (4)$$

(7) ما تأثير جمع أو طرح عدد ثابتٍ لما تحت الجذر في التمثيل البياني لدالة الجذر التوسيع؟

(8) ما تأثير جمع أو طرح عدد ثابتٍ لدالة الجذر التوسيع في تمثيلها البياني؟



وزارة التعليم

Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار منتصف الفصل

مثل كلاً من الدالتين الآتتين بيانياً، وحدد مجال كل منها ومداها:

$$y = \sqrt{x+4} - 1 \quad (21)$$

$$y = 2 + \sqrt{x} \quad (20)$$

(22) اختيار من متعدد: ما مجال الدالة $f(x) = \sqrt{2x+5}$

$$\left\{ x \mid x \geq \frac{5}{2} \right\} \text{ C}$$

$$\left\{ x \mid x > \frac{5}{2} \right\} \text{ A}$$

$$\left\{ x \mid x \geq -\frac{5}{2} \right\} \text{ D}$$

$$\left\{ x \mid x > -\frac{5}{2} \right\} \text{ B}$$

بسط كلاً مما يأتي:

$$\sqrt{(x^4 + 3)^{12}} \quad (24)$$

$$\sqrt{121a^4b^{18}} \quad (23)$$


$$\sqrt[5]{-(y-6)^{20}} \quad (26)$$

$$\sqrt[3]{27(2x-5)^{15}} \quad (25)$$

$$\sqrt[4]{16(y+x)^8} \quad (28)$$

$$\sqrt[3]{8(x+4)^6} \quad (27)$$

(29) اختيار من متعدد: نصف قطر الأسطوانة أدناه يساوي ارتفاعها. ويمكن إيجاد نصف قطرها r باستعمال القانون $V = \pi r^2 h$ حيث V حجم الأسطوانة. ما نصف القطر التقريري للأسطوانة إذا كان حجمها 500 in^3 ؟



$$2.53 \text{ in } \text{A}$$

$$5.42 \text{ in } \text{B}$$

$$7.94 \text{ in } \text{C}$$

$$24.92 \text{ in } \text{D}$$

(30) إنتاج: إذا كانت تكلفة إنتاج p قطعة بالريالات في مصنع يعبر عنها بالدالة: $C(p) = 5p + 60$. وكان عدد القطع المنتجة في نهاية $P(h) = 40h$ ساعة عمل يُعبر عنه بالدالة:

(a) أوجد $C[p(h)]$.

(b) أوجد تكلفة الإنتاج في نهاية 8 ساعات عمل.

إذا كان $2 - f(x) = 2x^2 + 4x - 3$, $g(x) = 5x$ ، فأوجد كلاً دالة مما يأتي:

$$(f-g)(x) \quad (2)$$

$$(f+g)(x) \quad (1)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) \quad (4)$$

$$(f \cdot g)(x) \quad (3)$$

$$[g \circ f](x) \quad (6)$$

$$[f \circ g](x) \quad (5)$$

في كلاً زوج مما يأتي حدد هل كلاً دالة عكسية للأخرى أم لا، ووضح إجابتك:

$$g(x) = 4x + 15 \quad (8)$$

$$f(x) = 2x + 16 \quad (7)$$

$$h(x) = \frac{1}{4}x - 15$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x - 8$$

$$g(x) = -6x + 8 \quad (10)$$

$$f(x) = x^2 - 5 \quad (9)$$

$$h(x) = \frac{8-x}{6}$$

$$g(x) = 5 + x^{-2}$$

أوجد معكوس كلاً دالة مما يأتي، إذا كان ذلك ممكناً:

$$f(x) = \frac{4}{9}(x-3) \quad (12)$$

$$h(x) = \frac{2}{5}x + 8 \quad (11)$$

$$f(x) = \frac{x+12}{7} \quad (14)$$

$$h(x) = -\frac{10}{3}(x+5) \quad (13)$$

(15) تنسيق حدائق: تتقاضى مؤسسة لتنسيق الحدائق 25 ريالاً أجرة للمعدات، إضافة إلى 15 ريالاً عن كل ساعة عمل. وتمثل الدالة $f(h) = 15h + 25$ تكلفة العمل لمدة h ساعة.

(a) أوجد $f^{-1}(h)$. وماذا تمثل $f^{-1}(h)$ ؟

(b) إذا كانت أجرة تنسيق حديقة 85 ريالاً، فكم عدد ساعات عمل المؤسسة في الحديقة؟

مثل كلاً متباعدة مما يأتي بيانياً:

$$y \leq -2\sqrt{x} \quad (17)$$

$$y < \sqrt{x-5} \quad (16)$$

$$y \geq \sqrt{x+4} - 5 \quad (19)$$

$$y > \sqrt{x+9} + 3 \quad (18)$$



4-5


العمليات على العبارات الجذرية Operations with Radical Expressions

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

الماذرة



عرف المستطيل الذهبي قديماً، حيث استعمله الفنانون والمهندسو في تصاميمهم، والنسبة بين طوله إلى عرضه هي $\frac{2}{\sqrt{5}-1}$. ومن أهم خصائصه أنه إذا أزيل منه مربع طول ضلعه هو عرض المستطيل فالشكل الباقى مستطيل ذهبي أيضاً. وستتعلم في هذا الدرس تبسيط عبارات جذرية مثل $\frac{2}{\sqrt{5}-1}$.

تبسيط العبارات الجذرية: يمكن تبسيط العبارات التي تحوي جذوراً نونية باستعمال خواص العمليات عليها.

فيما سبق

درست تبسيط عبارات تتضمن الجذر النوني.
(الدرس 4-4)

والآن

- أبسط عبارات جذرية.
- أجمع عبارات جذرية وأطرحها وأضربها وأقسمها.

المفردات

إنطاق المقام
rationalizing the denominator
الجذور المتشابهة
like radical expressions
المرافق
conjugate

أضف إلى
مطويتك

خاصية ضرب الجذور

مفهوم أساسى

التعبير اللغظي: لأي عددين حقيقيين a, b ولأي عدد صحيح n حيث $n > 1$, فإن $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$, إذا كانت n عدداً زوجياً وكان a, b عددين غير سالبين أو إذا كان n عدداً فردياً.

$$\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{27} = 3 \quad \sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4 \quad \text{مثالان:}$$

ولكي تكون العبارة الجذرية التي تتضمن جذراً في أبسط صورة، يجب ألا يتضمن ما تحت الجذر عوامل (غير العدد 1) يمكن أن تكتب في صورة قوى نونية لعدد صحيح أو كثيرة حدود.

تبسيط عبارات جذرية باستعمال خاصية الضرب

مثال 1

بسط كلاً مما يأتي:

$$\sqrt{32x^8} \quad (\text{a})$$

حلل ما يمكن تحليله إلى عوامل مربعة

$$\sqrt{32x^8} = \sqrt{4^2 \cdot 2 \cdot (x^4)^2}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= \sqrt{4^2} \cdot \sqrt{(x^4)^2} \cdot \sqrt{2}$$

بسط

$$= 4x^4\sqrt{2}$$

$$\sqrt[4]{16a^{24}b^{13}} \quad (\text{b})$$

حلل ما يمكن تحليله إلى عوامل مرتفعة للأس 4

$$\sqrt[4]{16a^{24}b^{13}} = \sqrt[4]{2^4 \cdot (a^6)^4(b^3)^4 \cdot b}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= \sqrt[4]{2^4} \cdot \sqrt[4]{(a^6)^4} \cdot \sqrt[4]{(b^3)^4} \cdot \sqrt[4]{b}$$

بسط

$$= 2a^6|b^3|\sqrt[4]{b}$$

ولا ضرورة لكتابة رمز القيمة المطلقة في هذه الحالة؛ لأنه حتى يكون $\sqrt[4]{16a^{24}b^{13}}$ معروفاً، يجب أن تكون b موجبة.

$$\text{لذا فإن } \sqrt[4]{16a^{24}b^{13}} = 2a^6b^3\sqrt[4]{b}$$

تحقق من فهمك

$$\sqrt[3]{27y^{12}z^7} \quad (\text{1B})$$

$$\sqrt[4]{12d^3c^{12}} \quad (\text{1A})$$



خاصية قسمة الجذور هي خاصية أخرى تستعمل في تبسيط العبارات الجذرية.

خاصية قسمة الجذور

التعبير اللفظي: لأي عددين حقيقيين a, b ، حيث $b \neq 0$ ولأي عدد صحيح n حيث $n > 1$ ،
 $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ ، إذا كانت جميع الجذور معرفة.

$$\sqrt{\frac{27}{4}} = \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{4}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \quad \sqrt[3]{\frac{x^6}{8}} = \frac{\sqrt[3]{x^6}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{x^2}{2} = \frac{1}{2}x^2 \quad \text{مثالان:}$$

لإزالة الجذور من المقام أو الكسور تحت الجذر، استعمل عملية تُسمى **إنطاق المقام**. ولعمل ذلك، اضرب البسط والمقام في مقدار بحيث تكون جميع أسس الثوابت والمتغيرات الموجودة تحت الجذر من مضاعفات دليل الجذر مما يسهل إيجاد الجذر الدقيق.

مثال	فاضرب البسط والمقام في	إذا كان المقام
$\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$	\sqrt{b}	\sqrt{b}
$\frac{5}{\sqrt[3]{2}} = \frac{5}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{5\sqrt[3]{4}}{2}$	$\sqrt[n]{b^{n-x}}$	$\sqrt[n]{b^x}$

ارشادات للدراسة

الجذور الدقيقة

يسهل إيجاد الجذور
بصورة دقيقة عندما
تكون جميع أسس
الثوابت والمتغيرات
الموجودة تحت الجذر
من مضاعفات دليل
الجذر، فمثلاً:

$$\sqrt{25a^4} = 5a^2$$

تبسيط عبارات جذرية باستعمال خاصية القسمة

مثال 2

بسط كلاً مما يأتي:

$$\sqrt[4]{\frac{6}{5x}} \quad (\text{b})$$

$$\sqrt{\frac{x^6}{y^7}} \quad (\text{a})$$

خاصية قسمة الجذور

$$\sqrt[4]{\frac{6}{5x}} = \frac{\sqrt[4]{6}}{\sqrt[4]{5x}}$$

خاصية قسمة الجذور

$$\sqrt[4]{\frac{x^6}{y^7}} = \frac{\sqrt{x^6}}{\sqrt[4]{y^7}}$$

إنطاق المقام

$$= \frac{\sqrt[4]{6}}{\sqrt[4]{5x}} \cdot \frac{\sqrt[4]{5^3x^3}}{\sqrt[4]{5^3x^3}}$$

حل ما يمكن تحليله إلى
عوامل مربعة

$$= \frac{\sqrt{(x^3)^2}}{\sqrt{(y^3)^2 \cdot y}}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= \frac{\sqrt[4]{6 \cdot 5^3x^3}}{\sqrt[4]{5x \cdot 5^3x^3}}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= \frac{\sqrt{(x^3)^2}}{\sqrt{(y^3)^2 \cdot \sqrt{y}}}$$

اضرب

$$= \frac{\sqrt[4]{750x^3}}{\sqrt[4]{5^4x^4}}$$

بسط

$$= \frac{|x^3|}{y^3\sqrt{y}}$$

$$\sqrt[4]{5^4x^4} = 5x$$

$$= \frac{\sqrt[4]{750x^3}}{5x}$$

إنطاق المقام

$$= \frac{|x^3|}{y^3\sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y}}$$

$$\sqrt{y} \cdot \sqrt{y} = y$$

$$= \frac{|x^3|\sqrt{y}}{y^4}$$

تحقق من فهمك



$$\frac{\sqrt{a^9}}{\sqrt{b^5}} \quad (2A)$$

$$\sqrt[5]{\frac{3}{4y}} \quad (2B)$$

فيما يأتي ملخص للقواعد التي تستعمل في تبسيط العبارات الجذرية:

أضف إلى
مطويتك

تبسيط العبارات الجذرية

ملخص المفاهيم

تكون العبارة الجذرية في أبسط صورة إذا تحققت جميع الشروط الآتية:

- إذا كان دليل الجذر n أصغر من 1 .
- إذا لم يتضمن ما تحت الجذر عوامل (غير العدد 1) يمكن أن تكتب على صورة قوى نونية لعدد صحيح أو لكثيرة حدود.
- إذا لم يتضمن ما تحت الجذر كسورة.
- إذا لم توجد جذور في المقام.

العمليات على العبارات الجذرية: يمكنك استعمال خاصيتي الضرب والقسمة لضرب بعض العبارات الجذرية وقسمتها.

ضرب العبارات الجذرية

مثال 3

بسط العبارة الجذرية: $5\sqrt[3]{-12ab^4} \cdot 3\sqrt[3]{18a^2b^2}$

$$5\sqrt[3]{-12ab^4} \cdot 3\sqrt[3]{18a^2b^2} = 5 \cdot 3 \cdot \sqrt[3]{-12ab^4 \cdot 18a^2b^2}$$

حل الثوابت

$$= 15 \cdot \sqrt[3]{-2^2 \cdot 3 \cdot ab^4 \cdot 2 \cdot 3^2 \cdot a^2b^2}$$

جمع العوامل في صورة أساس تكعيبية

$$= 15 \cdot \sqrt[3]{-2^3 \cdot 3^3 \cdot a^3b^6}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= 15 \cdot \sqrt[3]{-2^3} \cdot \sqrt[3]{3^3} \cdot \sqrt[3]{a^3} \cdot \sqrt[3]{b^6}$$

بسط

$$= 15 \cdot (-2) \cdot 3 \cdot a \cdot b^2$$

اضرب

$$= -90ab^2$$

تحقق من فهمك

$$2\sqrt[4]{8x^3y^2} \cdot 3\sqrt[4]{2x^5y^2} \quad (3B)$$

$$6\sqrt{8c^3d^5} \cdot 4\sqrt{2cd^3} \quad (3A)$$

يمكنك جمع العبارات الجذرية وطرحها بالأسلوب المستعمل عند جمع وحدات الحد أو طرحها، ولكن بشرط أن تكون **الجذور متشابهة**؛ أي أن يكون للجذور الدليل نفسه وما تحت الجذور المقادير نفسها.

غير متشابهين: $\sqrt{3b}$ و $\sqrt{2b}$

غير متشابهين: $\sqrt{3b}$ و $\sqrt[3]{3b}$

متشابهان: $4\sqrt{3b}$ و $\sqrt{3b}$

جمع العبارات الجذرية وطرحها

مثال 4

بسط العبارة الجذرية: $2\sqrt{32} - \sqrt{98}$.

حل ما يمكن تحليله إلى عوامل مربعة

$$\sqrt{98} - 2\sqrt{32} = \sqrt{2 \cdot 7^2} - 2\sqrt{4^2 \cdot 2}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= \sqrt{7^2} \cdot \sqrt{2} - 2 \cdot \sqrt{4^2} \cdot \sqrt{2}$$

بسط العبارات الجذرية

$$= 7\sqrt{2} - 2 \cdot 4 \cdot \sqrt{2}$$

اضرب

$$= 7\sqrt{2} - 8\sqrt{2}$$

$$(7 - 8)\sqrt{2} = (-1)(\sqrt{2})$$

$$= -\sqrt{2}$$

إرشادات للدراسة

جمع العبارات

الجذرية وطرحها

بسط كل جذر على حدة

قبل محاولة تجميع

الجذور المتشابهة.

تحقق من فهمك

$$5\sqrt{12} + 2\sqrt{27} - \sqrt{128} \quad (4B)$$

$$4\sqrt{8} + 3\sqrt{50} \quad (4A)$$



ويمكنك جمع الجذور وطرحها بالطريقة نفسها المتبع في جمع وحدات الحد وطرحها، فإنه يمكنك أيضاً ضرب الجذور باستعمال التوزيع بالترتيب لضرب ثنائي حد.

مثال 5 ضرب العبارات الجذرية

بسط العبارة الجذرية $(4\sqrt{3} + 5\sqrt{2})(3\sqrt{2} - 6)$.

$$\begin{aligned} \text{خاصية التوزيع} \quad & (4\sqrt{3} + 5\sqrt{2})(3\sqrt{2} - 6) = 4\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{2} + 4\sqrt{3} \cdot (-6) + 5\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} \cdot (-6) \\ \text{خاصية ضرب الجذور} \quad & = 12\sqrt{3 \cdot 2} - 24\sqrt{3} + 15\sqrt{2^2} - 30\sqrt{2} \\ \text{بسط} \quad & = 12\sqrt{6} - 24\sqrt{3} + 30 - 30\sqrt{2} \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

$$(7\sqrt{2} - 3\sqrt{3})(7\sqrt{2} + 3\sqrt{3}) \quad (5B)$$

$$(6\sqrt{3} - 5)(2\sqrt{5} + 4\sqrt{2}) \quad (5A)$$

تعتبر كل من ثنائيي الحد اللتين على الصورة $a\sqrt{b} + c\sqrt{d}, a\sqrt{b} - c\sqrt{d}$ حيث a, b, c, d أعداد نسبية مرافقة للأخرى. ويمكنك استعمال المراافق لإنطاق المقام.

استعمال المراافق لإنطاق المقام

مثال 6 من واقع الحياة


هندسة: ارجع إلى الفقرة الواردة في بداية الدرس، واستعمل المراافق لإنطاق المقام وتبسيط العبارة

$$\frac{2}{\sqrt{5} - 1}$$

$$\sqrt{5} + 1 \quad \text{مراافق } \frac{2}{\sqrt{5} - 1}$$

اضرب واستعمل خاصية التوزيع

$$\begin{aligned} \frac{2}{\sqrt{5} - 1} &= \frac{2}{\sqrt{5} - 1} \cdot \frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} + 1} \\ &= \frac{2\sqrt{5} + 2(1)}{(\sqrt{5})^2 + 1(\sqrt{5}) - 1(\sqrt{5}) - 1(1)} \\ &= \frac{2\sqrt{5} + 2}{5 + \sqrt{5} - \sqrt{5} - 1} \\ &= \frac{2\sqrt{5} + 2}{4} \\ &= \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \end{aligned}$$



(6) هندسة: إذا كانت مساحة المستطيل في الشكل المجاور تساوي 900 ft²، فاكتب معادلة تمثل طول المستطيل L بدلالة x ، ثم بسطها.

إرشادات للدراسة

المراافق

حاصل ضرب عددين متراافقين هو عدد نسبي دائمًا.

إرشادات للدراسة

يمكنك إيجاد ناتج

$$(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1)$$

مباشرة باستعمال الفرق بين مربعين بالشكل:

$$(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1)$$

$$= (\sqrt{5})^2 - (1)^2$$

$$= 5 - 1 = 4$$

تأكد

بسط كل عبارة جذرية فيما يأتي:

الأمثلة 1-5

$$\sqrt[4]{\frac{5x}{8y}} \quad (4)$$

$$\frac{\sqrt{c^5}}{\sqrt{d^9}} \quad (3)$$

$$\sqrt{144x^7y^5} \quad (2)$$

$$\sqrt{36ab^4c^5} \quad (1)$$

$$3\sqrt[3]{36xy} \cdot 2\sqrt[3]{6x^2y^2} \quad (6)$$

$$5\sqrt{2x} \cdot 3\sqrt{8x} \quad (5)$$

$$5\sqrt{32} + \sqrt{27} + 2\sqrt{75} \quad (8)$$

$$\sqrt[4]{3x^3y^2} \cdot \sqrt[4]{27xy^2} \quad (7)$$

$$(8\sqrt{3} - 2\sqrt{2})(8\sqrt{3} + 2\sqrt{2}) \quad (10)$$


$$(4 + 2\sqrt{5})(3\sqrt{3} + 4\sqrt{5}) \quad (9)$$

$$\frac{8}{\sqrt{6} - 5} \quad (12)$$

$$\frac{5}{\sqrt{2} + 3} \quad (11)$$

$$\frac{6 - \sqrt{3}}{\sqrt{3} + 4} \quad (14)$$

$$\frac{4 + \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 3} \quad (13)$$



مثال 6 هندسة: أوجد ارتفاع المثلث في الشكل المجاور في أبسط صورة إذا كانت مساحته $189 + 4\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

تدريب وحل المسائل

الأمثلة 1-4 بسط كل عبارة جذرية فيما يأتي:

$$\sqrt{\frac{7x}{10y^3}} \quad (19)$$

$$\sqrt{18a^6b^3c^5} \quad (18)$$

$$\sqrt{9a^{15}b^3} \quad (17)$$

$$\sqrt{72a^8b^5} \quad (16)$$

$$2\sqrt{32a^3b^5} \cdot \sqrt{8a^7b^2} \quad (23)$$

$$3\sqrt{5y} \cdot 8\sqrt{10yz} \quad (22)$$

$$\sqrt[4]{\frac{7x^3}{4b^2}} \quad (21)$$

$$\frac{\sqrt[3]{6x^2}}{\sqrt[3]{5y}} \quad (20)$$

$$4\sqrt{28} - 8\sqrt{810} + \sqrt{44} \quad (25) \quad 3\sqrt{90} + 4\sqrt{20} + \sqrt{162} \quad (24)$$

$$(8 + \sqrt{3})\text{ft}$$



(26) هندسة: أوجد محيط المستطيل في الشكل المجاور واكتبه في أبسط صورة. ثم أوجد مساحته واكتبهما في أبسط صورة.

$$\frac{2\sqrt{2} + 2\sqrt{5}}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} \quad (32)$$

$$\frac{9 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 6} \quad (31)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} \quad (30)$$

$$\frac{6}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \quad (29)$$

$$\frac{\sqrt[3]{36xy^2}}{\sqrt[3]{10xz}} \quad (35)$$

$$\sqrt[4]{\frac{12x^3y^2}{5a^2b}} \quad (34)$$

$$\sqrt[3]{-54x^6y^{11}} \quad (33)$$

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad (38)$$

$$\frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4}} \quad (37)$$

$$\frac{x + 1}{\sqrt{x} - 1} \quad (36)$$

(39) تفاح: يرتبط قطر التفاحة مع كتلتها بالدالة $d = \sqrt[3]{3w}$, حيث d تمثل القطر بالبوصة، w الكتلة بالأونصات. أوجد قطر تفاحة كتلتها 6.47 أونصات.


المثالان 5, 6



الربط مع الحياة

التفاح يطفو على الماء لأن نسبة الهواء فيه 25% من حجمه.

(44) تمثيلات متعددة: سستكشف في هذا السؤال العمليات على الجذور المتشابهة.



(a) عددياً: انقل الشكل المجاور على ورقة نقطية. واستعمل نظرية فيثاغورس لإثبات أن طول القطعة المستقيمة الحمراء يساوي $\sqrt{2}$ وحدة.

(b) بيانيًا: زد طول القطعة المستقيمة الحمراء ليصبح $\sqrt{2} + \sqrt{2}$.

(c) تحليليًا: استعمل الشكل الذي رسمته لتبين أن: $2 = \sqrt{2} + \sqrt{2} \neq \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$.

(d) بيانيًا: استعمل الورقة النقطية لرسم مربع ضلعه $\sqrt{2}$ وحدة.

(e) عدديًا: برهن على أن مساحة المربع تساوي $2 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ وحدة مربعة.

مسائل مهارات التفكير العليا

(45) **اكتشف الخطأ:** بسط كل من خالد وناصر العبارة الجذرية $4\sqrt{32} + 6\sqrt{18}$ ، فأيٌّ منهما إجابت صحيحة؟ وُضِّح إجابتك.

ناصر

$$\begin{aligned} 4\sqrt{32} + 6\sqrt{18} \\ = 4\sqrt{16 \cdot 2} + 6\sqrt{9 \cdot 2} \\ = 64\sqrt{2} + 54\sqrt{2} \\ = 118\sqrt{2} \end{aligned}$$

خالد

$$\begin{aligned} 4\sqrt{32} + 6\sqrt{18} \\ = 4\sqrt{4^2 \cdot 2} + 6\sqrt{3^2 \cdot 2} \\ = 16\sqrt{2} + 18\sqrt{2} \\ = 34\sqrt{2} \end{aligned}$$

(46) **تحدد:** بين أن $\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ هو جذر تكعبي للعدد 1.

(47) **تبرير:** ما قيم a ، التي تجعل العبارة الجذرية $\sqrt{-a} \cdot \sqrt{a}$ عدداً حقيقياً؟ فُسر إجابتك.

(48) **مسألة مفتوحة:** أوجد عدداً غير الواحد الصحيح بحيث يكون كُلُّ من جذوره: التربيعي، والتكعبي، والرابع عدداً كلِّياً موجباً.

(49) **اكتب:** وُضِّح متى يكون وضع رمز القيمة المطلقة ضروريًا، أو غير ضروري في ناتج تبسيط الجذر النوني لعبارة ما .

تدريب على اختبار

(50) أي العبارات الجذرية الآتية تكافئ العبارة الجذرية $\sqrt[9]{180a^2b^8}$ ؟

$36\sqrt{5}|a|b^4$ **D**

$3\sqrt{10}|a|b^4$ **C**

$6\sqrt{5}|a|b^4$ **B**

$5\sqrt{6}|a|b^4$ **A**

مراجعة تراكمية

بسط كُلُّ من العبارات الجذرية الآتية:

$\sqrt{(g+5)^2}$ (53)

$\sqrt[3]{729a^3b^9}$ (52)

$\sqrt{81x^6}$ (51)

(54) مثل المتباينة $2 - \sqrt{x} \leq y$ بيانياً. (مهارة سابقة)

حل كُلُّ معادلة مما يأتي: (مهارة سابقة)

$27x^3 + 1 = 0$ (57)

$x^4 + 6x^2 - 27 = 0$ (56)

$x^4 - 34x^2 + 225 = 0$ (55)

(58) **قوارب:** تربح شركة لصناعة القوارب، 5000 ريال من صنعقارب الصغير، و 9000 ريال من صنعقارب الكبير. فإذا زاد عدد ما أنتجته الشركة من القوارب الصغيرة 5 قوارب على عدد القوارب الكبيرة خلال فصلي الصيف والربيع. وربحت مقابل ذلك 81000 ريال. فكم عدد القوارب التي أنتجتها الشركة من كل نوع؟ (مهارة سابقة)

أوجد ناتج كُلُّ مما يأتي: (مهارة سابقة)

$\frac{5}{6} - \frac{2}{5}$ (61)

$\frac{1}{2} + \frac{3}{8}$ (60)

$3\left(\frac{1}{8}\right)$ (59)



4-6

الأسس النسبية Rational Exponents

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

المادة



يمكن أن تستعمل الصيغة $P = c(1 + r)^n$

لتقدير الثمن المستقبلي لسلعة اعتماداً على التضخم المالي، حيث P يمثل الثمن المستقبلي، c تمثل الثمن الحالي، r يمثل معدل التضخم السنوي، n تمثل عدد السنوات المستقبلية. فمثلاً يمكن أن تستعمل الصيغة:

$$P = c(1 + r)^{\frac{1}{2}}$$

لتقدير الثمن المستقبلي لجهاز تبريد ماء في ستة أشهر.

الأسس النسبية والعبارات الجذرية: تعلم أن تربيع عدد غير سالب وإيجاد جذر التربيعي هما عمليتان عكسيتان. ولكن كيف يمكنك إيجاد قيمة عبارة تتضمن أساً نسبياً كما في الصيغة أعلاه؟ يمكنك إيجاد قيم مثل هذه العبارات بافتراض أن عبارات الأسس النسبية يصح فيها ما يصح في عبارات الأسس الصحيحة.

اكتبه على صورة حاصل ضرب

$$\left(b^{\frac{1}{2}}\right)^2 = b^{\frac{1}{2}} \cdot b^{\frac{1}{2}}$$

اجمع الأسس

$$= b^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}$$

بسط

$$= b^1 = b$$

لذا فإن $b^{\frac{1}{2}}$ هو عدد مربعه يساوي b ؛ إذن $\sqrt{b} = b^{\frac{1}{2}}$.

أضف إلى
مطويتك

مفهوم أساسي

الأسس النسبية ($b^{\frac{1}{n}}$)

التعبير اللغطي: لأيّ عدد حقيقي b ، وأيّ عدد صحيح موجب n ، $b^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{b}$.
إلا إذا كانت $0 < b$ ، و n عدداً زوجياً فإن الجذر النوني يكون عدداً مركباً.

مثالان: $27^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{27} = 3$ ، $(-16)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{-16} = 4i$

الصورتان الجذرية والأسيّة

مثال 1

(b) اكتب $\sqrt[4]{z}$ على الصورة الأسية.

$$\text{تعريف } b^{\frac{1}{n}} \quad \sqrt[4]{z} = z^{\frac{1}{4}}$$

(a) اكتب $x^{\frac{1}{6}}$ على الصورة الجذرية.

$$\text{تعريف } b^{\frac{1}{n}} \quad x^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{x}$$

تحقق من فهمك

(1B) اكتب $\sqrt[8]{c}$ على الصورة الأسية.

(1A) اكتب $a^{\frac{1}{5}}$ على الصورة الجذرية.



وبشكل عام يمكن تقديم التعريف العام الآتي للأسس النسبية:

مطويتك

مفهوم أساسي

الأسس النسبية ($b^{\frac{x}{y}}$)

التعبير اللفظي: يكون $b^{\frac{x}{y}} = \sqrt[y]{b^x} = (\sqrt[y]{b})^x$ لـ أي عدد حقيقي b لا يساوي صفرًا، ولـ أي عددين صحيحين y, x بحيث $x > 0$ ، إلا إذا كانت y عدداً زوجياً، فإن الجذر قد يكون عدداً مركباً.

$27^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$

$(-16)^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{-16})^3 = (4i)^3 = -64i$

مثالان:

كما أن القواعد التي تنطبق على الأسس الصحيحة السالبة تنطبق أيضاً على الأسس النسبية السالبة.

إيجاد قيم عبارات تتضمن أساساً نسبية

مثال 2

أوجد قيمة كلّ عبارة مما يأتي:

$$216^{\frac{2}{3}} \quad (b)$$

$$81^{-\frac{1}{4}} \quad (a)$$

$$216 = 6^3$$

$$216^{\frac{2}{3}} = (6^3)^{\frac{2}{3}}$$

خاصية قوة القوة

$$b^{-n} = \frac{1}{b^n}$$

$$81^{-\frac{1}{4}} = \frac{1}{81^{\frac{1}{4}}}$$

ضرب الأسس

$$= 6^{3 \cdot \frac{2}{3}}$$

$$81^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{81}$$

$$= \frac{1}{\sqrt[4]{81}}$$

بسـط

$$= 6^2$$

$$81 = 3^4$$

$$= \frac{1}{\sqrt[4]{3^4}}$$

بسـط

$$= 36$$

بسـط

$$= \frac{1}{3}$$

تحقق من فهمك

$$256^{\frac{3}{8}} \quad (2B)$$

$$-3125^{-\frac{1}{5}} \quad (2A)$$

حل معادلات تتضمن أساساً نسبية

مثال 3 من واقع الحياة

ثقافة مالية: ارجع إلى الفقرة الواردة في بداية الدرس، وافترض أن الثمن الحالي لجهاز تبريد الماء هو 390 ريالاً. فكم سيزيد الثمن خلال ستة أشهر إذا كان معدل التضخم المالي السنوي 5.3%؟

$$\text{الصيغة} \quad P = c(1 + r)^n$$

$$c = 390, r = 0.053, n = \frac{6 \text{ أشهر}}{12 \text{ شهراً}} = \frac{1}{2}$$

استعمل الحاسبة

$$= 390(1 + 0.053)^{\frac{1}{2}}$$

$$\approx 400.20$$

إذن سيزيد ثمن جهاز تبريد الماء بعد ستة أشهر بمقدار 10.20 ريالات تقريرياً.

تحقق من فهمك

(3) ثقافة مالية: افترض أن ثمن لتر الحليب الآن 4 ريالات. فكم سيزيد الثمن بعد تسعه أشهر، إذا كان معدل التضخم المالي السنوي 5.3%؟

تبسيط العبارات: خواص الأسس التي تعلمتها سابقاً تنطبق أيضاً على الأسس النسبية؛ لذا اكتب كل عبارة على صورة أساس موجبة. واحرص على أن تكون الأساس في مقام الكسر أعداداً صحيحة موجبة؛ لذلك أنت في حاجة إلى إنطاق المقام أحياناً.



تبسيط عبارات بأسس نسبية

مثال 4

بسط كل عبارة مما يأتي:

$$b^{-\frac{5}{6}} \quad (\text{b})$$

$$a^{\frac{2}{7}} \cdot a^{\frac{4}{7}} \quad (\text{a})$$

$$b^{-n} = \frac{1}{b^n}$$

$$b^{-\frac{5}{6}} = \frac{1}{b^{\frac{5}{6}}}$$

$$\text{خاصية ضرب القوى} \quad a^{\frac{2}{7}} \cdot a^{\frac{4}{7}} = a^{\frac{2+4}{7}}$$

$$\frac{b^{\frac{1}{6}}}{b^{\frac{5}{6}}} \quad \text{اضرب في}$$

$$= \frac{1}{b^{\frac{5}{6}}} \cdot \frac{b^{\frac{1}{6}}}{b^{\frac{1}{6}}}$$

جمع الأسس

$$= a^{\frac{6}{7}}$$

$$b^{\frac{5}{6}} \cdot b^{\frac{1}{6}} = b^{\frac{5+1}{6}}$$

$$= \frac{b^{\frac{1}{6}}}{b^{\frac{6}{6}}}$$

$$b^{\frac{6}{6}} = b^1 = b$$

$$= \frac{b^{\frac{1}{6}}}{b}$$

$$\frac{x^{\frac{1}{2}} - 2}{3x^{\frac{1}{2}} + 2} \quad (\text{c})$$

$$\frac{3x^{\frac{1}{2}} + 2}{3x^{\frac{1}{2}} - 2} \quad \text{مراجع} \quad \frac{x^{\frac{1}{2}} - 2}{3x^{\frac{1}{2}} + 2} = \frac{x^{\frac{1}{2}} - 2}{3x^{\frac{1}{2}} + 2} \cdot \frac{3x^{\frac{1}{2}} - 2}{3x^{\frac{1}{2}} - 2}$$

اضرب

$$= \frac{3x^{\frac{2}{2}} - 8x^{\frac{1}{2}} + 4}{9x^{\frac{2}{2}} - 4}$$

بسط

$$= \frac{3x - 8x^{\frac{1}{2}} + 4}{9x - 4}$$

تحقق من فهمك

$$\frac{y^{\frac{1}{2}} + 2}{y^{\frac{1}{2}} - 2} \quad (\text{4C})$$

$$r^{-\frac{4}{5}} \quad (\text{4B})$$

$$p^{\frac{1}{4}} \cdot p^{\frac{9}{4}} \quad (\text{4A})$$

عند تبسيط عبارة جذرية أجعل دليل الجذر أقل ما يمكن. وتذكر أن استعمال الأسس النسبية يسهل هذه العملية، وبعد الانتهاء من استعمال الأسس النسبية، أعد كتابة الناتج في الصورة الجذرية.

تبسيط العبارات الجذرية

مثال 5

بسط كل عبارة مما يأتي:

$$\sqrt[4]{9g^2} \quad (\text{b})$$

$$\frac{\sqrt[4]{27}}{\sqrt{3}} \quad (\text{a})$$

$$\sqrt[4]{9g^2} = (9g^2)^{\frac{1}{4}} \quad \text{الأسس النسبية}$$

$$\frac{\sqrt[4]{27}}{\sqrt{3}} = \frac{27^{\frac{1}{4}}}{3^{\frac{1}{2}}} \quad \text{الأسس النسبية}$$

$$9g^2 = (3g)^2$$

$$= [(3g)^2]^{\frac{1}{4}}$$

$$27 = 3^3$$

$$= \frac{(3^3)^{\frac{1}{4}}}{3^{\frac{1}{2}}}$$

خاصية قوة القوة

$$= (3g)^{\frac{1}{2}}$$

خاصية قوة القوة

$$= \frac{3^{\frac{3}{4}}}{3^{\frac{1}{2}}}$$

ارشادات للدراسة

تبسيط العبارات

عند تبسيط عبارة تحوي أساساً نسبية، اترك الأساس على الصورة النسبية بدلاً من كتابة العبارة على الصورة الجذرية.



أعد كتابة العبارة
 على الصورة الجذرية $= \sqrt{3g}$ خاصية قسمة قوتين $= 3^{\frac{3}{4}} - \frac{1}{2}$
 بسط $= 3^{\frac{1}{4}}$
 أعد كتابة العبارة على الصورة الجذرية $= \sqrt[4]{3}$

تحقق من فهمك

$$\sqrt[3]{16x^4} \quad (5B) \qquad \frac{\sqrt[4]{32}}{\sqrt[3]{2}} \quad (5A)$$

إرشادات للدراسة

العبارات الجذرية والأسية

اكتب العبارة بعد تبسيطها (الناتج النهائي) على الصورة التي كان عليها قبل التبسيط؛ أي إذا بدأت بعبارة جذرية، فاكتب الناتج النهائي على الصورة الجذرية، وإذا بدأت بعبارة تتضمن أساساً نسبية، فاكتب الناتج النهائي على الصورة الأساسية.

أضف إلى
مطويتك

عبارات تتضمن أساساً نسبية

ملخص المفاهيم

تكون العبارات التي تتضمن أساساً نسبية في أبسط صورة إذا تحققت الشروط الآتية:

- جميع الأساسين غير سالبة.

- جميع الأساسين في المقام هي أعداد صحيحة موجبة.

- لا يتضمن أي من البسط أو المقام أو كليهما كسرًا.

- دليل الجذر أو الجذور المتبقية فيها أصغر ما يمكن.

تأكد

مثال 1

اكتب العبارة الأساسية على الصورة الجذرية، والعبارة الجذرية على الصورة الأساسية في كلٍّ مما يأتي:

$$\sqrt[4]{7x^6y^9} \quad (4)$$

$$\sqrt[3]{15} \quad (3)$$

$$x^{\frac{3}{5}} \quad (2)$$

$$10^{\frac{1}{4}} \quad (1)$$

أوجد قيمة كلٌّ عبارة مما يأتي:

$$\frac{24}{\frac{3}{4}^2} \quad (8)$$

$$125^{\frac{2}{3}} \quad (7)$$

$$32^{-\frac{1}{5}} \quad (6)$$

$$343^{\frac{1}{3}} \quad (5)$$

مثال 2 (9) **قياس:** إذا علمت مساحة مربع هي A ، فإنه يمكن إيجاد طول ضلعه ℓ باستعمال القانون $A = \ell^2$. فإذا

علمت أن مساحة حديقة مربعة الشكل $169m^2$ ، فما طول ضلعها؟

بسط كلٌّ عبارة مما يأتي:

المثالان 4, 5

$$\frac{b^3}{c^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{c^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{3}}} \quad (12)$$

$$\frac{x^{\frac{4}{5}}}{x^{\frac{1}{5}}} \quad (11)$$

$$a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{\frac{1}{2}} \quad (10)$$

$$\frac{g^{\frac{1}{2}} - 1}{g^{\frac{1}{2}} + 1} \quad (15)$$

$$\frac{\sqrt[5]{64}}{\sqrt[5]{4}} \quad (14)$$

$$\sqrt[3]{64z^6} \quad (13)$$

تدريب وحل المسائل

مثال 1

اكتب العبارة الأساسية على الصورة الجذرية، والعبارة الجذرية على الصورة الأساسية في كلٍّ مما يأتي:

$$\sqrt[4]{625x^2} \quad (19)$$

$$\sqrt{17} \quad (18)$$

$$(x^3)^{\frac{3}{2}} \quad (17)$$

$$8^{\frac{1}{5}} \quad (16)$$

أوجد قيمة كلٌّ عبارة مما يأتي:

مثال 2

$$(-27)^{-\frac{2}{3}} \quad (23)$$

$$16^{-\frac{1}{2}} \quad (22)$$

$$256^{\frac{1}{4}} \quad (21)$$

$$27^{\frac{1}{3}} \quad (20)$$



مثال 3

(24) كرة سلة: يوجد حجمان لكرة السلة؛ حجم كبير وآخر صغير، كما في الصورة جانبًا. فإذا كان نصف قطر الكرة r التي تسع V وحدة مكعبية من الهواء يُعبر عنه بالعلاقة $\frac{1}{3}V = \frac{4\pi}{3}r^3$ ، فأجب عما يأتي:

- أوجد نصف قطر كرة السلة ذات الحجم الصغير.
- أوجد نصف قطر كرة السلة ذات الحجم الكبير.

بسط كلّ عبارة مما يأتي:

المثلان 4, 5

$$\frac{x^{\frac{1}{4}} + 2}{x^{\frac{1}{4}} - 2} \quad (29)$$


$$\sqrt[4]{25x^2} \quad (28)$$

$$\frac{\sqrt[8]{81}}{\sqrt[6]{3}} \quad (27)$$


$$y^{-\frac{4}{5}} \quad (26)$$

$$x^{\frac{1}{3}} \cdot x^{\frac{2}{5}} \quad (25)$$

هندسة: أوجد مساحة كل شكل فيما يأتي:



(31)



(30)

$$(32) \text{ ما أبسط صورة للعبارة } 18^{\frac{1}{2}} + 2^{\frac{1}{2}} - 32^{\frac{1}{2}} ?$$

بسط كلّ عبارة مما يأتي:

$$w^{-\frac{7}{8}} \quad (36)$$

$$\sqrt[6]{216} \quad (35)$$

$$\left(y^{-\frac{3}{5}}\right)^{-\frac{1}{4}} \quad (34)$$

$$a^{\frac{7}{4}} \cdot a^{\frac{5}{4}} \quad (33)$$

(37) محميات: إذا افترضنا أن عدد الغزلان يتضاعف في المحميات الطبيعية كل ستين. فإذا كان في المحمية 100 غزال، وكان عدد الغزلان D بعد t من السنوات يُعبر عنه بالصيغة $D = 100 \cdot 2^{\frac{t}{60}}$ ، فأجب عما يأتي:

(a) كم سيصبح عدد الغزلان بعد أربع سنوات ونصف؟

(b) اعمل جدولًا يحدد عدد الغزلان في كل سنة من السنوات الخمس القادمة.

(c) مثلّ بيانياً بيانات الجدول الذي كونته في الفرع b.

(d) قرر باستعمال الجدول، والتمثيل البياني: هل عدد الغزلان في المحمية معقول على المدى البعيد أم لا؟
ووضح إجابتك.



الربط مع الحياة

الطريقة الأكثر دقة لتحديد عمر بعض أنواع الغزلان هي النظر إلى مقطع عرضي لإحدى أسنانه، حيث تنمو كل فصل شتاء طبقة كلاسية تكسو السن على شكل حلقة، وكل حلقة تمثل سنة كما هو الحال في حلقات جذع الشجرة.

$$\sqrt{23} \cdot \sqrt[3]{23^2} \quad (41)$$

$$\frac{c^{\frac{2}{3}}}{c^{\frac{1}{6}}} \quad (40)$$

$$\frac{g^{\frac{5}{2}}}{g^{\frac{1}{2}} + 2} \quad (39)$$

$$\frac{f^{-\frac{1}{4}}}{4f^{\frac{1}{2}} \cdot f^{-\frac{1}{3}}} \quad (38)$$

$$\frac{8^{\frac{1}{6}} - 9^{\frac{1}{4}}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} \quad (45)$$

$$\frac{xy}{\sqrt[3]{z}} \quad (44)$$

$$\sqrt[4]{\sqrt{256}} \quad (43)$$

$$\sqrt{\sqrt{81}} \quad (42)$$

(46) تمثيلات متعددة: سترى في هذا السؤال الدالتين:

$$f(x) = x^3, g(x) = x^{\frac{1}{3}}$$

(a) **جدولياً:** انسخ الجدول المجاور، وأكمله.

(b) **بيانياً:** مثلّ بيانياً كلاً من $f(x), g(x)$.

(c) **لقطياً:** ما التحويل الهندسي الذي يصف العلاقة بين تمثيليهما البيانيين؟

x	f(x)	g(x)
-2		
-1		
0		
1		
2		

مسائل مهارات التفكير العليا

(47) **تبرير:** حدد ما إذا كانت المعادلة $x^{-2} = -x$ صحيحة دائمًا، أو صحيحة أحياناً، أو غير صحيحة أبداً. ووضح إجابتك.

(48) **اكتشف الخطأ:** بسط كل من محمود وعلي العبارة $\frac{x^{\frac{3}{4}}}{x^{\frac{1}{2}}}$ ، فهل إجابة أيٍ منها صحيحة؟

علي

$$\begin{aligned}\frac{x^{\frac{3}{4}}}{x^{\frac{1}{2}}} &= x^{\frac{3}{4} - \frac{1}{2}} \\&= x^{\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{2}} \\&= x^{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

محمود

$$\begin{aligned}\frac{x^{\frac{3}{4}}}{x^{\frac{1}{2}}} &= x^{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}} \\&= x^{\frac{3+2}{4}} \\&= x^{\frac{5}{4}}\end{aligned}$$

(49) **مسألة مفتوحة:** أوجد عبارتين مختلفتين على الصورة $x^{\frac{1}{n}}$ بحيث تكون قيمة كلٌّ منها 2.

(50) **اكتب:** وضح كيف يمكن أن يكون استعمال الأسس التسنية لتبسيط عبارة أسهل من استعمال الجذور.

تدريب على اختبار

(51) تكون العبارة $c = \sqrt[3]{56}$ مساويةً لعدد صحيح موجب عندما

تكون قيمة c هي:

36 **D** 56 **C** -8 **B** 8 **A**

(52) ما قيمة p التي تتحقق المعادلة: $3^5 \cdot p = 3^3$

2^3 **D** 3^2 **C** 3^{-2} **B** 2^{-3} **A**

مراجعة تراكمية

بسط كلاً مما يأتي: (الدرس: 4-5)

$$3\sqrt[3]{56y^6z^3} \quad (55)$$

$$\sqrt[3]{16y^3} \quad (54)$$

$$\sqrt{243} \quad (53)$$

(56) **فيزياء:** تعطى سرعة الصوت في سائل بالعلاقة $s = \sqrt{\frac{B}{d}}$ ، حيث B معامل تغير حجم السائل، d كثافة السائل. أما بالنسبة للماء، فإن $B = 2.1 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ ، $d = 10^3 \text{ kg/m}^3$. أوجد سرعة الصوت في الماء لأقرب متر لكل ثانية. (الدرس: 4-5)

أوجد $(h-p)(-4)$ لكل دالة مما يأتي: (مهارة سابقة)

$$p(x) = 6x + 3 \quad (59)$$

$$p(x) = -x + 4 \quad (58)$$

$$p(x) = x - 2 \quad (57)$$

$$p(x) = 2x^3 - 1 \quad (62)$$

$$p(x) = x^2 - x \quad (61)$$

$$p(x) = x^2 + 5 \quad (60)$$

أوجد $(f+g)(x)$ لكل دالتين فيما يأتي: (الدرس: 4-1)

$$f(x) = 2x^2 \quad (64)$$

$$f(x) = -x^2 + 6 \quad (63)$$

$$g(x) = 8 - x$$

$$g(x) = 2x^2 + 3x - 5$$

بسط كل عبارة مما يأتي: (الدرس: 4-5)

$$(2\sqrt{x} - 5)^2 \quad (67)$$

$$(\sqrt[3]{3x - 4})^3 \quad (66)$$

$$(\sqrt{x - 3})^2 \quad (65)$$



4-7

حل المعادلات والمتباينات الجذرية Solving Radical Equations and Inequalities



رابط المدرس الرقمي
www.ien.edu.sa



أضف إلى
مطويتك

المادة:
عندما تقفز إلى الأعلى فإنك ترتفع عن الأرض وتبقي زمناً معيناً في الهواء يُسمى زمن التحليق. ويمكنك إيجاد زمن التحليق t بالثانية إذا علمت ارتفاع القفزة h بالأقدام، وذلك باستعمال الصيغة $t = 0.5\sqrt{h}$.
إذا عُلم أن زمن تحليق أحد لاعبي كرة السلة 0.98 ثانية تقريرياً، فكيف يمكنك حساب ارتفاع قفزته؟

حل المعادلات الجذرية: تحتوي **المعادلات الجذرية** على عبارات جذرية يكون المتغير فيها تحت الجذر. ويمكنك حلها عن طريق رفع طرفي المعادلة لأأس معين.

مفهوم أساسى

حل المعادلات الجذرية

اجعل الجذر في طرف واحد من المعادلة.

الخطوة 1:

ارفع طرفي المعادلة لقوة مساوية لدليل الجذر؛ وذلك للتخلص من الجذر.

الخطوة 2:

حل معادلة كثيرة الحدود الناتجة، ثمتحقق من صحة الحل.

الخطوة 3:

فيما سبق

درست حل معادلات كثيرات الحدود. (مهارة سابقة)

والآن

- أحل معادلات تحتوي جذوراً.
- أحل متباينات تحتوي جذوراً.

المفردات

المعادلة الجذرية

radical equation

الحل الدخيل

extraneous solution

المتباينة الجذرية

radical inequality

عند حل بعض المعادلات الجذرية، قد لا يحقق الحل المعادلة الأصلية. ويُسمى مثل هذا الحل **حلاً دخيلاً**.

حل معادلات جذرية

مثال 1

حل كل معادلة مما يأتي:

$$\sqrt{x+2} + 4 = 7 \quad (\text{a})$$

$$\sqrt{x+2} + 4 = 7$$

$$\sqrt{x+2} = 3$$

$$(\sqrt{x+2})^2 = 3^2$$

$$x+2 = 9$$

$$x = 7$$

$$\sqrt{x+2} + 4 = 7 \quad \text{تحقق:}$$

$$\sqrt{7+2} + 4 \stackrel{?}{=} 7$$

$$\checkmark 7 = 7$$

$$\sqrt{x-12} = 2 - \sqrt{x} \quad (\text{b})$$

$$\sqrt{x-12} = 2 - \sqrt{x}$$

$$(\sqrt{x-12})^2 = (2 - \sqrt{x})^2$$

$$x-12 = 4 - 4\sqrt{x} + x$$

$$-16 = -4\sqrt{x}$$

$$4 = \sqrt{x}$$

$$16 = x$$

المعادلة الأصلية

اطرح 4 من الطرفين لفصل الجذر

ربع الطرفين للتخلص من الجذر

أوجد مربع الطرفين

اطرح 2 من الطرفين

المعادلة الأصلية

عوض عن x بالعدد 7

بسط

المعادلة الأصلية

ربع الطرفين

أوجد مربع الطرفين


اطرح 4 من الطرفين لفصل الجذر

اقسم الطرفين على -4

ربع الطرفين



التحقق من الحل
يمكنك استعمال
الحسابية البيانية
للتحقق من حل
المعادلة، مثل كل طرف
من أطراف المعادلة
الأصلية بيانياً، ثم
ابحث عن نقاط
التقاطع.



يكون حل هذه المعادلة دخيلاً. والتمثيلان البيانيان للمعادلة $y = \sqrt{x-12}$ ، والمعادلة $y = 2 - \sqrt{x}$ لا يتقاطعان، وهذا يؤكد أنه لا يوجد حل حقيقي.

تحقق من فهمك

$$\sqrt{x+15} = 5 + \sqrt{x} \quad (1B)$$

$$5 = \sqrt{x-2} - 1 \quad (1A)$$

للتخلص من الجذر التربيعي ارفع العبارة الجذرية للأس 2، وللتخلص من الجذر التكعيبي ارفع العبارة الجذرية للأس 3.

حل معادلة جذر تكعيبي**مثال 2**

$$\text{حل المعادلة: } 0 = 2(6x - 3)^{\frac{1}{3}} - 4$$

للتخلص من الأس $\frac{1}{3}$ (الجذر التكعيبي)، يجب أولاً جعل المقدار المرفوع للأس $\frac{1}{3}$ في طرف لوحده، ثم رفع طرفي المعادلة للأس 3.

$$\text{المعادلة الأصلية: } 2(6x - 3)^{\frac{1}{3}} - 4 = 0$$

$$\text{أضف 4 للطرفين: } 2(6x - 3)^{\frac{1}{3}} = 4$$

$$\text{اقسم الطرفين على 2: } (6x - 3)^{\frac{1}{3}} = 2$$

$$\text{كعب الطرفين: } [(6x - 3)^{\frac{1}{3}}]^3 = 2^3$$

$$\text{أوجد مكعب الطرفين: } 6x - 3 = 8$$

$$\text{أضف 3 للطرفين: } 6x = 11$$

$$\text{اقسم الطرفين على 6: } x = \frac{11}{6}$$

$$\text{المعادلة الأصلية: } 2(6x - 3)^{\frac{1}{3}} - 4 = 0 \quad \text{تحقق:}$$

$$\text{اعوض عن } x \text{ بالعدد } \frac{11}{6}: \quad 2\left(6 \cdot \frac{11}{6} - 3\right)^{\frac{1}{3}} - 4 \stackrel{?}{=} 0$$

$$2(8)^{\frac{1}{3}} - 4 \stackrel{?}{=} 0$$

$$2(2) - 4 \stackrel{?}{=} 0$$

$$\checkmark \quad 0 = 0$$

تحقق من فهمك

يمكنك استعمال طرائق حل معادلات الجذور التربيعية والتكميعية في حل المعادلات الجذرية أياً كان دليل جذرها. وللخلص من الجذر النوني لأي عبارة ارفعه للأس n .

مثال 3 على اختبار

11 D

5 C

1 B

-1 A

$$\begin{aligned} \text{المعادلة الأصلية: } & 3(\sqrt[4]{2n+6}) - 6 = 0 \\ \text{أضف 6 للطرفين: } & 3(\sqrt[4]{2n+6}) = 6 \\ \text{اقسم الطرفين على 3: } & \sqrt[4]{2n+6} = 2 \\ \text{ارفع الطرفين للأس 4: } & (\sqrt[4]{2n+6})^4 = 2^4 \\ \text{أوجد ناتج كل من الطرفين: } & 2n + 6 = 16 \\ \text{اطرح 6 من الطرفين: } & 2n = 10 \\ \text{اقسم الطرفين على 2: } & n = 5 \end{aligned}$$

إذن الجواب هو C.

تحقق من فهمك

$$4(3x+6)^{\frac{1}{4}} - 12 = 0 \quad (3)$$

x = 37 D

x = 29 C

x = 25 B

x = 7 A

ارشادات الاختبار

تعويض البديل

يمكنك أيضاً حل سؤال الاختبار بتعويض كل البديل المعطاة لقيمة n في المعادلة، لاختيار الحل الصحيح منها وهو الذي يحقق المعادلة.

مفهوم أساسي حل المتباعدة الجذرية

أضف إلى مطويتك

- إذا كان دليل الجذر عدداً زوجياً، فعين قيم المتغير التي لا تجعل ما تحت الجذر سالباً.
- حل المتباعدة جبرياً.
- حدد حل المتباعدة من الخطوتين السابقتين، ثم اختبر القيم لتتأكد من صحة الحل.

ارشادات الاختبار

المتباعدة الجذرية

- بما أن الجذر التربيعي الرئيس لا يكون سالباً أبداً، فإن المتباعدة التي تبسط إلى الصورة $\sqrt{ax+b} \leq c$ حيث c عدد سالب، ليس لها حل، والتي تبسط إلى $\sqrt{ax+b} > c$ تكون مجموعة حلها هي مجموعة الأعداد الحقيقية.

- إذا كان طرفاً المتباعدة موجبين، فإنه يمكنك تربيع الطرفين معبقاء الرمز كما هو.

مثال 4 حل المتباعدة الجذرية

$$\text{حل المتباعدة: } 8 \leq 3 + \sqrt{5x-10}$$

الخطوة 1: بما أن ما تحت الجذر التربيعي يجب أن يكون أكبر من أو يساوي صفراء، فحل أولاً $5x - 10 \geq 0$ لتعيين قيمة المتغير x التي تجعل الطرف الأيسر من المتباعدة معروفاً.

$$\begin{aligned} \text{المعادلة الأصلية: } & 5x - 10 \geq 0 \\ \text{أضف 10 للطرفين: } & 5x \geq 10 \\ \text{اقسم الطرفين على 5: } & x \geq 2 \end{aligned}$$

$$\text{الخطوة 2: حل المتباعدة: } 8 \leq 3 + \sqrt{5x-10}$$

$$\begin{aligned} \text{المتباعدة الأصلية: } & 3 + \sqrt{5x-10} \leq 8 \\ \text{اطرح 3 من الطرفين لفصل الجذر: } & \sqrt{5x-10} \leq 5 \\ \text{ربع الطرفين للخلص من الجذر: } & 5x - 10 \leq 25 \\ \text{أضف 10 للطرفين: } & 5x \leq 35 \\ \text{اقسم الطرفين على 5: } & x \leq 7 \end{aligned}$$



الخطوة 3: يتضح من الخطوتين السابقتين أن حل المتباعدة هو $7 \leq x \leq 2$. ويمكنك اختبار بعض قيم x للتأكد من الحل. استعمل ثلاثة قيم؛ إحداها أقل من 2، والأخرى تقع بين 2 و 7، والثالثة أكبر من 7. ثم نظم النتائج في جدول:

$x = 0$	$x = 4$	$x = 9$
$3 + \sqrt{5(0) - 10} \stackrel{?}{\leq} 8$ $\cancel{X} 3 + \sqrt{-10} \leq 8$ وبما أن $\sqrt{-10}$ ليس عدداً حقيقياً فإن المتباعدة لا تتحقق.	$3 + \sqrt{5(4) - 10} \stackrel{?}{\leq} 8$ $\checkmark 6.16 \leq 8$ وبما أن $8 \leq 6.16$ ، فإن المتباعدة تتحقق.	$3 + \sqrt{5(9) - 10} \stackrel{?}{\leq} 8$ $\cancel{X} 8.92 \leq 8$ وبما أن $8 \neq 8.92$ ، فإن المتباعدة لا تتحقق.

تم التحقق من حل المتباعدة. والقيم التي تقع في الفترة $7 \leq x \leq 2$ فقط هي التي تتحقق المتباعدة.

تحقق من فهمك

$$\sqrt{4x - 4} - 2 < 4 \quad (4B)$$

$$\sqrt{2x + 2} + 1 \geq 5 \quad (4A)$$

تأكد

المثالان 2, 1: حل كل معادلة مما يأتي:

$$\sqrt{x + 13} - 8 = -2 \quad (2)$$

$$\sqrt{x - 4} + 6 = 10 \quad (1)$$

$$\sqrt[3]{x - 2} = 3 \quad (4)$$

$$8 - \sqrt{x + 12} = 3 \quad (3)$$

$$(4y)^{\frac{1}{3}} + 3 = 5 \quad (6)$$

$$(x - 5)^{\frac{1}{3}} - 4 = -2 \quad (5)$$

$$2 + 4z^{\frac{1}{2}} = 0 \quad (8)$$

$$\sqrt{y} - 7 = 0 \quad (7)$$

$$\sqrt{2t - 7} = \sqrt{t + 2} \quad (10)$$

$$5 + \sqrt{4y - 5} = 12 \quad (9)$$

(11) فيزياء: يعطي الزمن الدوري للبندول بالصيغة $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ، حيث T الزمن الدوري للبندول بالثاني، L طول البندول بالأقدام، g تسارع السقوط الحر، والذي يساوي 32 قدمًا لكل ثانية مربعة.

(a) ما الزمن الدوري لبندول ضخم طوله 73 ft؟

(b) يريد صانع ساعات أن يصنع بندولًا يستغرق 5 s لإتمام دورته. كم يجب أن يكون طول البندول؟

(12) اختيار من متعدد: حل المعادلة $0 = (2y + 6)^{\frac{1}{4}} - 2$ هو:

$$y = 15 \quad D$$

$$y = 11 \quad C$$

$$y = 5 \quad B$$

$$y = 1 \quad A$$

مثال 3 حل كل متباعدة مما يأتي:

$$\sqrt{b - 7} + 6 \leq 12 \quad (14)$$

$$\sqrt{3x + 4} - 5 \leq 4 \quad (13)$$

$$\sqrt{3a + 3} - 1 \leq 2 \quad (16)$$

$$2 + \sqrt{4y - 4} \leq 6 \quad (15)$$

$$\sqrt{3x + 6} + 2 \leq 5 \quad (18)$$

$$1 + \sqrt{7x - 3} > 3 \quad (17)$$

$$6 - \sqrt{2y + 1} < 3 \quad (20)$$

$$-2 + \sqrt{9 - 5x} \geq 6 \quad (19)$$



تدريب وحل المسائل

مثال 1 حل كل معادلة مما يأتي:

$$\sqrt{x+6} = 5 - \sqrt{x+1} \quad (22)$$

$$6 + \sqrt{3x+1} = 11 \quad (21)$$

$$2 + \sqrt{3y-5} = 10 \quad (24)$$

$$\sqrt{x-15} = 3 - \sqrt{x} \quad (23)$$

$$\sqrt{b-6} + \sqrt{b} = 3 \quad (26)$$

$$\sqrt{7a-2} = \sqrt{a+3} \quad (25)$$

(27) فيزياء: تصف الصيغة: $t = \frac{1}{4}\sqrt{d-h}$ الزمن t بالثواني اللازم لوصول جسم إلى الارتفاع h عن سطح الأرض عند سقوطه من ارتفاع قدره d متر عن سطح الأرض، إذا سقطت مفاتيح بدر من ارتفاع 65m من أعلى العجلة الدوارة في مدينة الألعاب، فما ارتفاع المفاتيح عن سطح الأرض بالأمتار بعد مرور ثانيتين؟

مثال 2 حل كل معادلة مما يأتي:

$$(6q+1)^{\frac{1}{4}} + 2 = 5 \quad (29)$$

$$(5n-6)^{\frac{1}{3}} + 3 = 4 \quad (28)$$

$$3(x+5)^{\frac{1}{3}} - 6 = 0 \quad (31)$$

$$(4z-1)^{\frac{1}{5}} - 1 = 2 \quad (30)$$

$$\frac{1}{7}(14a)^{\frac{1}{3}} = 1 \quad (33)$$

$$\sqrt[3]{4n-8} - 4 = 0 \quad (32)$$

(34) اختيار من متعدد: حل المعادلة: $\sqrt[4]{y+2} + 9 = 14$ هو:

623 D

123 C

53 B

23 A

مثال 4 حل كل متباعدة مما يأتي:

$$10 - \sqrt{2x+7} \leq 3 \quad (36)$$

$$\sqrt{2x+14} - 6 \geq 4 \quad (35)$$

$$\sqrt{2y+5} + 3 \leq 6 \quad (38)$$

$$6 + \sqrt{3y+4} < 6 \quad (37)$$

$$-3 + \sqrt{6a+1} > 4 \quad (40)$$

$$-2 + \sqrt{8-4z} \geq 8 \quad (39)$$

(41) فيزياء: الصيغة $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{32}}$ تمثل الزمن الدوري للبندول بالثواني، حيث L طول البندول بالأقدام. احسب طول البندول الذي يستغرق 1.5 ثانية لإتمام دورته.

(42) أسماك: يمكن تقرير العلاقة بين طول سمكة وكتلتها بالمعادلة: $L = 0.46\sqrt[3]{M}$ ، حيث L الطول بالأمتار، M الكتلة بالكيلوجرامات. حل هذه المعادلة بالنسبة للمتغير M .

(43) زمن التحليق: عُد إلى الفقرة الواردة في بداية الدرس، وصف كيف يرتبط ارتفاع القفزة بزمن التحليق. واتكتب توضيحاً مفصلاً لكيفية تحديد ارتفاع قفزة زمن تحليقها 0.98 ثانية.

(44) رفع أثقال: يمكن استعمال الصيغة $B^{-\frac{8}{5}} - 146230B = 512$ ؛ لتقدير الكتلة العظمى M التي يستطيع رافع أثقال كتلته B كيلوجرام رفعها. استخدم هذه الصيغة في إيجاد كتلة رافع أثقال يستطيع رفع 470kg على الأكثر؟

مسائل مهارات التفكير العليا

(45) تحدّ: قالت عائشة: إنه بإمكانها الحكم بعدم وجود حلٌّ حقيقي لالمعادلة $-4 = (x+5)^{\frac{1}{4}}$ دون حلها. فهل ما تقوله صحيح؟ وضح إجابتك.



(46) أي معادلة مما يأتي ليس لها حل؟

$$\sqrt{x+1} + 3 = 4$$

$$\sqrt{x-1} + 3 = 4$$

$$\sqrt{x+2} - 7 = -10$$

$$\sqrt{x-2} + 7 = 10$$

(47) تبرير: حدد ما إذا كانت $\frac{\sqrt{(x^2)^2}}{-x} = x$ صحيحة دائمًا، أو صحيحة أحياناً، أو غير صحيحة أبداً، وذلك إذا كان x عدداً حقيقياً. ووضح إجابتك.

(48) مسألة مفتوحة: اختر عدداً كلياً، واعمل بشكل عكسي، لكتابه معادلتين جذررتين يكون حلّهما ذلك العدد الكلي، بحيث تكون إدراهما معادلة جذر تربيعي، والأخرى معادلة جذر تكعبي.

(49) مسألة مفتوحة: اكتب معادلة يمكن حلّها برفع كلا الطرفين للأس المعطى:

$$\frac{7}{8}$$
 (c)

$$\frac{5}{4}$$
 (b)

$$\frac{3}{2}$$
 (a)

(50) تحد: حل المعادلة: $49^{x+1} = b^{3x-1}$. (إرشاد: $b^y = b^x$ إذا وفقط إذا كان $y = x$).

(51) اكتب: وضح العلاقة بين دليل جذر المتغير في المعادلة الجذرية والأس الذي ترفع طرفي المعادلة له عند حلّها.

تدريب على اختبار

(53) إجابة قصيرة: محيط مثلث متوازي الضلعين 56 in. فإذا كان طول أحد الضلعين المتطابقين 20 in، فما طول الضلع الثالث؟

(54) ما حلّ المعادلة $\sqrt{x+5} + 1 = 4$ ؟

20 D

11 C

10 B

4 A

(52) أي المجموعات الآتية تمثل دالة؟

$$\{(3, 0), (-2, 5), (2, -1), (2, 9)\}$$
 A

$$\{(-3, 5), (-2, 3), (-1, 5), (0, 7)\}$$
 B

$$\{(2, 5), (2, 4), (2, 3), (2, 2)\}$$
 C

$$\{(3, 1), (-3, 2), (3, 3), (-3, 4)\}$$
 D

مراجعة تراكمية

احسب قيمة كل مما يأتي: (الدرس: 4-6)

$$\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$$
 (57)

$$9^{\frac{1}{3}} \cdot 9^{\frac{5}{3}}$$
 (56)

$$27^{-\frac{2}{3}}$$
 (55)

(58) هندسة: العبارتان $4x^2y^2$ ، $8x^2y^2$. تمثلان طولي ساقي الزاوية القائمة في مثلث قائم الزاوية، أوجد عبارة ثالثة تمثل طول الوتر باستعمال نظرية فيثاغورس، ثم بسطها. (الدرس: 4-6)

أوجد معكوس كل دالة مما يأتي: (الدرس: 4-2)

$$y = (2x + 3)^2$$
 (62)

$$y = x^2$$
 (61)

$$y = -2x - 3$$
 (60)

$$y = 3x - 4$$
 (59)

حل كل معادلة مما يأتي، واكتب الحل في أبسط صورة: (مهارة سابقة)

$$\frac{1}{3}p = \frac{5}{6}$$
 (66)

$$\frac{9}{8}b = 18$$
 (65)

$$\frac{6}{7} = 9m$$
 (64)

$$\frac{3}{10} = \frac{12}{25}a$$
 (63)



4-7 حل المعادلات والمتباينات الجذرية



رابط الدرس الرقمي

يمكنك استعمال الحاسبة البيانية TI-nspire لحل المعادلات والمتباينات الجذرية، وإحدى طرق الحل هي إعادة كتابة المعادلة أو المتباينة، بحيث يكون أحد طرفيها صفرًا، ثم استعمال ميزة التقاطع في الحاسبة لإيجاد الحل.

الهدف

استعمل الحاسبة
البيانية TI-nspire:
لحل معادلات ومتباينات
جذرية.


المعادلة الجذرية**مثال 1**

$$\text{حل المعادلة: } \sqrt{x} + \sqrt{x+2} = 3$$

الخطوة 1 أعد كتابة المعادلة.

- اطرح العدد 3 من طرف المعادلة لتحصل على المعادلة:

$$\sqrt{x} + \sqrt{x+2} - 3 = 0$$

الخطوة 2 استعمل جدولًا وقدر الحل.

- اضغط المفاتيح التالية بالترتيب من اليمين إلى اليسار:

4: إضافة تطبيق القوائم وجداول البيانات 1: مستند جديد on

- سمّ رأس العمود **A** بالرمز **x**، ثم أدخل قيمًا تختارها له **x**.

- سمّ رأس العمود **B** بالرمز **y**، واكتب في الخلية الواقعه أسفله مباشرة المعادلة

$$y = \sqrt{x} + \sqrt{x+2} - 3$$

ثُم اضغط **enter** لتحصل على الجدول المطلوب.

بما أن إشارة الدالة تغير من سالب إلى موجب بين $x = 1$ و $x = 2$ ، فهناك حل بين العددين 1, 2.

الخطوة 3 استعمل ميزة أصفار الدالة لإيجاد الحل.


- اضغط على المفاتيح التالية بالترتيب من اليمين إلى اليسار:

2: إضافة تطبيق الرسوم البيانية 1: مستند جديد on

- اكتب الدالة: $f1(x) = \sqrt{x} + \sqrt{x+2} - 3$

ثُم اضغط **enter** فيظهر التمثيل البياني المجاور.

- حدد أصفار الدالة بالضغط على مفتاح **menu**:




ومنها اختر 6: تحليل الرسم البياني ثم اختر 1: أصفار الدالة وقم بالضغط في أي نقطة

من الشاشة مروّاً نقطة تقاطع التمثيل البياني مع المحور **x**، فيظهر إحداثيات صفر الدالة.

ثُم الضغط على كلّ من منحنى الدالة والمحور **x**، فيظهر صفر الدالة كما في الشكل المجاور.

فيكون الحل هو 1.36 تقريرًا، وهو يقع بين العددين 1, 2، كما تبين في الخطوة 2




مثال 2 المتباعدة الجذرية

$$\text{حل المتباعدة: } 1 < \sqrt{x+2} < 2\sqrt{x}$$

الخطوة 2 استعمل ميزة نقاط تقاطع.

- يمكنك استعمال ميزة نقاط تقاطع بالضغط على مفتاح **[menu]** ومنها اختر **6: تحليل الرسم البياني** ومنها اختر **نقطة التقاطع** وقم بالضغط في أي نقطة على الشاشة وحرك المؤشر مروراً ب نقطة التقاطع، يظهر الزوج المرتب $(2.4, 3.1)$.




$[-4, 10] \text{ scl: } 0.5 \text{ by } [-4, 10] \text{ scl: } 1$

أي أن الإحداثي x لنقطة تقاطع المنحنيين هو 2.4 تقريرياً؛ لذلك فإن الحل التقريري للمتباعدة هو $x > 2.4$ استعمل الرمز $>$ في الحل؛ لأن الرمز موجود في المتباعدة الأصلية.

الخطوة 1 ارسم طرف المتباعدة

- مثل المعادلة المرتبطة بالطرف الأيسر $f_1(x) = 2\sqrt{x}$ بيانياً، والمعادلة المرتبطة بالطرف الأيمن $f_2(x) = \sqrt{x+2} + 1$ بيانياً فتظهر الشاشة التالية:



$[-4, 10] \text{ scl: } 0.5 \text{ by } [-4, 10] \text{ scl: } 1$

تبين الشاشة أعلاه أن النقطة التي تقع عن يسار نقطة تقاطع المنحنيين تكون عندها $f_2 > f_1$ أي $\sqrt{x+2} + 1 > 2\sqrt{x}$ ، ولحل المتباعدة الأصلية، يجب أن تجد النقطة التي تكون عندها $f_1 > f_2$ ، وهذه النقطة تقع عن يمين نقطة تقاطع المنحنيين.

الخطوة 3 تحقق من حلّك باستعمال الجداول البيانية.

A	x	y1	y2
*		$=2*\sqrt(x)$	$=\sqrt(x+2)+1$
1	2.1	2.898275	3.024846
2	2.2	2.966479	3.04939
3	2.3	3.03315	3.073644
4	2.4	3.098387	3.097618
5	2.5	3.162278	3.12132
6	2.6	3.224002	3.144761

- اضغط مفتاح **[on]** ، واختر **4: إضافة تطبيق القوائم وجداول البيانات**.
 - سُم رأس العمود **x** بالرمز **x**، ثم أدخل قيمة عشرية بين العددين الصحيحين 2, 3.
 - سُم رأس العمود **y1** بالرمز **y1**، واتكتب في الخلية الواقعة أسفله مباشرة المعادلة $y_1 = 2\sqrt{x}$ ، ثم اضغط **enter**.
 - سُم رأس العمود **y2** بالرمز **y2**، واتكتب في الخلية الواقعة أسفله مباشرة المعادلة $y_2 = \sqrt{x+2} + 1$ ثم اضغط **enter** فيظهر الشكل المجاور.
- لاحظ أنه عندما تكون x أقل من أو تساوي 2.4، فإن $y_2 > y_1$. وهذا يثبت أن الحل هو $\{x | x > 2.4\}$.

تمارين:

استعمل طريقة التمثيل البياني لحل كل معادلة أو متباعدة مما يأتي:

$$\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 4 \quad (3)$$

$$\sqrt{x+5} = \sqrt{3x+4} \quad (2)$$

$$\sqrt{x+4} = 3 \quad (1)$$

$$\sqrt{x} + \sqrt{x-1} < 4 \quad (6)$$

$$\sqrt{x+3} > 2\sqrt{x} \quad (5)$$

$$\sqrt{x-3} \geq 2 \quad (4)$$

7) اكتب: وضح كيف يمكنك تطبيق الأسلوب المتبوع في حل المثال الأول لحل متباعدة؟



ملخص الفصل

المفاهيم الأساسية

(الدرس 4-1) العمليات على الدوال.

التعريف	العملية
$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	الجمع
$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$	الطرح
$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$	الضرب
$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0$	القسمة
$[f \circ g](x) = f[g(x)]$	التركيب

العلاقات والدوال العكسية ودوال الجذر التربيعي

(الدرسان 4-2, 4-3)

- اعكس إحداثيات الأزواج المرتبة لتتجدد العلاقة العكسية.
- تكون كل من الدالتين دالة عكسية للأخرى إذا و فقط إذا كان كل من تركبيهما يساوي الدالة المحايدة.
- الدالة الرئيسة (الأم) لدوال الجذر التربيعي هي $f(x) = \sqrt{x}$ ومجالها هو $\{x | f(x) \geq 0\}$.

الجذور النونية للأعداد الحقيقية (الدرس 4-4)

الجذور الحقيقية النونية للعدد			
$a = 0$	$a < 0$	$a > 0$	n
له جذر حقيقى وحيد وهو 0	ليس له جذور حقيقية	له جذر وحيد موجب وله جذر وحيد سالب	عدد زوجي
	ليس له جذور موجبة وله جذر وحيد سالب	له جذر وحيد موجب وليس له جذور سالبة	عدد فردي

العبارات الجذرية (الدروس 4-5 إلى 7)

إذا كان a, b عددين حقيقيين، و $x, y, n, y > 1, n > 1$ أعداد صحيحة حيث $b \neq 0$ ، يُعد كل مما يأتي صحيحاً، وذلك عندما تكون جميع الجذور معرفة.

- خاصية الضرب: $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- خاصية القسمة: $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
- الأسس النسبية: $b^{\frac{x}{y}} = (\sqrt[y]{b})^x$

منظم أفكار

المطويات

تأكد أن المفاهيم الأساسية مدونة في مطويتك.



مراجعة الدروس

العمليات على الدوال ص 178-184

4-1

مثال 1

إذا كان $2 - x^2 = f(x)$, $g(x) = 3x + 3$ فأوجد كلاً من $[f \circ g](x)$, $[g \circ f](x)$

$$\begin{aligned} \text{أولاً عن } f(x) \text{ بالمقدار } 3x^2 + 2 \\ & [g \circ f](x) = g[f(x)] \\ &= g(x^2 + 3) \\ &= 3(x^2 + 3) - 2 \\ &= 3x^2 + 9 - 2 \\ &= 3x^2 + 7 \\ \text{ثانياً عن } g(x) \text{ بالمقدار } 2 - x^2 \\ & [f \circ g](x) = f[g(x)] \\ &= f(3x - 2) \\ &= (3x - 2)^2 + 3 \\ &= 9x^2 - 12x + 4 + 3 \\ &= 9x^2 - 12x + 7 \end{aligned}$$

أو جد (x) , $f \circ g$ لكلاً مما يأتي:

$$f(x) = x^2 + 1 \quad (10) \quad f(x) = 2x + 1 \quad (9)$$

$$g(x) = x - 7 \quad g(x) = 4x - 5$$

$$f(x) = 4x \quad (12) \quad f(x) = x^3 \quad (11)$$

$$g(x) = 5x - 1 \quad g(x) = x - 1$$

(13) قياسات: تستعمل الصيغة $y = 3f$ لتحويل اليارات y إلى أقدام f , كذلك تستعمل الصيغة $\frac{n}{12} = f$ لتحويل البوصات n إلى أقدام f . اكتب الصيغة التي تحول اليارات إلى بوصات.

العلاقات والدوال العكسية ص 185-189

4-2

مثال 2

أو جد معكوس الدالة: $f(x) = -2x + 7$

ضع المتغير y بدلاً من رمز الدالة $f(x) = -2x + 7$, ثم قم بالتبديل بين المتغيرين y , x , وحل المعادلة بالنسبة للمتغير y .

$$\text{بالتبدل بين المتغيرين} \quad x = -2y + 7$$

$$\text{بالحل بالنسبة للمتغير } y \quad 2y = -x + 7$$

$$\text{اقسم الطرفين على 2} \quad y = \frac{-x + 7}{2}$$

ضع الرمز $f^{-1}(x) = \frac{-x + 7}{2}$ بدلاً من المتغير y : لأن معكوس الدالة $f(x)$ هو دالة أيضاً.

أو جد معكوس كل دالة مما يأتي، ثم مثل الدالة ومعكوسها بيانياً على مستوى إحداثي واحد. وبيّن ما إذا كان معكوس الدالة يمثل دالة أم لا، وإذا كان كذلك فاكتبه قاعدة الدالة العكسية.

$$f(x) = -3x - 5 \quad (15) \quad f(x) = 5x - 6 \quad (14)$$

$$f(x) = \frac{4x + 1}{5} \quad (17) \quad f(x) = \frac{1}{2}x + 3 \quad (16)$$

$$f(x) = (2x + 1)^2 \quad (19) \quad f(x) = x^2 \quad (18)$$

في كل زوج مما يأتي حدد هل كل دالة تمثل دالة عكسية للأخرى أم لا، ووضح إجابتك.

$$f(x) = 2x + 1, g(x) = x - 2 \quad (20)$$

$$f(x) = x^3, g(x) = \sqrt[3]{x} \quad (21)$$

(22) ثقافة مالية: قام عبدالله بالنشاطات المالية الآتية خلال الشهر الماضي: أودع مبلغاً يعادل مثلي رصيده الأصلي ، ثم أودع مبلغين قيمة كل منها 450 ريالاً، ثم سحب مبلغ 350 ريالاً خمس مرات من رصيده. إذا كان رصيده الآن 1890 ريالاً، فاكتبه معادلة تمثل هذه المسألة، وماذا كان رصيده في بداية الشهر؟

مراجعة الدروس

4-3 دوال ومتباينات الجذر التربيعي ص 191-195

مثال 3

مثل بيانياً الدالة: $f(x) = \sqrt{x+1} - 2$, وحدد مجالها ومداها.

تحديد المجال:


ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر.

$$x + 1 \geq 0$$

اضر العدد 1 من الطرفين.

$$x \geq -1$$

اعمل جدولأً لبعض قيم المتغير x , حيث $-1 \leq x \leq 5$. ومثل الدالة بيانياً.



x	f(x)
-1	-2
0	-1
1	-0.59
2	-0.27
3	0
4	0.24
5	0.45

المجال هو $\{x | x \geq -1\}$, والمدى هو $\{f(x) | f(x) \geq -2\}$.

مثل بيانياً كل دالة فيما يأتي، وحدد مجالها ومداها:

$$f(x) = -\sqrt{6x} \quad (24)$$

$$f(x) = \sqrt{3x} \quad (23)$$

$$f(x) = \sqrt{x+5} - 3 \quad (26)$$

$$f(x) = \sqrt{x-7} \quad (25)$$

$$f(x) = -\frac{1}{3}\sqrt{x+4} - 1 \quad (28) \quad f(x) = \frac{3}{4}\sqrt{x-1} + 5 \quad (27)$$

(29) هندسة: يعبر عن مساحة الدائرة بالقانون $A = \pi r^2$.

حيث r نصف قطرها. فما قيمة نصف قطر دائرة مساحتها

$$? \text{cm}^2$$

مثل بيانياً كل متباينة فيما يأتي:

$$y \geq \sqrt{x} + 3 \quad (30)$$

$$y < 2\sqrt{x-5} \quad (31)$$

$$y > -\sqrt{x-1} + 2 \quad (32)$$

4-4 الجذر التنوبي ص 196-200

مثال 4

بسط العبارة الجذرية: $\sqrt{64x^6}$

$$64x^6 = (8x^3)^2 \quad \sqrt{64x^6} = \sqrt{(8x^3)^2}$$

$$\text{بسط} \quad = 8|x^3|$$

استعمل رمز القيمة المطلقة لتجنب القيم السالبة للمتغير x .

مثال 5

بسط العبارة الجذرية: $\sqrt[6]{4096x^{12}y^{24}}$

$$4096x^{12}y^{24} = (4x^2y^4)^6 \quad \sqrt[6]{4096x^{12}y^{24}} = \sqrt[6]{(4x^2y^4)^6}$$

$$\text{بسط} \quad = 4x^2y^4$$

بسط كل ما يأتي:

$$\sqrt[3]{-125} \quad (34) \quad \pm\sqrt{121} \quad (33)$$

$$\sqrt[6]{(x^2+2)^{18}} \quad (36) \quad \sqrt{(-6)^2} \quad (35)$$

$$\sqrt[4]{a^8b^{12}} \quad (38) \quad \sqrt[3]{27(x+3)^3} \quad (37)$$

$$\sqrt[5]{243x^{10}y^{25}} \quad (39)$$

(40) فيزياء: تستعمل الصيغة $v = \sqrt{\frac{2K}{m}}$ لحساب سرعة جسم v , حيث v السرعة بالأمتار لكل ثانية, m كتلة الجسم بالграмм, K الطاقة الحركية بالجول. أوجد السرعة بالأمتار لكل ثانية لجسم كتلته 17 جراماً وطاقته الحركية 850 جولاً.

4-5 العمليات على العبارات الجذرية ص 203-208

مثال 6

$$2\sqrt[3]{18a^2b} \cdot 3\sqrt[3]{12ab^5}$$

خاصية ضرب الجذور

$$2\sqrt[3]{18a^2b} \cdot 3\sqrt[3]{12ab^5}$$

حل إلى العوامل

$$= (2 \cdot 3)\sqrt[3]{18a^2b \cdot 12ab^5}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= 6\sqrt[3]{2^33^3a^3b^6}$$

أوجد الجذر التكعبي

$$= 6 \cdot \sqrt[3]{2^3} \cdot \sqrt[3]{3^3} \cdot \sqrt[3]{a^3} \cdot \sqrt[3]{b^6}$$

$$= 6 \cdot 2 \cdot 3 \cdot a \cdot b^2$$

بسط

$$= 36ab^2$$

مثال 7

$$\sqrt{\frac{x^4}{y^5}}$$

خاصية قسمة الجذور

$$\sqrt{\frac{x^4}{y^5}} = \frac{\sqrt{x^4}}{\sqrt{y^5}}$$

حل ما يمكن تحليله إلى عوامل مربعة

$$= \frac{\sqrt{(x^2)^2}}{\sqrt{(y^2)^2} \cdot \sqrt{y}}$$

أنطق المقام

$$= \frac{x^2}{y^2\sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y}}$$

$$\sqrt{y} \cdot \sqrt{y} = y$$

$$= \frac{x^2\sqrt{y}}{y^3}$$

بسط كل عبارة جذرية فيما يأتي:

$$\sqrt[3]{54} \quad (41)$$

$$\sqrt{144a^3b^5} \quad (42)$$

$$4\sqrt{6y} \cdot 3\sqrt{7x^2y} \quad (43)$$

$$6\sqrt{72} + 7\sqrt{98} - \sqrt{50} \quad (44)$$

$$(6\sqrt{5} - 2\sqrt{2})(3\sqrt{5} + 4\sqrt{2}) \quad (45)$$

$$\frac{\sqrt{6m^5}}{\sqrt{p^{11}}} \quad (46)$$

$$\frac{3}{5 + \sqrt{2}} \quad (47)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{6}} \quad (48)$$

(49) هندسة: أوجد محيط المستطيل في الشكل أدناه ومساحته.



4-6 الأسس النسبية ص 209-214

مثال 8

$$a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{1}{5}}$$

بسط العبارة

$$a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{1}{5}} = a^{\frac{2}{3} + \frac{1}{5}}$$

خاصية ضرب القوى

$$= a^{\frac{13}{15}}$$

اجمع الأسس

بسط كل عبارة مما يأتي:

$$\frac{d^{\frac{1}{6}}}{d^{\frac{3}{4}}} \quad (52)$$

$$m^{-\frac{3}{4}} \quad (51)$$

$$x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{2}{3}} \quad (50)$$


بسط كل عبارة مما يأتي:

$$\frac{x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{1}{3}}} \quad (55)$$

$$\sqrt[3]{\sqrt{729}} \quad (54)$$

$$\frac{1}{y^{\frac{1}{4}}} \quad (53)$$

(56) هندسة: ما مساحة الدائرة في الشكل أدناه؟



مثال 9

$$\frac{2a}{\sqrt[3]{b}}$$

أكتب العبارة على الصورة الأساسية

$$\frac{2a}{\sqrt[3]{b}} = \frac{2a}{b^{\frac{1}{3}}}$$

أنطق المقام

$$= \frac{2a}{b^{\frac{1}{3}}} \cdot \frac{b^{\frac{2}{3}}}{b^{\frac{2}{3}}}$$

أكتب العبارة على الصورة الجذرية

$$= \frac{2ab^{\frac{2}{3}}}{b} = \frac{2a\sqrt[3]{b^2}}{b}$$



مثال 10

$$\sqrt{2x+9} - 2 = 5$$

$$\text{المعادلة الأصلية } \sqrt{2x+9} - 2 = 5$$

$$\text{أضف 2 للطرفين } \sqrt{2x+9} = 7$$

$$\text{ربع الطرفين } (\sqrt{2x+9})^2 = 7^2$$

$$\text{أوجد مربع الطرفين } 2x + 9 = 49$$

$$\text{اطرح 9 من الطرفين } 2x = 40$$

$$\text{اقسم الطرفين على 2 } x = 20$$

$$\checkmark \sqrt{2 \times 20 + 9} - 2 = 5 \quad \text{تحقق:}$$

مثال 11

$$\text{حل المتباينة } 5 > \sqrt{2x-5} + 2$$

$$\text{ما تحت الجذر ليس سالبًا } 2x - 5 \geq 0$$

$$\text{أضف 5 للطرفين } 2x \geq 5$$

$$\text{اقسم الطرفين على 2 } x \geq 2.5$$

يجب أن يكون الحل أكبر من أو يساوي 2.5 ليتمي إلى المجال.

$$\text{المتباينة الأصلية } \sqrt{2x-5} + 2 > 5$$

$$\text{اطرح 2 من الطرفين } \sqrt{2x-5} > 3$$

$$\text{ربع الطرفين } (\sqrt{2x-5})^2 > 3^2$$

$$\text{أوجد مربع الطرفين } 2x - 5 > 9$$

$$\text{أضف 5 للطرفين } 2x > 14$$

$$\text{اقسم الطرفين على 2 } x > 7$$

بما أن $x \geq 2.5$ تحوي $x > 7$ ، فإن حل المتباينة هو $x > 7$.

$$x = 0, \sqrt{2 \times 0 - 5} + 2 \stackrel{?}{>} 5 \quad \text{تحقق:}$$

$$\times \sqrt{-5} + 2 > 5$$

وبما أن $\sqrt{-5}$ ليس عددًا حقيقياً، فإن المتباينة لا تتحقق.

$$x = 8, \sqrt{2 \times 8 - 5} + 2 \stackrel{?}{>} 5$$

$$\checkmark \sqrt{11} + 2 > 5$$

وبما أن $5 < 5.3$ ، فإن المتباينة تتحقق.

حُلّ كل معادلة مما يأتي:

$$-\sqrt{x-11} = 3 - \sqrt{x} \quad (58) \quad \sqrt{x-3} + 5 = 15 \quad (57)$$

$$\sqrt{m+3} = \sqrt{2m+1} \quad (60) \quad 4 + \sqrt{3x-1} = 8 \quad (59)$$

$$(x+1)^{\frac{1}{4}} = -3 \quad (62) \quad \sqrt{2x+3} = 3 \quad (61)$$

$$3(3x-1)^{\frac{1}{3}} - 6 = 0 \quad (64) \quad a^{\frac{1}{3}} - 4 = 0 \quad (63)$$

(65) فيزياء: تُعطى المسافة الأفقية d بالكميلومترات التي يمكن أن يراها شخص بالعلاقة $d = 3.57 \sqrt{L}$ ، حيث L تمثل ارتفاع النقطة التي ينظر منها الشخص عن الأرض ويقاس بالأمتار. فإذا كانت المسافة الأفقية التي يراها شخص هي 71.4 كيلومتراً، فكم متراً ترتفع النقطة التي ينظر منها الشخص عن الأرض؟

حُلّ كل متباينة مما يأتي:

$$2 + \sqrt{3x-1} < 5 \quad (66)$$

$$\sqrt{3x+13} - 5 \geq 5 \quad (67)$$

$$6 - \sqrt{3x+5} \leq 3 \quad (68)$$

$$\sqrt{-3x+4} - 5 \geq 3 \quad (69)$$

$$5 + \sqrt{2y-7} < 5 \quad (70)$$

$$3 + \sqrt{2x-3} \geq 3 \quad (71)$$

$$\sqrt{3x+1} - \sqrt{6+x} > 0 \quad (72)$$



اختبار الفصل

4

في كل زوج مما يأتي، حدد هل كل دالة تمثل دالة عكسية للأخرى أم لا؟

$$(3 - 2\sqrt{2})(-7 + \sqrt{2}) \quad (18)$$

$$(2 + \sqrt{5})(6 - 3\sqrt{5}) \quad (17)$$

$$\frac{m^{\frac{1}{2}} - 1}{2m^{\frac{1}{2}} + 1} \quad (20)$$

$$\frac{12}{2 - \sqrt{3}} \quad (19)$$

$$5^{\frac{2}{3}} \cdot 5^{\frac{1}{2}} \cdot 5^{\frac{5}{6}} \quad (22)$$

$$4\sqrt{3} - 8\sqrt{48} \quad (21)$$

$$\sqrt[5]{32x^{15}y^{10}} \quad (24)$$

$$\sqrt[6]{729a^9b^{24}} \quad (23)$$

$$\frac{r^{\frac{2}{3}}}{r^{\frac{1}{6}}} \quad (26)$$

$$w^{-\frac{4}{5}} \quad (25)$$

$$\frac{y^{\frac{3}{2}}}{y^{\frac{1}{2}} + 2} \quad (28)$$

$$\frac{a^{-\frac{1}{2}}}{6a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{-\frac{1}{4}}} \quad (27)$$

(29) اختيار من متعدد: ما مساحة المستطيل في الشكل أدناه؟

$$(2 + \sqrt{6}) \text{ in}$$

$$\sqrt{3} \text{ in}$$

$$2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} \quad \text{A}$$

$$4 + 2\sqrt{6} + 2\sqrt{3} \quad \text{B}$$

$$2\sqrt{3} + \sqrt{6} \quad \text{C}$$

$$2\sqrt{3} + 3 \quad \text{D}$$

حول كل متابينة مما يأتي:

$$2 + \sqrt{4x - 4} \leq 6 \quad (31)$$

$$\sqrt{4x - 3} < 5 \quad (30)$$

$$\sqrt{b + 12} - \sqrt{b} > 2 \quad (33)$$

$$\sqrt{2x + 3} - 4 \leq 5 \quad (32)$$


$$\sqrt{y - 7} + 5 \geq 10 \quad (34)$$

(35) قانون هيرو (HERO): يمكن إيجاد مساحة المثلث الذي

أطوال أضلاعه a, b, c باستعمال قانون هيرو:

$$s = \frac{1}{2}(a + b + c), A = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}$$

اكتب مساحة المثلث في الشكل أدناه على الصورة الجذرية في أبسط صورة.




$$f(x) = 3x + 8, g(x) = \frac{x - 8}{3} \quad (1)$$

$$f(x) = \frac{1}{3}x + 5, g(x) = 3x - 15 \quad (2)$$

$$f(x) = x + 7, g(x) = x - 7 \quad (3)$$

$$f(x) = \frac{x - 2}{3}, g(x) = 3x - 2 \quad (4)$$

(5) اختيار من متعدد: أي المتابينات الآتية لها التمثيل البياني الظاهر في الشكل أدناه؟



$$y \geq \sqrt{x - 4} \quad \text{C}$$

$$y \leq \sqrt{x - 4} \quad \text{D}$$

$$y \geq \sqrt{x + 4} \quad \text{A}$$

$$y \leq \sqrt{x + 4} \quad \text{B}$$

إذا كان $1 + \sqrt{12} = \sqrt{5a - 4}$ فأوجد كل دالة مما يأتي:

$$(f \cdot g)(x) \quad (7)$$

$$(f + g)(x) \quad (6)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) \quad (9)$$

$$(f - g)(x) \quad (8)$$

حول كل معادلة مما يأتي:

$$\sqrt{a + 12} = \sqrt{5a - 4} \quad (10)$$

$$\sqrt{3x} = \sqrt{x - 2} \quad (11)$$

$$4(\sqrt[4]{3x + 1}) - 8 = 0 \quad (12)$$

$$\sqrt[3]{5m + 6} + 15 = 21 \quad (13)$$

$$1 + \sqrt{x + 11} = \sqrt{2x + 15} \quad (14)$$

$$\sqrt{x - 6} - \sqrt{x} = 3 \quad (15)$$

(16) اختيار من متعدد: قيمة العبارة $125^{-\frac{1}{3}}$ هي:

$$5 \quad \text{D}$$

$$\frac{1}{5} \quad \text{C}$$

$$-\frac{1}{5} \quad \text{B}$$

$$-5 \quad \text{A}$$

الإعداد للاختبارات المعيارية



الحل عكسياً

تعطي بعض مسائل الرياضيات معلومات عن النتيجة النهائية، وتتطلب استنتاج بعض الأمور التي حدثت مسبقاً. ويمكنك في مثل هذه المسائل الحل باستعمال استراتيجية الحل عكسياً.

استراتيجية الحل عكسياً:

خطوة 1

اقرأ المسألة بعناية.

أسأل نفسك:

- ما المعلومات المعطاة؟
- ما المطلوب إيجاده؟
- هل توجد معلومات ترتبط بالنتيجة النهائية؟
- هل المطلوب هو إحدى القيم غير المعطاة، والتي لم تذكر في نص المسألة؟
- ما العمليات المستعملة في المسألة؟

خطوة 2

عبر عن المسألة بما يناسبها: معادلة أو متباينة أو تمثيل بيانيٌّ، ثم اعمل عكسياً لحل المسألة.

- مثل تتابع الأحداث بمخطط حسب نص المسألة إذا تطلب الأمر ذلك.
- استعمل العملية العكسية لكل عملية أثناء الحل عكسياً لتصل إلى الإجابة.

خطوة 3

تحقق من صحة الحل مبتدئاً بإجابتك التي حصلت عليها، وتأكد من أنك ستصل إلى النتيجة المعطاة في نص المسألة نفسها؟

مثال

اقرأ المسألة الآتية جيداً، وحدد المطلوب فيها، ثم استعمل معلومات المسألة لحلها.

اشترى عبد الرحمن سيارة مستعملة. فكان مجموع ما دفعه 39540 ريالاً. ويتضمن ذلك المبلغ رسوم نقل الملكية وهي 150 ريالاً، وعمولة مكتب الوساطة وهي 1% من ثمن السيارة. فما ثمن السيارة؟ بين خطوات الحل.

اقرأ المسألة بعناية. أنت تعلم المبلغ الذي دفعه عبد الرحمن بما فيه رسوم نقل الملكية وعمولة المكتب.

والمطلوب هو إيجاد ثمن السيارة قبل إضافة رسوم نقل الملكية وعمولة المكتب.



افرض أن x تمثل ثمن السيارة. اكتب معادلة، واستعمل استراتيجية الحل عكسياً لحلها.

ثمن السيارة مضاد إلى رسوم نقل الملكية وعمولة مكتب الوساطة يساوي المبلغ الذي دفعه عبد الرحمن.



$$x + 0.01x + 150 = 39540$$

يتوج عن استعمال استراتيجية الحل عكسياً معادلة بسيطة. استعمل العمليات العكسية لإيجاد قيمة x .

$$1.01x + 150 = 39540$$

$$1.01x = 39390$$

$$x = 39000$$

تحقق من صحة حلّك بالبدء بالإجابة التي حصلت عليها؛ لتتأكد من أنك ستحصل على القيمة نفسها المعطاة في نص المسألة.

$$\text{أوجد عمولة مكتب الوساطة} \quad 39000(1.01) = 39390$$

$$\text{اجمع رسوم نقل الملكية} \quad 39390 + 150 = 39540$$

$$\text{القيمة نفسها المعطاة} \quad 39540 = 39540$$

لذا فإن ثمن السيارة هو 39000 ريال.

تمارين ومسائل

اقرأ المسألتين الآتتين جيداً، وحدد المطلوب في كل منها، ثم استعمل معطياتها لحلّها:

- (2) يقوم على بعمل نموذج لسيارة مستعملاً مقاييس رسم، فوُجد أن ارتفاع نموذج السيارة يعادل $\frac{1}{32}$ من ارتفاع السيارة الحقيقي x . فائي المعادلات الآتية تمثل هذه العلاقة؟

$$y = \frac{1}{32}x \quad \mathbf{C}$$

$$y = x - \frac{1}{32} \quad \mathbf{A}$$

$$y = x + \frac{1}{32} \quad \mathbf{D}$$

$$y = \frac{1}{32}x \quad \mathbf{B}$$

- (1) قذف جسم رأسياً إلى أعلى بسرعة ابتدائية مقدارها 800 ft/s . إذا كان ارتفاع الجسم h بالأقدام بعد t ثانية فإنه يُعبر عنه بالمعادلة: $h = -16t^2 + 800t$.

بعد كم ثانية يصل الجسم إلى ارتفاع 10000 ft ؟

A 10 ثوانٍ

B 25 ثانية

C 100 ثانية

D 625 ثانية



اختبار تراكمي

اسئلة الاختيار من متعدد

4) ما أبسط صورة للعبارة: $\sqrt[3]{-27b^6c^{12}}$.

$-3b^3c^6$ A

$-3b^2c^4$ B

$3b^2c^4$ C

$3b^3c^6$ D

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:


(1) يقدم محل خصمًا نسبته 20% على جميع لوازم التخييم. ويمتلك بدر قسيمة حسم إضافية بقيمة 5 ريالات عند أي عملية شراء من المحل. إذا استعمل بدر القسيمة بعد الخصم لشراء خيمة، فأيُّ الدوال الآتية يمكن أن تستعمل لإيجاد سعر خيمة سعرها الأصلي ريالاً؟ d

$P(d) = 0.8 \times (d + 5)$ A

$P(d) = (0.8 \times d) - 5$ B

$P(d) = 0.2 \times (d - 5)$ C

$P(d) = 0.8 \times (d - 5)$ D



5) أي دوال الجذر التربيعي الآتية لها التمثيل البياني في الشكل المجاور؟

$f(x) = \sqrt{x - 3} - 1$ A

$f(x) = \sqrt{x + 1} - 3$ B

$f(x) = \sqrt{x + 3} + 1$ C

$f(x) = \sqrt{x - 1} - 3$ D

(2) أي العبارات الآتية تكافئ: $3a(2a+1)-(2a-2)(a+3)$

$2a^2 + 6a + 7$ A

$4a^2 - a + 6$ B

$4a^2 + 6a - 6$ C

$4a^2 - 3a + 7$ D

(3) اشتري سلمان سيارة مستعملة، أضيف إلى ثمنها 6.5% بدل صيانة دورية، ودفع 150 ريالاً رسوم نقل الملكية، أوجد ثمن السيارة إذا كان مجموع ما دفعه سلمان 68310 ريال.

64140 A

68000 B

64000 C

68160 D



أسئلة ذات إجابات قصيرة

(6) ما حل المعادلة: $\sqrt[3]{5x} = 10$ ؟

2 A

20 B

200 C

1000 D

أجب عن كل مما يأتي:

(9) مثل الدالة $|x + 2| = f(x)$ بيانياً، ثم حدد مجالها ومداها.

(7) أوجد الدالة العكssية للدالة: $f(x) = x - 5$

$f^{-1}(x) = x + 5$ A

$f^{-1}(x) = 5x$ B

$f^{-1}(x) = \frac{x}{5}$ C

$f^{-1}(x) = 5 - x$ D

(10) قذف جسم من منصة إلى أعلى. و تستعمل الصيغة الآتية لإيجاد ارتفاع الجسم h بالأقدام عن سطح الأرض بعد مرور t ثانية من لحظة القذف. فما أعلى ارتفاع يصل إليه الجسم؟

(8) أي المعادلات الآتية لها جذران نسبيان مختلفان؟

I. $3x^2 + x - 2 = 0$

II. $x^2 - 2x + 1 = 0$

III. $x^2 + 2x + 5 = 0$


I فقط A

II فقط B

III، II فقط C

III، I فقط D

(11) إذا كان محيط الشكل الرباعي أدناه 160 وحدة، فما قيمة m ؟



أسئلة ذات إجابات مطولة

أجب عن كلٌ مما يأتي موضحاً خطوات الحل:

(12) عمر أب وابنه 56 عاماً فإذا كان عمر الأب يزيد على مثلي عمر الابن بـ 20 عاماً:

(a) اكتب نظاماً من المعادلات الخطية يمثل المسألة.

(b) اكتب معادلة مصفوفية يمكن استعمالها لحل النظام في a

(c) أوجد النظير الضري لصفوفة العاملات، وحل المعادلة المصفوفية لإيجاد عمر كل من الأب وابنه.

(13) إذا كانت $f(x)$, $g(x)$ دالتين كل منهما دالة عكسية للأخرى،

(a) صف التمثيل البياني لكلا الدالتين $f(x)$, $g(x)$ على مستوى إحداثي واحد.

(b) ما قيمة $[f \circ g](2)$? وضح إجابتك.

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	إذا أخطأت في السؤال ...
4-2	مهارة سابقة	مهارة سابقة	4-7	مهارة سابقة	مهارة سابقة	4-2	4-7	4-3	4-3	4-2	مهارة سابقة	4-1	فعد إلى الدرس ...

المهندسة الإحداثية في المستوى

نقطة المنتصف $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

المسافة بين نقطتين $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

الميل $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, x_2 \neq x_1$

المصفوفات

الجمع $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix}$

الضرب $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{bmatrix}$

الطرح $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-e & b-f \\ c-g & d-h \end{bmatrix}$

محددة الرتبة الثانية $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

الضرب بثابت $k \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix}$

مساحة مثلث رؤوسه $(a,b),(c,d),(e,f)$ $\frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & b & 1 \\ c & d & 1 \\ e & f & 1 \end{vmatrix}$

محددة الرتبة الثالثة (قاعدة الأقطار)

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

كثيرات الحدود

القانون العام $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, a \neq 0$

مجموع مكعبين $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

مربع المجموع $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + 2ab + b^2$

فرق بين مكعبين $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

مربع الفرق $(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - 2ab + b^2$

مكعب المجموع $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

حاصل ضرب
مجموع حددين
بالفرق بينهما $(a + b)(a - b) = (a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

مكعب الفرق $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

الإحصاء والاحتمال

$n! = n(n-1) \cdot (n-2) \dots 2 \cdot 1$

${}_n C_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$

$0! = 1$

$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, P(A) \neq 0$

${}_n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$

$P(A') = 1 - P(A)$

المتتابعات والمتسلسلات

الحد التوقي في
المتتابعة الحسابية

$a_n = a_1 + (n-1)d$

الحد التوقي في
المتتابعة الهندسية


$a_n = a_1 r^n - 1$

مجموع حدود
المتتابعة الحسابية

$S_n = n \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right) \text{ or } S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d]$

مجموع حدود
المتتابعة الهندسية

$S_n = \frac{a_1 - a_1 r^n}{1-r} \text{ or } S_n = \frac{a_1 - a_n r}{1-r}, r \neq 1$



حساب المثلثات

قانون الجيب

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}, a, b, c \neq 0$$

قانون جيب التمام

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

الدوال المثلثية

$$\sin \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\csc \theta = \frac{\text{الوتر}}{\text{المقابل}} = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{\text{الوتر}}{\text{المجاور}} = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{المقابل}} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

متطابقات مثلثية


$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$


$$\cot^2 \theta + 1 = \csc^2 \theta$$

الدوال الرئيسية (الأم)


الدوال الخطية




دوال القيمة المطلقة





الدوال التربيعية



دوال الجذر التربيعي



دوال المقلوب



الرموز

R	مجموعة الأعداد الحقيقة	A^{-1}	النظير الضربي للمصفوفة \underline{A}
Q	مجموعة الأعداد النسبية	$-\underline{A}$	النظير الجمعي للمصفوفة \underline{A}
I	مجموعة الأعداد غير النسبية	\underline{I}	مصفوفة الوحدة
Z	مجموعة الأعداد الصحيحة	$n!$	مضرب العدد الصحيح الموجب n
W	مجموعة الأعداد الكلية	\sum	المجموع
N	مجموعة الأعداد الطبيعية	\bar{x}	المتوسط
$f(x)$	دالة x بمتغير f	s	الانحراف المعياري
$<$	أصغر من	A'	الحادثة المتممة
\leq	أصغر من أو يساوي	$P(A)$	احتمال الحادثة A
$>$	أكبر من	$P(B A)$	احتمال B بشرط A
\geq	أكبر من أو يساوي	nPr	تباديل n مأخوذة r في كل مرة
\approx	يساوي تقريرياً	nCr	تواقيع n مأخوذة r في كل مرة
$f(x) = \{$	الدالة المتعددة التعريف	$Sin(x)$	دالة الجيب
$f(x) = x $	دالة القيمة المطلقة	$Cos(x)$	دالة جيب التمام
$f(x) = [x]$	دالة أكبر عدد صحيح	$Tan(x)$	دالةظل
$f(x, y)$	دالة بمتغيرين	$cot(x)$	دالة مقلوب الظل
i	وحدة التخيلية	$csc(x)$	دالة مقلوب الجيب
$[f \circ g](x)$	تركيب الدالتين f و g	$sec(x)$	دالة مقلوب جيب التمام
$f^{-1}(x)$	معكوس الدالة f	$\sin^{-1} x$	معكوس دالة الجيب
$b^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{b}$	الجذر النوني b	$\cos^{-1} x$	معكوس دالة جيب التمام
$\underline{A}_{m \times n}$	مصفوفة رتبتها $m \times n$	$\tan^{-1} x$	معكوس دالةظل
a_{ij}	العنصر في الصف i العمود j من المصفوفة A		
$ A $	محددة المصفوفة \underline{A}		